

Tableau 20
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	8,4	8,1	8,8	4,1	3,9	4,3	4,4	4,2	4,6	4,9	4,7	5,1
12 à 19 ans	11,6	11,0	12,1	5,5	5,3	5,7	6,1	5,9	6,3	7,2	7,0	7,4
20 à 39 ans	16,0	15,2	16,8	7,2	6,9	7,5	8,0	7,6	8,4	9,8	9,3	10,3
40 à 59 ans	18,7	17,5	19,9	7,6	6,7	8,5	8,9	7,9	9,9	12,5	11,7	13,3
60 à 79 ans	19,1	18,5	19,7	8,4	7,7	9,1	9,9	9,2	10,6	13,3	12,5	14,1
6 à 79 ans	16,0	15,6	16,4	5,7	5,5	5,9	6,9	6,7	7,1	9,4	9,0	9,8
Hommes												
6 à 11 ans	7,9	7,5	8,4	4,0	3,7	4,3	4,3	4,1	4,5	4,7	4,5	4,9
12 à 19 ans	10,0	9,6	10,4	5,0	4,6	5,4	5,7	5,4	6,0	6,6	6,2	7,0
20 à 39 ans	15,0	14,3	15,8	7,2	6,8	7,6	7,8	7,3	8,3	9,8	9,1	10,5
40 à 59 ans	17,9	16,3	19,5	8,1	6,9	9,3	9,0	7,6	10,4	12,6	11,5	13,7
60 à 79 ans	17,9	16,9	18,8	8,4	7,8	9,0	9,7	8,7	10,7	12,2	11,0	13,4
6 à 79 ans	15,0	14,4	15,5	5,3	5,0	5,6	6,5	6,3	6,7	9,0	8,5	9,5
Femmes												
6 à 11 ans	9,0	8,3	9,7	4,2	4,0	4,4	4,5	4,3	4,7	5,2	5,0	5,4
12 à 19 ans	13,2	12,2	14,1	6,1	5,9	6,3	6,8	6,3	7,3	8,3	7,9	8,7
20 à 39 ans	17,0	15,8	18,2	7,2	7,0	7,4	8,2	7,6	8,8	10,1	9,4	10,8
40 à 59 ans	19,5	18,2	20,8	7,4	6,3	8,5	8,7	7,9	9,5	12,4	11,5	13,3
60 à 79 ans	20,2	19,4	21,0	8,0	6,6	9,4	10,2	9,1	11,3	14,4	13,3	15,5
6 à 79 ans	17,1	16,6	17,6	6,0	5,9	6,1	7,2	7,1	7,3	9,9	9,5	10,3

	Mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	6,1	5,8	6,4	9,5	9,0	10,0	16,3	14,3	18,3	20,7	18,7	22,7
12 à 19 ans	9,6	9,0	10,2	14,4	13,4	15,4	19,9	18,3	21,5	24,8	21,9	27,7
20 à 39 ans	13,3	12,3	14,3	20,3	18,7	21,9	27,2	25,8	28,6	32,9	28,6	37,2
40 à 59 ans	17,2	15,5	18,9	23,4	21,5	25,3	30,3	29,4	31,2	34,1	32,3	35,9
60 à 79 ans	18,4	17,6	19,2	23,4	22,0	24,8	29,2	27,3	31,1	35,1	32,2	38,0
6 à 79 ans	14,2	13,6	14,8	20,6	19,8	21,4	28,0	27,0	29,0	31,8	29,7	33,9
Hommes												
6 à 11 ans	5,7	5,3	6,1	8,9	7,5	10,3	15,6	13,4	17,8	21,0	18,1	23,9
12 à 19 ans	8,0	7,5	8,5	11,5	10,5	12,5	17,2	15,3	19,1	20,7	17,4	24,0
20 à 39 ans	13,0	11,9	14,1	18,3	16,7	19,9	25,2	22,9	27,5	27,9	23,9	31,9
40 à 59 ans	16,0	14,6	17,4	22,0	19,3	24,7	29,9	27,0	32,8	30,8	27,1	34,5
60 à 79 ans	16,8	15,2	18,4	22,0	20,9	23,1	27,7	24,7	30,7	30,7	25,3	36,1
6 à 79 ans	13,5	12,8	14,2	19,2	18,4	20,0	25,8	24,4	27,2	30,0	28,7	31,3
Femmes												
6 à 11 ans	6,6	6,1	7,1	10,2	9,0	11,4	17,4	14,7	20,1	20,2	17,7	22,7
12 à 19 ans	11,4	10,0	12,8	16,3	14,6	18,0	21,8	18,7	24,9	26,7	23,4	30,0
20 à 39 ans	14,5	12,6	16,4	21,2	18,7	23,7	29,0	25,4	32,6	36,7	31,0	42,4
40 à 59 ans	18,4	16,9	19,9	25,1	22,5	27,7	31,2	30,0	32,4	35,4	31,9	38,9
60 à 79 ans	19,1	18,3	19,9	25,4	24,2	26,6	31,0	28,2	33,8	36,2	34,0	38,4
6 à 79 ans	15,2	14,3	16,1	22,0	20,8	23,2	29,3	28,1	30,5	34,6	32,2	37,0

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.