

Tableau 47
Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de triglycérides dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de triglycérides dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
millimoles par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,76	0,70	0,82	0,30	0,25	0,35	0,36	0,32	0,40	0,49	0,45	0,53
12 à 19 ans	0,94	0,88	1,00	0,38	0,33	0,43	0,45	0,41	0,49	0,59	0,54	0,64
20 à 39 ans	1,16	1,07	1,25	0,43	0,30	0,56	0,52	0,45	0,59	0,70	0,67	0,73
40 à 59 ans	1,40	1,27	1,52	0,46	0,41	0,51	0,54	0,49	0,59	0,83	0,76	0,90
60 à 79 ans	1,60	1,50	1,70	0,61	0,54	0,68	0,74	0,69	0,79	0,99	0,93	1,05
6 à 19 ans	0,87	0,82	0,92	0,33	0,29	0,37	0,40	0,35	0,45	0,53	0,49	0,57
20 à 79 ans	1,35	1,26	1,44	0,47	0,43	0,51	0,56	0,51	0,61	0,77	0,74	0,80
6 à 79 ans	1,26	1,18	1,34	0,43	0,38	0,48	0,51	0,48	0,54	0,73	0,70	0,76
Hommes												
6 à 11 ans	0,72	0,66	0,78	0,27	0,22	0,32	0,32	0,26	0,38	0,44	0,36	0,52
12 à 19 ans	0,92	0,81	1,03	0,28	0,21	0,35	0,39	0,33	0,45	0,56	0,47	0,65
20 à 39 ans	1,26	1,11	1,40	0,48	0,35	0,61	0,60	0,48	0,72	0,73	0,65	0,81
40 à 59 ans	1,46	1,30	1,61	0,46	0,41	0,51	0,53	0,44	0,62	0,92	0,79	1,05
60 à 79 ans	1,66	1,50	1,82	0,63	0,56	0,70	0,74	0,70	0,78	1,03	0,85	1,21
6 à 19 ans	0,84	0,77	0,91	0,28	0,23	0,33	0,36	0,31	0,41	0,50	0,43	0,57
20 à 79 ans	1,42	1,31	1,53	0,48	0,42	0,54	0,61	0,53	0,69	0,83	0,75	0,91
6 à 79 ans	1,31	1,21	1,40	0,42	0,37	0,47	0,51	0,47	0,55	0,73	0,70	0,76
Femmes												
6 à 11 ans	0,81	0,73	0,89	0,37	0,33	0,41	0,41	0,35	0,47	0,51	0,46	0,56
12 à 19 ans	0,96	0,88	1,04	0,44	0,41	0,47	0,48	0,44	0,52	0,62	0,54	0,70
20 à 39 ans	1,07	0,96	1,17	0,33 ^E	0,18	0,48	0,50	0,42	0,58	0,67	0,63	0,71
40 à 59 ans	1,34	1,17	1,51	0,46	0,36	0,56	0,54	0,46	0,62	0,76	0,66	0,86
60 à 79 ans	1,54	1,38	1,70	0,60	0,49	0,71	0,74	0,61	0,87	0,97	0,89	1,05
6 à 19 ans	0,90	0,85	0,95	0,41	0,36	0,46	0,46	0,43	0,49	0,58	0,53	0,63
20 à 79 ans	1,28	1,18	1,38	0,45	0,38	0,52	0,54	0,49	0,59	0,74	0,70	0,78
6 à 79 ans	1,21	1,13	1,30	0,44	0,39	0,49	0,51	0,48	0,54	0,71	0,67	0,75

	Concentration de triglycérides dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
millimoles par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,67	0,60	0,74	0,97	0,89	1,05	1,28	1,21	1,35	1,50	1,35	1,65
12 à 19 ans	0,83	0,75	0,91	1,12	1,06	1,18	1,60	1,36	1,84	2,05	1,85	2,25
20 à 39 ans	0,96	0,89	1,03	1,53	1,38	1,68	1,94	1,68	2,20	2,37	1,99	2,75
40 à 59 ans	1,21	1,08	1,34	1,79	1,57	2,01	2,45	2,24	2,66	2,97	2,60	3,34
60 à 79 ans	1,39	1,30	1,48	1,92	1,73	2,11	2,76	2,29	3,23	3,29	2,91	3,67
6 à 19 ans	0,77	0,72	0,82	1,07	1,02	1,12	1,43	1,33	1,53	1,84	1,62	2,06
20 à 79 ans	1,14	1,05	1,23	1,69	1,57	1,81	2,38	2,17	2,59	2,89	2,56	3,22
6 à 79 ans	1,05	1,00	1,10	1,62	1,52	1,72	2,28	2,05	2,51	2,68	2,35	3,01
Hommes												
6 à 11 ans	0,65	0,57	0,73	0,91	0,80	1,02	1,16	1,07	1,25	1,39	1,23	1,55
12 à 19 ans	0,78	0,67	0,89	1,12	1,01	1,23	1,60	1,11	2,09	2,07	1,65	2,49
20 à 39 ans	1,01	0,83	1,19	1,63	1,45	1,81	2,10	1,77	2,43	2,67	2,13	3,21
40 à 59 ans	1,26	1,02	1,50	1,86	1,58	2,14	2,39	2,23	2,55	2,78	2,37	3,19
60 à 79 ans	1,47	1,27	1,67	2,06	1,85	2,27	2,96	2,58	3,34	3,29	3,03	3,55
6 à 19 ans	0,74	0,67	0,81	1,06	1,00	1,12	1,43	1,20	1,66	1,88	1,42	2,34
20 à 79 ans	1,24	1,10	1,38	1,79	1,64	1,94	2,39	2,21	2,57	2,95	2,68	3,22
6 à 79 ans	1,09	1,01	1,17	1,69	1,56	1,82	2,33	2,13	2,53	2,82	2,51	3,13
Femmes												
6 à 11 ans	0,71	0,65	0,77	0,99	0,86	1,12	1,33	1,16	1,50	1,55	1,13	1,97
12 à 19 ans	0,85	0,75	0,95	1,11	0,97	1,25	1,60	1,34	1,86	1,92	1,71	2,13
20 à 39 ans	0,92	0,81	1,03	1,38	1,19	1,57	1,76	1,41	2,11	2,26	1,87	2,65
40 à 59 ans	1,13	0,97	1,29	1,76	1,45	2,07	2,55	2,05	3,05	3,03	2,59	3,47
60 à 79 ans	1,31	1,24	1,38	1,82	1,57	2,07	2,52	2,01	3,03	3,40	2,54	4,26
6 à 19 ans	0,80	0,73	0,87	1,09	0,99	1,19	1,49	1,36	1,62	1,78	1,54	2,02
20 à 79 ans	1,09	0,99	1,19	1,62	1,49	1,75	2,32	1,97	2,67	2,70	2,23	3,17
6 à 79 ans	1,01	0,93	1,09	1,50	1,39	1,61	2,20	1,85	2,55	2,64	2,22	3,06

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de triglycérides dans le sérum, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.