

Tableau 48

Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de lipoprotéines de basse densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de lipoprotéines de basse densité dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,31	2,19	2,43	1,29	1,11	1,47	1,54	1,39	1,69	1,82	1,67	1,97
12 à 19 ans	2,30	2,14	2,45	1,15	0,96	1,34	1,40	1,31	1,49	1,80	1,67	1,93
20 à 39 ans	2,82	2,74	2,90	1,40	1,19	1,61	1,69	1,51	1,87	2,15	2,07	2,23
40 à 59 ans	3,19	3,07	3,32	1,56	1,33	1,79	1,96	1,74	2,18	2,46	2,34	2,58
60 à 79 ans	3,14	3,04	3,23	1,58	1,40	1,76	1,80	1,57	2,03	2,34	2,20	2,48
6 à 19 ans	2,30	2,20	2,41	1,26	1,13	1,39	1,44	1,35	1,53	1,82	1,72	1,92
20 à 79 ans	3,04	2,97	3,11	1,51	1,33	1,69	1,80	1,63	1,97	2,31	2,22	2,40
6 à 79 ans	2,90	2,83	2,97	1,41	1,28	1,54	1,66	1,54	1,78	2,16	2,10	2,22
Hommes												
6 à 11 ans	2,34	2,21	2,46	1,44	1,31	1,57	1,54	1,43	1,65	1,84	1,66	2,02
12 à 19 ans	2,28	2,12	2,43	1,31	1,01	1,61	1,41	1,27	1,55	1,80	1,65	1,95
20 à 39 ans	3,05	2,95	3,15	1,69	1,55	1,83	1,93	1,79	2,07	2,39	2,25	2,53
40 à 59 ans	3,23	3,07	3,40	1,64	1,28	2,00	1,89	1,49	2,29	2,49	2,33	2,65
60 à 79 ans	3,14	2,93	3,34	1,37	1,06	1,68	1,75	1,47	2,03	2,26	2,03	2,49
6 à 19 ans	2,30	2,19	2,41	1,33	1,20	1,46	1,48	1,36	1,60	1,83	1,73	1,93
20 à 79 ans	3,14	3,04	3,25	1,65	1,48	1,82	1,89	1,74	2,04	2,43	2,31	2,55
6 à 79 ans	2,98	2,89	3,07	1,50	1,33	1,67	1,74	1,62	1,86	2,25	2,12	2,38
Femmes												
6 à 11 ans	2,28	2,12	2,45	1,19	0,92	1,46	1,42	1,09	1,75	1,78	1,61	1,95
12 à 19 ans	2,32	2,11	2,53	1,11	0,92	1,30	1,40	1,20	1,60	1,81	1,59	2,03
20 à 39 ans	2,58	2,43	2,74	1,31	1,01	1,61	1,43	1,19	1,67	2,04	1,91	2,17
40 à 59 ans	3,15	2,99	3,31	1,56	1,16	1,96	1,99	1,75	2,23	2,43	2,22	2,64
60 à 79 ans	3,14	3,07	3,21	1,62	1,45	1,79	1,97	1,65	2,29	2,41	2,28	2,54
6 à 19 ans	2,31	2,15	2,46	1,12	0,99	1,25	1,40	1,25	1,55	1,79	1,63	1,95
20 à 79 ans	2,94	2,85	3,02	1,40	1,24	1,56	1,68	1,47	1,89	2,19	2,12	2,26
6 à 79 ans	2,82	2,75	2,90	1,35	1,23	1,47	1,60	1,45	1,75	2,11	2,05	2,17

	Concentration de lipoprotéines de basse densité dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,25	2,12	2,38	2,74	2,58	2,90	3,25	3,13	3,37	3,49	3,33	3,65
12 à 19 ans	2,19	2,03	2,35	2,79	2,61	2,97	3,14	2,92	3,36	3,53	3,28	3,78
20 à 39 ans	2,71	2,58	2,84	3,48	3,33	3,63	4,13	3,77	4,49	4,48	4,24	4,72
40 à 59 ans	3,18	3,08	3,28	3,84	3,62	4,06	4,44	4,16	4,72	4,95	4,58	5,32
60 à 79 ans	3,11	2,96	3,26	3,84	3,68	4,00	4,49	4,30	4,68	4,97	4,60	5,34
6 à 19 ans	2,22	2,10	2,34	2,76	2,63	2,89	3,17	3,05	3,29	3,53	3,35	3,71
20 à 79 ans	2,95	2,84	3,06	3,68	3,59	3,77	4,35	4,24	4,46	4,80	4,56	5,04
6 à 79 ans	2,78	2,70	2,86	3,56	3,47	3,65	4,22	4,11	4,33	4,67	4,49	4,85
Hommes												
6 à 11 ans	2,26	2,10	2,42	2,74	2,57	2,91	3,17	2,98	3,36	3,43	3,12	3,74
12 à 19 ans	2,17	1,96	2,38	2,81	2,62	3,00	3,13	2,85	3,41	3,53	3,31	3,75
20 à 39 ans	2,88	2,66	3,10	3,68	3,44	3,92	4,35	4,00	4,70	4,59	4,30	4,88
40 à 59 ans	3,25	3,02	3,48	3,94	3,65	4,23	4,47	4,23	4,71	4,85	4,45	5,25
60 à 79 ans	3,11	2,77	3,45	3,96	3,68	4,24	4,53	4,22	4,84	4,97	4,48	5,46
6 à 19 ans	2,24	2,11	2,37	2,76	2,62	2,90	3,15	3,00	3,30	3,53	3,33	3,73
20 à 79 ans	3,13	2,91	3,35	3,75	3,57	3,93	4,43	4,30	4,56	4,80	4,63	4,97
6 à 79 ans	2,85	2,74	2,96	3,65	3,52	3,78	4,35	4,22	4,48	4,70	4,54	4,86
Femmes												
6 à 11 ans	2,22	2,02	2,42	2,74	2,49	2,99	3,28	3,09	3,47	3,50	3,23	3,77
12 à 19 ans	2,22	1,99	2,45	2,79	2,56	2,92	3,16	2,87	3,45	3,67	3,22	4,12
20 à 39 ans	2,43	2,26	2,60	3,06	2,81	3,31	3,80	3,50	4,10	4,30	3,84	4,76
40 à 59 ans	3,15	2,98	3,32	3,80	3,56	4,04	4,34	3,88	4,80	5,06	4,56	5,56
60 à 79 ans	3,11	2,99	3,23	3,80	3,65	3,95	4,44	4,13	4,75	4,97	4,53	5,41
6 à 19 ans	2,22	2,04	2,40	2,76	2,60	2,92	3,27	3,09	3,45	3,62	3,32	3,92
20 à 79 ans	2,82	2,68	2,96	3,59	3,48	3,70	4,19	3,93	4,45	4,80	4,36	5,24
6 à 79 ans	2,71	2,59	2,83	3,45	3,35	3,55	4,08	3,89	4,27	4,66	4,32	5,00

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de lipoprotéines de basse densité dans le sérum, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.