

La vaste majorité des Canadiens de 12 ans et plus (91 % en 2008) sont satisfaits ou très satisfaits de leur vie. La plupart d'entre eux se considèrent en très bonne ou en excellente santé. En 2008, 59 % des Canadiens ont dit être en très bonne ou en excellente santé. Ce taux se situait à 67 % chez les 20 à 34 ans, et à 39 % chez les 65 ans et plus.

En 2008, 54 % des gens qui n'étaient pas satisfaits de leur vie ont dit avoir un état de santé passable ou médiocre. Plusieurs Canadiens ont des problèmes de santé chroniques (hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, cancer, asthme, diabète et obésité). Puisque la population vieillit, d'autres maladies chroniques, comme l'arthrite, affectent davantage de gens.

L'espérance de vie à la naissance était de 80,8 ans en 2006 et de 78,4 ans en 1996. Une femme née en 2006 peut espérer vivre jusqu'à 83,0 ans, et un homme, jusqu'à 78,4 ans. Quant à la durée de vie moyenne, l'écart entre les hommes et les femmes s'est rétréci, passant de 5,7 ans en 1995 à 4,6 ans en 2006.

Les taux de mortalité sont restés stables de 2001 à 2005 (7,1 décès pour 1 000 personnes). Au cours des derniers 25 ans, les causes principales de décès ont été les maladies du système circulatoire et le cancer. Ces maladies sont plus répandues chez une population vieillissante; en 2005, celles-ci ont été responsables de 6 décès sur 10.

### Habitudes liées à une meilleure santé


En 2008, près de 51 % des Canadiens de 12 ans et plus étaient au moins modérément actifs durant leurs loisirs, par rapport à environ 52 % en 2003.

Aujourd'hui, de bonnes habitudes alimentaires signifient manger plus de fruits et de légumes. En 2008, 44 % des 12 ans et plus consommaient des fruits et des légumes cinq fois par jour ou plus, en hausse par rapport à 41 % en 2003 et à 38 % en 2001.

### Diète et exercice

Une diète équilibrée et l'activité physique peuvent réduire le risque de contracter

**Graphique 24.1**  
Satisfaction à l'égard de la vie selon la perception de l'état de santé, 2008



Source : Statistique Canada, produit n° 82-221-X au catalogue.

le diabète de type 2. En 2008, 5,9 % des Canadiens de 12 ans et plus ont dit être atteints de diabète (tous types confondus), en hausse par rapport à 2003 (4,6 %). Les taux de diabète augmentent avec l'âge (16,0 % chez les aînés de 65 ans et plus).

En 2008, 24 % des hommes et environ 10 % des femmes ont dit consommer trop d'alcool (cinq verres ou plus en une même occasion, au moins 12 fois par année). En 2003, ces pourcentages se situaient à 29 % chez les hommes et à 12 % chez les femmes. En 2008, les hommes de 18 à 19 ans (44 %) et ceux de 20 à 34 ans (39 %) étaient les plus enclins à manifester ces comportements.

Le tabagisme est un facteur de risque du cancer du poumon, des maladies du cœur, des accidents vasculaires cérébraux et d'autres problèmes de santé. En 2008, 21 % des Canadiens de 12 ans et plus fumaient tous les jours ou à l'occasion. En outre, 1 homme sur 3 et 1 femme sur 4 de 20 à 34 ans fumaient en 2008.

La majorité des dépenses publiques au chapitre des services de santé vont aux hôpitaux, aux médicaments et aux médecins.

**Tableau 24.a**  
Certains indicateurs de la santé, 2008

	2008		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	% de la population		
Arthrite	15,3	12,0	18,5
Diabète	5,9	6,3	5,4
Asthme	8,4	7,3	9,5
Hypertension	16,4	15,9	16,9
Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion	21,4	24,3	18,5
IMC (18 ans et plus), embonpoint ou obésité	51,1	58,6	43,5
IMC (12 à 17 ans), embonpoint ou obésité	19,3	23,9	14,5
Vaccination contre la grippe, il y a moins d'un an	31,7	28,3	34,9


Notes : Population de 12 ans et plus.

IMC = Indice de masse corporelle.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

Les administrations fédérale, provinciales, territoriales et municipales ont dépensé 114,2 milliards de dollars au chapitre des services de santé en 2008, soit un peu plus du double par rapport à 1998 (56,8 milliards de dollars). L'ensemble des dépenses gouvernementales liées aux services de santé ont grimpé de presque 56 % pendant cette période.

**Graphique 24.2**  
Certains indicateurs de la santé, 2008



Note : Population de 12 ans et plus.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

## Des dents naturelles plus longtemps


Les récents progrès en dentisterie permettent à un plus grand nombre de personnes de garder leurs dents toute leur vie.

De 2007 à 2009, la proportion de Canadiens de 20 à 79 ans ayant dit avoir des dents naturelles atteignait 93 %, alors qu'environ 7 % n'avaient pas de dents naturelles. Aucun changement notable n'a été observé par rapport à 2003.

Il s'agit cependant d'une baisse marquée par rapport à 1990, alors que 17 % des adultes ont déclaré n'avoir aucune dent naturelle; cette diminution coïncide avec l'utilisation généralisée de fluorures au Canada et l'accès amélioré aux soins dentaires.

La perte complète des dents naturelles s'observe surtout chez les adultes de 40 ans et plus. En 2009, moins de 1 % des personnes 20 à 39 ans avaient perdu toutes leurs dents. Chez les 40 à 59 ans, un peu

**Graphique 24.3**  
Population à domicile sans dents naturelles selon le groupe d'âge



1. En 2009, < 1 %.

2. En 2009, à utiliser avec prudence.

Source : Statistique Canada, produit n° 82-625-X au catalogue.

plus de 4 % n'avaient pas de dents naturelles. Le taux augmente de façon marquée chez les Canadiens de 60 à 79 ans. Dans ce groupe d'âge, 22 % des hommes et 21 % des femmes n'avaient aucune dent naturelle.


## L'obésité en milieu de travail

Le taux d'obésité a augmenté constamment chez les travailleurs. De fait, l'auto-évaluation du poids et de la taille révèle que ce taux est passé de 12 % au milieu des années 1990 pour atteindre 16 % en 2005, alors que plus de 2 millions de Canadiens de 18 à 64 ans ayant un emploi étaient obèses, c'est-à-dire qu'ils avaient un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus. Les taux sont plus élevés lorsque la taille et le poids sont mesurés par les chercheurs.

La prévalence de l'obésité est plus élevée chez les travailleurs âgés (55 à 64 ans). En 2005, 21 % d'entre eux étaient obèses, contre 17 % en 1994-1995. Le profil est le même pour les deux sexes, la prévalence étant toutefois plus élevée chez les hommes.

Un faible niveau de scolarité est associé à l'obésité tant chez les hommes que chez les femmes. Le faible revenu est corrélé à l'obésité chez les femmes, tandis que le

**Graphique 24.4**  
Taux d'obésité et d'excès de poids des travailleurs et des travailleuses, 2005



Note : Population de 18 à 64 ans.

Source : Statistique Canada, produit n° 75-001-X au catalogue.

revenu élevé l'est chez les hommes. Le travail par postes, trop d'heures de travail et beaucoup de stress au travail sont également des facteurs de l'obésité.

**Tableau 24.1 Taux de mortalité selon certaines causes de décès et le sexe, 2001 et 2005**

	2001			2005		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	taux pour 100 000 personnes					
<b>Ensemble des causes de décès</b>	<b>600,8</b>	<b>756,4</b>	<b>483,2</b>	<b>563,7</b>	<b>696,7</b>	<b>460,7</b>
Septicémie	3,8	4,4	3,3	4,1	4,8	3,6
Hépatite virale	0,9	1,1	0,7	1,0	1,3	0,6
Maladies attribuables au virus de l'immunodéficience humaine	1,3	2,2	0,4	1,3	2,1	0,6
Tumeurs malignes	178,7	223,8	147,6	170,3	207,7	143,8
Côlon, rectum et anus	18,4	22,8	14,9	18,6	23,7	14,6
Pancréas	8,9	10,3	7,8	8,8	9,8	7,8
Trachée, bronches et poumon	47,3	64,6	34,4	46,2	59,8	36,0
Sein	13,9	0,3	24,9	12,5	0,3	22,6
Prostate <sup>1</sup>	...	26,6	...	...	21,9	...
Diabète sucré	19,3	23,0	16,4	19,1	23,7	15,6
Maladie d'Alzheimer	13,9	12,5	14,5	12,7	10,7	13,6
Maladies du cœur	143,1	189,7	107,6	121,5	160,1	91,5
Cardiopathies ischémiques	110,6	152,8	78,4	91,0	125,1	64,5
Autres cardiopathies	29,8	34,5	26,2	27,7	32,6	23,9
Maladies cérébrovasculaires	40,4	44,6	37,1	32,5	35,2	30,2
Grippe et pneumopathie	12,2	15,7	10,3	13,2	15,8	11,5
Grippe	0,2	0,3	0,2	1,5	1,6	1,5
Pneumopathie	12,0	15,4	10,1	11,7	14,3	10,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	26,3	38,0	19,4	25,1	34,1	19,8
Maladies chroniques et cirrhoses du foie	6,5	9,0	4,2	6,1	8,5	3,9
Maladie du foie en raison de l'abus d'alcool	3,2	5,0	1,5	3,0	4,6	1,6
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie	3,3	4,0	2,6	3,0	3,9	2,3
Insuffisance rénale	8,3	11,4	6,5	8,3	11,3	6,5
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	4,0	4,5	3,5	4,4	4,7	4,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	3,3	3,6	3,0	3,2	3,4	3,1
Accidents (blessures involontaires)	25,1	35,3	15,6	25,6	35,6	16,5
Accidents de véhicule à moteur	8,3	11,9	4,7	9,2	13,1	5,4
Chutes	4,6	6,1	3,4	5,4	7,2	4,0
Empoisonnement accidentel par des substances nocives et exposition à des substances nocives	3,0	4,2	1,7	3,0	4,2	1,8
Suicide	11,4	18,0	5,0	10,9	16,9	5,1
Homicide	1,5	2,2	0,8	1,9	2,8	0,9

**Note :** Les taux sont normalisés selon l'âge pour 100 000 personnes.

1. Aucun taux global n'a été calculé pour les causes de décès propres à un seul des deux sexes.

**Source :** Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0552.

**Tableau 24.2** Espérance de vie à la naissance et à 65 ans selon le sexe, par province et territoire, 2006

	À la naissance		À 65 ans	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	années			
<b>Canada</b>	<b>78,4</b>	<b>83,0</b>	<b>18,2</b>	<b>21,4</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	75,6	80,8	16,1	19,5
Île-du-Prince-Édouard	77,3	82,2	17,3	20,7
Nouvelle-Écosse	77,0	82,2	17,1	20,4
Nouveau-Brunswick	77,7	82,4	17,7	20,8
Québec	78,3	83,3	18,1	21,6
Ontario	78,9	83,2	18,4	21,3
Manitoba	76,8	81,7	17,6	20,8
Saskatchewan	76,8	82,0	17,7	21,2
Alberta	78,1	82,9	18,3	21,5
Colombie-Britannique	79,2	83,6	19,1	21,8
Territoires <sup>1</sup>	73,1	78,9	15,2	19,1

1. Comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0511.

**Tableau 24.3** Bénéficiaires dans les établissements de soins pour personnes âgées selon le sexe, par province et territoire, 2002-2003 et 2007-2008

	2002-2003			2007-2008		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	nombre					
<b>Canada<sup>1</sup></b>	<b>177 252</b>	<b>41 598</b>	<b>102 978</b>	<b>161 639</b>	<b>47 509</b>	<b>114 130</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	3 933	1 334	2 599	4 853	1 468	3 385
Île-du-Prince-Édouard	1 616	487	1 129	1 752	469	1 283
Nouvelle-Écosse	6 538	1 721	4 817	6 489	1 705	4 784
Nouveau-Brunswick	5 727	1 732	3 995	6 660	2 008	4 652
Québec <sup>1</sup>	32 676	..	..	..	..	..
Ontario	75 391	20 736	54 655	83 747	23 952	59 795
Manitoba	9 182	2 706	6 476	9 583	2 791	6 792
Saskatchewan	8 619	2 728	5 891	8 017	2 462	5 555
Alberta	13 949	4 483	9 466	17 018	5 386	11 632
Colombie-Britannique	19 411	5 606	13 805	23 269	7 173	16 096
Territoires <sup>2</sup>	210	65	145	251	95	156

Notes : Les données sont en date du 31 mars.

Il s'agit d'établissements dont le groupe prédominant de bénéficiaires sont majoritairement des personnes âgées; la population de ces établissements n'est toutefois pas exclusivement âgée.

1. Les données du Québec proviennent des sources administratives du Ministère de la santé et des services sociaux; ces sources ne fournissent pas la répartition des résidents selon l'âge et le sexe. Par conséquent, les totaux des hommes et des femmes pour le Canada excluent le Québec.

2. Comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 107-5504.

**Tableau 24.4 Auto-évaluation de l'état de santé, excellent ou très bon, selon le sexe, années sélectionnées, 2003 à 2008**

	2003	2005	2007	2008
	% d'hommes			
<b>Canada</b>	<b>59,5</b>	<b>60,6</b>	<b>60,3</b>	<b>59,1</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	63,6	62,8	61,1	57,2
Île-du-Prince-Édouard	67,9	54,1	56,7	63,0
Nouvelle-Écosse	55,9	56,2	55,4	57,2
Nouveau-Brunswick	49,5	54,3	53,5	53,6
Québec	58,7	60,0	60,1	59,1
Ontario	58,3	61,7	61,4	59,3
Manitoba	61,3	60,5	60,4	55,2
Saskatchewan	59,3	58,7	57,3	53,2
Alberta	66,3	61,7	60,4	64,9
Colombie-Britannique	60,9	60,5	60,2	58,0
Yukon	60,7	56,2	58,1	60,9
Territoires du Nord-Ouest	60,0	63,1	51,6	50,5
Nunavut	57,6	49,9	63,0	55,0
	% de femmes			
<b>Canada</b>	<b>57,3</b>	<b>59,6</b>	<b>59,0</b>	<b>58,7</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	68,7	65,7	63,5	65,6
Île-du-Prince-Édouard	62,0	61,5	61,7	60,4
Nouvelle-Écosse	60,3	59,2	58,8	55,4
Nouveau-Brunswick	51,1	54,4	56,0	56,2
Québec	55,1	58,9	58,6	59,5
Ontario	56,2	60,0	58,6	59,4
Manitoba	60,5	57,7	59,5	53,1
Saskatchewan	59,1	57,8	55,3	55,0
Alberta	61,6	62,9	64,8	61,0
Colombie-Britannique	59,3	58,5	57,2	55,9
Yukon	49,6	57,3	54,9	60,4
Territoires du Nord-Ouest	52,0	63,1	52,7	46,8
Nunavut	56,5	50,3	51,6	43,1

**Note :** Population de 12 ans et plus.

**Source :** Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

**Tableau 24.5 Activités physiques durant les loisirs selon le groupe d'âge et le sexe, années sélectionnées, 2003 à 2008**

	2003	2005	2007	2008
	%			
<b>Les deux sexes</b>	<b>51,8</b>	<b>52,2</b>	<b>50,4</b>	<b>50,6</b>
12 à 19 ans	72,0	71,1	70,5	69,2
20 à 34 ans	54,6	55,5	53,1	52,9
35 à 44 ans	49,2	48,8	47,0	47,1
45 à 64 ans	47,5	48,2	46,8	47,6
65 ans et plus	41,4	43,0	41,3	42,6
<b>Hommes</b>	<b>55,1</b>	<b>54,8</b>	<b>53,4</b>	<b>54,5</b>
12 à 19 ans	77,3	76,9	75,3	77,2
20 à 34 ans	58,8	57,9	56,9	56,7
35 à 44 ans	50,2	48,9	47,6	49,0
45 à 64 ans	48,0	48,6	47,8	49,0
65 ans et plus	49,6	50,2	47,2	50,2
<b>Femmes</b>	<b>48,6</b>	<b>49,7</b>	<b>47,6</b>	<b>46,8</b>
12 à 19 ans	66,5	65,1	65,6	60,9
20 à 34 ans	50,5	53,0	49,2	49,0
35 à 44 ans	48,3	48,7	46,5	45,2
45 à 64 ans	47,0	47,7	45,8	46,2
65 ans et plus	35,2	37,5	36,5	36,5

**Note :** Personnes de 12 ans et plus qui sont actives ou modérément actives durant leurs loisirs.

**Source :** Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

**Tableau 24.6 Douleurs ou malaises qui empêchent les activités selon le groupe d'âge et le sexe, années sélectionnées, 2003 à 2008**

	2003	2005	2007	2008
	%			
<b>Les deux sexes</b>	<b>10,6</b>	<b>11,0</b>	<b>11,8</b>	<b>12,4</b>
12 à 19 ans	3,3	2,5	2,9	3,4
20 à 34 ans	6,0	5,6	6,6	7,3
35 à 44 ans	10,2	10,3	11,0	10,4
45 à 64 ans	14,2	15,2	16,1	16,7
65 ans et plus	18,1	19,7	19,4	20,7
<b>Hommes</b>	<b>8,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,5</b>	<b>10,1</b>
12 à 19 ans	1,5 <sup>E</sup>	2,1 <sup>E</sup>	1,5 <sup>E</sup>	1,9 <sup>E</sup>
20 à 34 ans	4,4 <sup>E</sup>	5,3	5,6	5,9
35 à 44 ans	9,8	9,2	9,3	8,9
45 à 64 ans	10,7	12,9	13,3	14,2
65 ans et plus	13,0	13,7	15,3	16,7
<b>Femmes</b>	<b>13,1</b>	<b>13,0</b>	<b>14,1</b>	<b>14,7</b>
12 à 19 ans	5,2	2,9 <sup>E</sup>	4,3	5,0
20 à 34 ans	7,6	5,8	7,7	8,8
35 à 44 ans	10,5	11,5	12,6	11,9
45 à 64 ans	17,6	17,5	18,8	19,2
65 ans et plus	22,2	24,4	22,8	23,9

**Note :** Population de 12 ans et plus.

**Source :** Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

**Tableau 24.7 Usage du tabac et exposition à la fumée secondaire selon le sexe, par province, 2008**

	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse
	%			
<b>Fumeurs quotidiens ou occasionnels<sup>1</sup></b>	<b>21,4</b>	<b>24,6</b>	<b>21,1</b>	<b>23,5</b>
Hommes	24,3	27,1	23,7	26,4
Femmes	18,5	22,2	18,6	20,9
<b>Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire au domicile<sup>2</sup></b>	<b>6,6</b>	<b>7,7</b>	<b>8,3</b>	<b>7,0</b>
Hommes	7,3	10,4	8,2 <sup>E</sup>	7,7
Femmes	6,0	5,4 <sup>E</sup>	8,4 <sup>E</sup>	6,4
<b>Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans des véhicules<sup>3</sup></b>	<b>7,3</b>	<b>10,4</b>	<b>9,0</b>	<b>10,6</b>
Hommes	8,0	13,3	11,7 <sup>E</sup>	11,9
Femmes	6,7	7,8	6,7 <sup>E</sup>	9,5
<b>Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans des lieux publics<sup>4</sup></b>	<b>9,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0<sup>E</sup></b>	<b>8,1</b>
Hommes	10,5	7,2 <sup>E</sup>	8,0 <sup>E</sup>	9,0
Femmes	9,5	4,9 <sup>E</sup>	4,3 <sup>E</sup>	7,3
<b>Fumeurs priés de s'abstenir de fumer dans la maison</b>	<b>69,3</b>	<b>71,8</b>	<b>72,6</b>	<b>70,5</b>
Hommes	67,7	69,2	72,3	70,5
Femmes	70,9	74,3	73,0	70,5

**Note :** Population de 12 ans et plus.

1. Personnes ayant déclaré qu'elles fumaient tous les jours ou à l'occasion.

2. Personnes ayant déclaré qu'au moins une personne fumait à leur domicile tous les jours ou presque tous les jours.

3. Personnes ayant déclaré avoir été exposées à la fumée secondaire dans des véhicules privés tous les jours ou presque tous les jours au cours du dernier mois.

4. Personnes ayant déclaré avoir été exposées à la fumée secondaire dans des lieux publics tous les jours ou presque tous les jours au cours du dernier mois.

**Source :** Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.



Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique
%						
<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>19,8</b>	<b>24,2</b>	<b>25,1</b>	<b>22,7</b>	<b>18,6</b>
22,9	25,5	23,4	27,3	28,4	25,4	21,6
23,7	21,2	16,4	21,2	22,0	19,8	15,7
<b>8,9</b>	<b>9,7</b>	<b>5,9</b>	<b>7,0</b>	<b>8,1</b>	<b>5,5</b>	<b>3,6</b>
8,6	10,6	6,5	9,1	7,9	6,5	3,7
9,2	8,8	5,4	5,2 <sup>E</sup>	8,2	4,6	3,4
<b>10,0</b>	<b>7,5</b>	<b>6,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>	<b>5,4</b>
11,5	7,8	7,7	10,7	9,3	9,1	5,7
8,6	7,1	6,1	6,6	8,2	8,1	5,1
<b>7,2</b>	<b>8,4</b>	<b>11,3</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,6</b>
8,9	8,8	11,8	10,0	8,2	10,7	10,8
5,6	8,0	10,8	6,7	6,9	10,2	10,4
<b>68,9</b>	<b>54,4</b>	<b>74,2</b>	<b>71,9</b>	<b>66,9</b>	<b>73,6</b>	<b>77,3</b>
68,6	53,6	72,4	68,6	65,9	70,1	76,1
69,1	55,2	75,9	75,0	67,8	77,1	78,6

**Tableau 24.8 Personnes qui ont un médecin régulier, par province et territoire, années sélectionnées, 2003 à 2008**

	2003	2005	2007	2008
	% d'hommes			
<b>Canada</b>	<b>81,8</b>	<b>81,9</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	81,8	83,7	86,0	84,5
Île-du-Prince-Édouard	90,7	87,1	86,1	84,8
Nouvelle-Écosse	93,3	92,3	91,7	92,0
Nouveau-Brunswick	90,3	91,2	89,6	86,9
Québec	67,0	68,5	65,1	66,3
Ontario	89,4	89,1	88,3	88,8
Manitoba	79,7	80,1	79,4	77,9
Saskatchewan	80,9	79,4	78,4	77,9
Alberta	78,1	76,4	75,2	74,9
Colombie-Britannique	86,5	86,4	85,4	83,3
Yukon <sup>1</sup>	76,8	65,8	74,4	73,9
Territoires du Nord-Ouest <sup>1</sup>	37,4	41,4	38,2	30,9
Nunavut (les 10 plus grandes communautés) <sup>1</sup>	F	16,0 <sup>E</sup>	10,4 <sup>E</sup>	9,5 <sup>E</sup>
	% de femmes			
<b>Canada</b>	<b>89,9</b>	<b>89,5</b>	<b>89,2</b>	<b>88,3</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	89,7	90,7	90,4	90,1
Île-du-Prince-Édouard	94,1	92,5	89,8	87,6
Nouvelle-Écosse	96,3	96,8	96,6	96,4
Nouveau-Brunswick	94,4	95,4	94,1	94,6
Québec	81,1	81,5	81,8	78,9
Ontario	94,2	93,2	92,6	93,2
Manitoba	87,9	87,8	89,7	88,2
Saskatchewan	90,2	89,4	90,7	86,5
Alberta	89,8	88,7	88,3	86,2
Colombie-Britannique	92,2	91,6	90,7	90,3
Yukon <sup>1</sup>	86,6	81,8	81,5	84,4
Territoires du Nord-Ouest <sup>1</sup>	55,1	56,9	43,8	44,3
Nunavut (les 10 plus grandes communautés) <sup>1</sup>	F	16,0	16,6 <sup>E</sup>	15,3 <sup>E</sup>

**Note :** Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré avoir un médecin régulier. En 2005 et 2003, en français, l'indicateur se limitait aux médecins de famille. À compter de 2007, il a été élargi pour devenir « médecin régulier », qui inclut les médecins de famille.

1. Des ajustements introduits à la méthode de pondération des données du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut à partir des périodes de références de 2008 et 2007-2008 peuvent affecter la comparabilité aux périodes de référence précédentes.

**Source :** Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

**Tableau 24.9 Temps d'attente pour des services spécialisés de la santé selon le type de service, années sélectionnées, 2001 à 2007**

	2001	2003	2005 <sup>1</sup>	2007
	%			
<b>Visites chez un spécialiste<sup>2</sup></b>				
Moins d'un mois	46,4	47,9	46,0	45,6
1 à 3 mois	41,9	40,7	41,1	40,5
Plus de 3 mois	11,7	11,4	12,9	13,9
<b>Chirurgies non urgentes<sup>3</sup></b>				
Moins d'un mois	39,5	40,5	40,3	40,7
1 à 3 mois	41,3	42,1	40,7	41,0
Plus de 3 mois	19,2	17,4	19,0	18,3
<b>Tests diagnostiques<sup>4</sup></b>				
Moins d'un mois	54,7	57,5	56,4	55,4
1 à 3 mois	36,1	31,1	33,3	34,1
Plus de 3 mois	9,1 <sup>E</sup>	11,5	10,2	10,5

1. Les territoires sont inclus seulement en 2005.

2. Comprend les visites chez un spécialiste pour un nouveau problème de santé.

3. Comprend l'intervention chirurgicale planifiée et pratiquée en clinique externe ou nécessitant une hospitalisation. Ne se rapporte pas à une intervention chirurgicale pratiquée à la suite d'une admission à l'urgence d'un hôpital, par exemple, à la suite d'un accident ou d'une situation mettant dans l'immédiat la vie en danger.

4. Comprend certains tests diagnostiques (imagerie par résonance magnétique (IRM), tomomodensitométrie (CT-scan) et angiographie non urgentes).

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 105-3002, 105-3003 et 105-3004.

**Tableau 24.10 Dépenses en immobilisations et en réparations du secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, par province et territoire, 1998, 2003 et 2008**

	1998	2003	2008 <sup>P</sup>
	millions de \$		
<b>Canada</b>	<b>2 893,5</b>	<b>6 965,8</b>	<b>9 578,4</b>
Terre-Neuve-et-Labrador	69,0	89,9	124,2
Île-du-Prince-Édouard	11,7	x	27,8
Nouvelle-Écosse	41,0	199,6	196,3
Nouveau-Brunswick	57,7	82,9	146,9
Québec	859,7	1 421,1	2 014,9
Ontario	980,9	3 048,1	3 375,8
Manitoba	104,9	253,6	204,2
Saskatchewan	171,6	155,8	273,9
Alberta	255,3	853,7	1 645,7
Colombie-Britannique	319,8	749,7	1 530,4
Yukon	4,0	4,0	4,9
Territoires du Nord-Ouest (incluant le Nunavut) <sup>1</sup>	17,8	..	..
Territoires du Nord-Ouest	..	12,8	20,6
Nunavut	..	x	12,9

1. Le Nunavut est devenu un territoire en 1999.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 029-0005.

**Tableau 24.11 Dépenses au chapitre de la santé, 2005 à 2009**

	2005	2006	2007	2008 <sup>1</sup>	2009 <sup>1</sup>
	millions de \$				
<b>Dépenses au chapitre de la santé</b>	<b>141 061,1</b>	<b>151 405,0</b>	<b>160 973,5</b>	<b>173 585,1</b>	<b>183 120,9</b>
Hôpitaux	40 373,5	42 957,6	45 383,4	48 490,9	50 947,8
Autres établissements	14 665,4	15 790,9	16 417,6	17 397,3	18 276,3
Médecins	18 534,6	20 027,2	21 529,6	23 555,9	25 634,1
Autres professionnels	15 182,6	16 236,4	17 342,9	18 881,8	20 013,0
Services dentaires	9 827,0	10 306,4	11 113,4	12 126,0	12 790,4
Services de soins de la vue	3 182,9	3 444,0	3 769,9	4 057,0	4 388,1
Autres	2 172,6	2 485,9	2 459,6	2 698,8	2 834,5
Médicaments	23 257,4	25 186,3	26 531,4	28 549,1	29 996,4
Médicaments sur ordonnance	19 173,3	20 901,8	22 052,6	24 023,8	25 378,1
Médicaments en vente libre	4 084,1	4 284,5	4 478,8	4 525,3	4 618,4
Autres dépenses	29 047,7	31 206,7	33 768,7	36 710,1	38 253,4
	% du produit intérieur brut				
<b>Dépenses au chapitre de la santé</b>	<b>10,3</b>	<b>10,4</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>	<b>11,9</b>

1. Préviation des dépenses.

Source : Institut canadien d'information sur la santé, *Tendances des dépenses nationales de santé, 1975-2009*.

**Tableau 24.12 Rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du secteur des soins de santé et de l'assistance sociale selon certains groupes, 1998, 2003 et 2008**

	1998	2003	2008
	\$		
<b>Ensemble des soins de santé et assistance sociale</b>	<b>543,45</b>	<b>609,87</b>	<b>743,94</b>
Services de soins ambulatoires	501,13	586,69	735,26
Cabinets de médecins	464,55	574,30	807,98
Cabinets de dentistes	501,37	560,95	744,04
Hôpitaux	649,05	718,40	889,65
Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes	465,97	515,29	608,18
Assistance sociale	414,78	506,84	608,97
Services de garderie	365,95	431,78	514,92

Notes : Les données incluent les heures supplémentaires.

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2007.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 281-0027.