

Les Canadiens sont généralement en bonne santé et, de 2003 à 2009, l'état de santé de la population est demeuré stable. Ainsi, en 2008, 82 % des Canadiens de 12 ans et plus étaient en bonne ou pleine santé fonctionnelle, selon un indice mesurant la santé fonctionnelle d'une personne en fonction de huit caractéristiques : la vue, l'ouïe, la parole, la mobilité, la dextérité, l'état émotif, la cognition et la douleur.

Le fait d'avoir un médecin régulier est lié au dépistage et au traitement précoces des problèmes de santé. En 2009, 85 % des Canadiens de 12 ans et plus ont déclaré avoir un médecin régulier, contre 86 % en 2003. Par conséquent, 4,3 millions de personnes n'avaient pas de médecin régulier. Les hommes de tous les groupes d'âge sauf ceux de 12 à 19 ans étaient nettement plus susceptibles que les femmes de ne pas avoir de médecin régulier.

En 2009, 82 % des Canadiens sans médecin régulier ont déclaré avoir un endroit où aller habituellement quand ils étaient malades ou avaient besoin de conseils en matière de santé. Lorsqu'ils avaient besoin de soins médicaux, 61 % d'entre eux se rendaient à une clinique sans rendez-vous, 13 %, à la salle d'urgence d'un hôpital et 9 %, à un centre de santé communautaire.

Écarts entre les sexes

Un écart persiste entre les sexes en matière de santé : les hommes sont en général plus portés que les femmes à faire de l'embonpoint ou à être obèses et à souffrir de diabète. En 2009, 18 % des Canadiens de 18 ans et plus, soit environ 4,4 millions d'adultes, ont déclaré avoir une taille et un poids qui les classaient parmi les personnes obèses. De 2003 à 2009, l'obésité est passée de 15 % à 17 % chez les femmes, mais de 16 % à 19 % chez les hommes.

En 2009, 2 femmes obèses ou ayant de l'embonpoint sur 5 couraient un risque accru pour la santé en raison de leur excès de poids, contre 3 sur 5 de leurs homologues masculins. Outre le diabète de type 2, des maladies chroniques comme l'hypertension,

les maladies cardiovasculaires, l'arthrose et certains types de cancer sont liées à l'obésité.

De 2001 à 2009, les hommes ont été plus enclins que les femmes à déclarer souffrir de diabète. En 2009, 5,3 % des femmes de 12 ans et plus ont dit être atteintes de diabète, contre 6,6 % des hommes.

De 2003 à 2009, un plus fort pourcentage d'hommes que de femmes était exposé à la fumée secondaire à la maison. En 2009, les hommes de 20 à 34 ans et ceux de 65 ans et plus étaient nettement plus susceptibles que les femmes de ces groupes d'âge d'être exposés à la fumée secondaire à la maison.

Hypertension et cholestérol

En 2009, 17 % des Canadiens de 12 ans et plus ont déclaré faire de l'hypertension artérielle. Cette proportion, presque la même qu'en 2008, représente néanmoins une hausse par rapport au chiffre de 2007 (16 %). En 2009, les femmes (17 %) étaient plus susceptibles que les hommes (16 %) de déclarer avoir reçu un diagnostic d'hypertension. Toutefois, de 12 à 54 ans, les hommes enregistraient des taux d'hypertension nettement plus élevés. De 55 à 64 ans, les taux étaient semblables pour les deux sexes, après quoi ils étaient plus élevés chez les femmes.

En général, l'hypertension est liée à des niveaux de cholestérol total, de triglycérides et de « mauvais » cholestérol (cholestérol LDL) nuisibles à la santé. De mars 2007 à février 2009, plus de 2 Canadiens de 20 à

Pour en savoir plus sur

activité physique, dépenses de santé, douleurs ou malaises, espérance de vie et décès, grossesses et naissances, incapacité, indicateurs de la santé, maladies et état de santé, mesures de la santé, mode de vie et conditions sociales, obésité, rapports sur la santé, santé mentale et bien-être, services de soins de santé, taux de mortalité, temps d'attente, usage du tabac

visitez www.statcan.gc.ca

79 ans sur 5 avaient un taux de cholestérol total nuisible à la santé et environ 1 sur 4 avait un taux de triglycérides nuisible à la santé.

Si les hommes ont tendance à juger leur santé plus favorablement que les femmes, ils sont toutefois plus susceptibles de mourir plus jeunes. En 2007, l'espérance de vie à la naissance était de 83,0 ans chez les femmes et de 78,3 ans chez les hommes, soit un écart de 4,7 ans, contre 5,8 ans en 1997.

Niveaux d'activité

De 2007 à 2009, environ la moitié (53 %) des adultes ont accumulé au moins 30 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse au moins une fois par semaine, mais presque autant (47 %) l'ont fait moins d'une fois par semaine. Environ 5 % des adultes ont accumulé 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse sur une base régulière (30 minutes par jour, au moins cinq jours par semaine).

À mesure que la proportion de personnes âgées augmente, la prévalence de nombreux problèmes de santé chroniques progresse aussi. En 2006, le cancer, les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux

Tableau 24.a
Indicateurs de la santé, 2009

	Les deux sexes		
	Hommes	Femmes	
	% de la population		
Arthrite	15,2	11,7	18,5
Diabète	6,0	6,6	5,3
Asthme	8,1	6,7	9,4
Hypertension	16,9	16,4	17,3
Fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion	20,1	22,6	17,7
IMC (18 ans et plus), embonpoint ou obèse	51,6	59,2	43,9
IMC (12 à 17 ans), embonpoint ou obèse	19,7	23,9	15,5
Vaccination contre la grippe, il y a moins d'un an	32,2	29,0	35,2

Notes : Population de 12 ans et plus.


IMC = indice de masse corporelle.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

(les trois principales causes de décès) étaient à l'origine de 58 % des décès. Plus fréquents au sein d'une population vieillissante, ces problèmes de santé chroniques imposent un fardeau aux particuliers, aux familles et au système de soins de santé, mais ils sont souvent la conséquence de la longévité qui, en soi, est un indicateur positif de l'état de santé des Canadiens.

Graphique 24.1

Population ayant une bonne ou pleine santé fonctionnelle selon le groupe d'âge et le sexe, 2009



Note : Population à domicile de 12 ans et plus.

Source : Statistique Canada, produit n° 82-625-X au catalogue.


Plusieurs manquent de vitamine D

Selon une enquête menée de mars 2007 à février 2009, quelque 3 millions de Canadiens de 6 à 79 ans (10 %) avaient une concentration sanguine de vitamine D jugée inadéquate (moins de 37,5 nanomoles par litre). Parmi ceux-ci, 1,1 million présentaient une carence en vitamine D. De faibles concentrations étaient associées à une pigmentation foncée de la peau, les personnes à la peau foncée étant moins susceptibles d'absorber la vitamine D en s'exposant au soleil.

Environ 5 % des hommes (jusqu'à 7 % des 20 à 39 ans) et 3 % des femmes avaient une carence en vitamine D. En cas de carence, l'organisme absorbe très peu de calcium. Chez les enfants, cette carence peut fragiliser les os et déformer le squelette. Chez les adultes, elle peut causer l'ostéoporose.

Neuf personnes sur dix avaient une concentration de vitamine D jugée adéquate pour la santé des os. Les femmes, les personnes de race blanche et les gros

Graphique 24.2
Vitamine D dans le sang selon le groupe d'âge et le sexe, 2009



Note : Échantillons prélevés de mars 2007 à février 2009.
Source : Statistique Canada, produit n° 82-625-X au catalogue.

buveurs de lait de tous âges avaient une concentration plus élevée de vitamine D. Pour les deux sexes, les concentrations les plus élevées se trouvaient chez les enfants et les personnes âgées, et les plus faibles, chez les personnes de 20 à 39 ans.

Concentrations de bisphénol A


L'exposition au bisphénol A (BPA), produit chimique industriel souvent utilisé dans les contenants d'aliments et les bouteilles en plastique, fait l'objet d'une surveillance pour la première fois à l'échelle nationale.

De 2007 à 2009, des chercheurs ont décelé des concentrations de BPA dans l'urine de 91 % des Canadiens de 6 à 79 ans. Ces concentrations étaient plus élevées chez les jeunes et diminuaient avec l'âge.

Les résultats serviront à observer les tendances à long terme, tout comme on surveille l'exposition au plomb et les données liées à la santé depuis environ 30 ans.

En octobre 2010, l'administration fédérale a ajouté le BPA à sa liste de substances toxiques. Le BPA n'existe pas à l'état naturel. Il entre dans la fabrication des contenants en plastique et des résines époxydes qui sont utilisées pour le revêtement des conserves d'aliments et de boissons ainsi que pour le

Graphique 24.3
Bisphénol A dans l'urine selon le groupe d'âge et le sexe, 2009




Note : Échantillons prélevés de mars 2007 à février 2009.
Source : Statistique Canada, produit n° 82-625-X au catalogue.

scellement dentaire. L'exposition au BPA est surtout alimentaire, mais on en trouve aussi ailleurs : eau potable, sol, poussière, air et certains produits de consommation.

PERSPECTIVE internationale

Graphique 24.4
Dépenses de santé en pourcentage du PIB, 2007



- En 2007, le Canada a consacré 10,1 % de son PIB aux soins de santé. À titre de comparaison, les dépenses en soins de santé représentaient 16,0 % du PIB des États-Unis, 8,4 % de celui du Royaume-Uni et 8,9 % de celui de l'ensemble des pays de l'OCDE.

- En 2006, l'espérance de vie à la naissance a atteint 80,7 ans au Canada. Le Japon affichait l'espérance de vie à la naissance la plus élevée (82,4 ans) des pays de l'OCDE, tandis que la Turquie avait le niveau le plus bas (73,2 ans).

- En 2007, 47 % des adultes du Canada ont signalé faire de l'embonpoint ou de l'obésité. La proportion s'élevait à 67 % aux États-Unis. Treize pays de l'OCDE ont signalé que 50 % ou plus de leur population faisait de l'embonpoint ou était obèse.

Note : 2007 ou l'année la plus récente disponible.

1. Dépenses de santé totale.

2. Les dépenses publiques et privées sont des dépenses courantes (non compris les investissements).

3. Dépenses de santé courantes.

4. Les dépenses de santé concernent le nombre d'assurés et non pas la population résidente.

Source : Données basées sur l'OCDE (2009), *Panorama de la santé 2009*.

Tableau 24.1 Espérance de vie à la naissance et à 65 ans selon le sexe, par province et territoire, 2005-2007

	À la naissance			À 65 ans		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	années					
Terre-Neuve-et-Labrador	78,3	75,8	80,8	17,9	16,2	19,5
Île-du-Prince-Édouard	80,2	77,6	82,7	19,4	17,5	20,9
Nouvelle-Écosse	79,7	77,1	82,2	18,9	17,1	20,5
Nouveau-Brunswick	80,0	77,4	82,5	19,3	17,5	20,9
Québec	80,7	78,2	83,1	19,8	18,0	21,3
Ontario	81,0	78,8	83,1	19,9	18,3	21,3
Manitoba	79,3	76,8	81,8	19,4	17,5	20,9
Saskatchewan	79,5	76,9	82,0	19,6	17,8	21,2
Alberta	80,5	78,1	82,9	20,0	18,3	21,5
Colombie-Britannique	81,2	78,9	83,5	20,4	18,9	21,7
Territoires ¹	75,8	73,1	79,1	16,9	15,3	19,0

Note : L'espérance de vie est calculée selon une méthode utilisant trois années de données.

1. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0512.

Tableau 24.2 Bénéficiaires dans les foyers pour personnes âgées selon le sexe, par province et territoire, 2003-2004 et 2008-2009

	2003-2004			2008-2009		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	nombre					
Canada¹	179 424	42 374	103 496	205 442	49 382	117 433
Terre-Neuve-et-Labrador	4 336	1 421	2 915	4 941	1 537	3 404
Île-du-Prince-Édouard	1 583	454	1 129	1 792	488	1 304
Nouvelle-Écosse	6 535	1 715	4 820	6 572	1 741	4 831
Nouveau-Brunswick	5 838	1 733	4 105	7 005	2 088	4 917
Québec ¹	33 554
Ontario	76 866	21 462	55 404	85 617	24 704	60 913
Manitoba	9 215	2 676	6 539	9 536	2 799	6 737
Saskatchewan	8 149	2 563	5 586	8 049	2 422	5 627
Alberta	14 141	4 657	9 484	17 891	5 803	12 088
Colombie-Britannique	18 997	5 630	13 367	25 174	7 706	17 468
Territoires ²	210	63	147	238	94	144

Notes : « Foyers pour personnes âgées » se réfère aux maisons de soins infirmiers et d'autres établissements qui fournissent des services et des soins aux personnes âgées. Ne sont pas incluses les résidences pour personnes âgées ou pavillons où aucun soin n'est fourni.

Bénéficiaires inscrits aux registres à la fin de l'année de déclaration.

1. Le total peut différer de la somme des sous-groupes d'âge et de sexe parce que les données du Québec sont incluses dans le total, alors que ces données ne sont pas disponibles par sous-groupes. Les données de 2003-2004 et 2008-2009 ne sont pas comparables.

2. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 107-5504.

Tableau 24.3 Taux de mortalité selon certaines causes de décès et le sexe, 2003 et 2007

	2003			2007		
	Les deux sexes	Hommes	Femmes	Les deux sexes	Hommes	Femmes
	taux pour 100 000 personnes					
Ensemble des causes de décès	586,9	733,4	475,4	539,8	664,7	441,3
Septicémie	4,0	4,8	3,5	4,4	5,4	3,8
Hépatite virale	1,0	1,4	0,7	1,1	1,4	0,7
Maladies attribuables au virus de l'immunodéficience humaine	1,3	2,1	0,4	1,1	1,8	0,5
Tumeurs malignes	175,6	215,3	148,1	165,8	200,3	141,0
Côlon, rectum et anus	18,3	23,0	14,6	18,0	22,1	14,6
Pancréas	9,1	10,3	8,1	9,0	10,2	7,8
Trachée, bronches et poumon	47,0	62,7	35,4	45,1	57,0	36,1
Sein	13,3	0,2	24,1	11,9	0,2	21,7
Prostate ¹	...	24,1	20,6	...
Diabète sucré	20,5	25,2	16,9	16,9	21,6	13,2
Maladie d'Alzheimer	13,1	11,1	13,9	11,9	10,0	12,9
Maladies du cœur	133,3	178,9	98,2	111,0	146,7	82,5
Cardiopathies ischémiques	102,4	142,9	71,3	81,6	112,9	56,6
Autres cardiopathies	27,8	33,2	23,8	26,7	31,2	23,0
Maladies cérébrovasculaires	37,7	41,6	34,7	30,0	32,2	28,1
Grippe et pneumopathie	12,0	15,0	10,4	11,4	14,1	9,7
Grippe	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,3
Pneumopathie	11,5	14,4	9,8	11,0	13,6	9,4
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	25,8	36,0	19,9	23,9	31,6	19,3
Maladies chroniques et cirrhoses du foie	6,4	8,9	4,1	6,4	9,0	4,1
Maladie du foie en raison de l'abus d'alcool	3,1	4,8	1,7	3,3	5,1	1,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie	3,2	4,1	2,4	3,1	3,9	2,3
Insuffisance rénale	8,5	11,1	6,8	7,9	10,3	6,4
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	4,2	4,6	3,8	4,4	4,7	4,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	3,3	3,3	3,2	2,9	3,0	2,7
Accidents (blessures involontaires)	25,5	35,1	16,6	25,6	35,3	16,6
Accidents de véhicule à moteur	9,0	12,9	5,1	8,6	12,5	4,7
Chutes	5,0	6,7	3,7	5,8	7,3	4,7
Empoisonnement accidentel par des substances nocives et exposition à des substances nocives	2,7	3,8	1,6	3,8	5,3	2,3
Suicide	11,3	17,8	5,1	10,2	15,7	4,9
Homicide	1,5	2,1	0,8	1,6	2,4	0,8

Note : Les taux sont normalisés selon l'âge pour 100 000 personnes.

1. Aucun taux global n'a été calculé pour les causes de décès propres à un seul des deux sexes.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0552.

Tableau 24.4 Autoévaluation de l'état de santé, excellent ou très bon, selon le sexe, 2003 à 2009

	2003	2005	2007	2008	2009
	% d'hommes				
Canada	59,5	60,6	60,3	59,1	60,7
Terre-Neuve-et-Labrador	63,6	62,8	61,1	57,2	55,3
Île-du-Prince-Édouard	67,9	54,1	56,7	63,0	61,6
Nouvelle-Écosse	55,9	56,2	55,4	57,2	59,9
Nouveau-Brunswick	49,5	54,3	53,5	53,6	55,9
Québec	58,7	60,0	60,1	59,1	62,1
Ontario	58,3	61,7	61,4	59,3	61,4
Manitoba	61,3	60,5	60,4	55,2	56,9
Saskatchewan	59,3	58,7	57,3	53,2	56,8
Alberta	66,3	61,7	60,4	64,9	59,8
Colombie-Britannique	60,9	60,5	60,2	58,0	60,0
Yukon	60,7	56,2	58,1	60,9	58,2
Territoires du Nord-Ouest	60,0	63,1	51,6	50,5	54,1
Nunavut	57,6	49,9	63,0	55,0	42,3
	% de femmes				
Canada	57,3	59,6	59,0	58,7	60,3
Terre-Neuve-et-Labrador	68,7	65,7	63,5	65,6	59,7
Île-du-Prince-Édouard	62,0	61,5	61,7	60,4	62,2
Nouvelle-Écosse	60,3	59,2	58,8	55,4	58,8
Nouveau-Brunswick	51,1	54,4	56,0	56,2	54,1
Québec	55,1	58,9	58,6	59,5	60,2
Ontario	56,2	60,0	58,6	59,4	60,9
Manitoba	60,5	57,7	59,5	53,1	63,3
Saskatchewan	59,1	57,8	55,3	55,0	60,6
Alberta	61,6	62,9	64,8	61,0	63,1
Colombie-Britannique	59,3	58,5	57,2	55,9	57,2
Yukon	49,6	57,3	54,9	60,4	60,0
Territoires du Nord-Ouest	52,0	63,1	52,7	46,8	49,4
Nunavut	56,5	50,3	51,6	43,1	51,6

Note : Population de 12 ans et plus.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

Tableau 24.5 Activités physiques durant les loisirs selon le groupe d'âge et le sexe, 2003 à 2009

	2003	2005	2007	2008	2009
	%				
Les deux sexes	51,8	52,2	50,4	50,6	52,5
12 à 19 ans	72,0	71,1	70,5	69,2	71,0
20 à 34 ans	54,6	55,5	53,1	52,9	55,9
35 à 44 ans	49,2	48,8	47,0	47,1	49,1
45 à 64 ans	47,5	48,2	46,8	47,6	49,4
65 ans et plus	41,4	43,0	41,3	42,6	43,0
Hommes	55,1	54,8	53,4	54,5	56,4
12 à 19 ans	77,3	76,9	75,3	77,2	77,2
20 à 34 ans	58,8	57,9	56,9	56,7	60,3
35 à 44 ans	50,2	48,9	47,6	49,0	51,8
45 à 64 ans	48,0	48,6	47,8	49,0	50,7
65 ans et plus	49,6	50,2	47,2	50,2	50,0
Femmes	48,6	49,7	47,6	46,8	48,7
12 à 19 ans	66,5	65,1	65,6	60,9	64,6
20 à 34 ans	50,5	53,0	49,2	49,0	51,5
35 à 44 ans	48,3	48,7	46,5	45,2	46,3
45 à 64 ans	47,0	47,7	45,8	46,2	48,2
65 ans et plus	35,2	37,5	36,5	36,5	37,2

Note : Personnes de 12 ans et plus qui sont actives ou modérément actives durant leurs loisirs.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

Tableau 24.6 Douleurs ou malaises qui empêchent les activités selon le groupe d'âge et le sexe, 2003 à 2009

	2003	2005	2007	2008	2009
	%				
Les deux sexes	10,6	11,0	11,8	12,4	12,3
12 à 19 ans	3,3	2,5	2,9	3,4	2,9
20 à 34 ans	6,0	5,6	6,6	7,3	6,7
35 à 44 ans	10,2	10,3	11,0	10,4	10,8
45 à 64 ans	14,2	15,2	16,1	16,7	16,7
65 ans et plus	18,1	19,7	19,4	20,7	20,6
Hommes	8,1	9,1	9,5	10,1	10,4
12 à 19 ans	1,5 ^E	2,1 ^E	1,5 ^E	1,9 ^F	2,1
20 à 34 ans	4,4 ^E	5,3	5,6	5,9	5,8
35 à 44 ans	9,8	9,2	9,3	8,9	9,4
45 à 64 ans	10,7	12,9	13,3	14,2	14,6
65 ans et plus	13,0	13,7	15,3	16,7	16,7
Femmes	13,1	13,0	14,1	14,7	14,2
12 à 19 ans	5,2	2,9 ^F	4,3	5,0	3,7
20 à 34 ans	7,6	5,8	7,7	8,8	7,6
35 à 44 ans	10,5	11,5	12,6	11,9	12,2
45 à 64 ans	17,6	17,5	18,8	19,2	18,7
65 ans et plus	22,2	24,4	22,8	23,9	23,7

Note : Population de 12 ans et plus.

Source : Statistique Canada, CANSIM tableau 105-0501.

Tableau 24.7 Indicateurs de vieillissement en santé selon le groupe d'âge et le sexe, 2008

	Hommes				
	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus
	nombre				
Cataracte ¹	29 497 ^E	90 805	167 666	169 574	49 912
Problèmes de santé chroniques, au moins un ²	1 638 115	1 480 793	988 947	578 371	154 420
Faire une chute ³	.	.	174 103	122 652	39 341
Glaucome ⁴	F	44 900	50 873	62 193	21 666
Santé de la bouche passable ou mauvaise ⁵	337 364	277 613	131 771	89 988	25 529
Risque nutritionnel élevé ⁶	905 892	695 546	319 963	179 754	54 955
Ostéoporose ⁷	52 420 ^F	50 884	48 414	44 278	14 774
Problème de sommeil ⁸	445 948	315 850	188 332	119 064	27 367
Participation sociale, activités familiales et avec des amis ⁹	2 282 283	1 700 478	1 001 839	529 030	135 494
Participation sociale, activités religieuses ⁹	702 678	565 585	428 139	281 191	75 921
Participation sociale, sports et activités physiques ⁹	1 380 068	925 831	478 029	190 388	38 107
Participation sociale, activités bénévoles ⁹	561 982	444 794	304 879	147 830	22 551
Participation sociale, au moins une fois par mois ¹⁰	2 449 255	1 814 107	1 066 742	580 240	150 318
Problème de la thyroïde ¹¹	66 606 ^F	79 826	62 448	55 001	16 418
			%		
Cataracte ¹	1,1 ^E	4,6	14,6	26,2	28,9
Problèmes de santé chroniques, au moins un ²	63,0	75,6	87,3	91,2	91,2
Faire une chute ³	.	.	15,1	19,0	22,8
Glaucome ⁴	F	2,3	4,4	9,7	12,6
Santé de la bouche passable ou mauvaise ⁵	18,2	20,3	16,8	21,4	25,4
Risque nutritionnel élevé ⁶	35,9	36,3	28,7	29,2	34,7
Ostéoporose ⁷	2,0 ^F	2,6	4,2	6,9	8,6
Problème de sommeil ⁸	17,6	16,4	16,8	19,1	16,9
Participation sociale, activités familiales et avec des amis ⁹	87,5	86,3	87,2	82,2	78,7
Participation sociale, activités religieuses ⁹	27,0	28,7	37,3	43,8	44,1
Participation sociale, sports et activités physiques ⁹	53,0	47,0	41,6	29,6	22,1
Participation sociale, activités bénévoles ⁹	21,6	22,6	26,6	23,0	13,1
Participation sociale, au moins une fois par mois ¹⁰	94,3	92,2	93,0	90,7	87,4
Problème de la thyroïde ¹¹	2,6 ^F	4,0	5,4	8,5	9,5

Notes : Population de 45 ans et plus.

Exclut le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

1. On a diagnostiqué de la cataracte qui a déjà duré ou devrait durer 6 mois ou plus.

2. On a diagnostiqué au moins un problème de santé chronique qui a déjà duré ou devrait durer 6 mois ou plus.

3. Autodéclarée au cours des 12 derniers mois.

4. On a diagnostiqué du glaucome qui a déjà duré ou devrait durer 6 mois ou plus.

5. Personnes qui ont déclaré que la santé de leur bouche était passable ou mauvaise.

6. Personnes qui ont déclaré des mesures globales du risque nutritionnel basées sur 10 questions ayant trait aux variations de poids, ainsi qu'à la consommation et à la préparation d'aliments et de boissons.

7. On a diagnostiqué de l'ostéoporose qui a déjà duré ou devrait durer 6 mois ou plus.

8. Personnes qui ont déclaré avoir la plupart du temps ou tout le temps des difficultés à s'endormir ou à rester endormies.

9. Personnes qui ont participé à ce genre d'activité au cours des 12 derniers mois.

10. Personnes qui ont participé à des activités communautaires, d'après 8 questions sur la participation sociale.

11. On a diagnostiqué un problème de la thyroïde qui a déjà duré ou devrait durer 6 mois ou plus.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-1200.

Femmes				
45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans et plus
nombre				
43 810 ^E	139 979	271 369	264 718	113 760
1 809 405	1 661 135	1 139 522	761 590	294 927
.	.	235 396	200 806	93 186
29 666 ^E	44 456	57 266	77 181	43 544
307 732	214 084	114 145	94 249	52 282
1 096 371	762 013	445 276	318 873	117 095
143 140	321 467	319 453	260 912	100 561
665 771	551 092	307 679	194 286	69 688
2 375 701	1 859 812	1 104 337	683 171	241 728
816 999	733 435	585 383	407 593	151 207
1 312 584	903 232	480 837	203 717	43 987
615 418	584 456	382 524	174 288	36 168
2 508 595	1 946 228	1 180 844	740 479	266 432
320 628	330 021	248 677	174 736	63 335
%				
1,7 ^E	6,8	21,6	32,3	35,8
69,0	81,6	92,0	94,5	95,3
.	.	18,7	24,5	29,4
1,1 ^E	2,2	4,6	9,4	13,7
16,5	14,6	13,2	18,0	26,9
42,1	38,0	36,1	40,4	41,2
5,4	15,7	25,5	31,9	31,8
25,4	27,3	24,8	24,4	23,8
90,2	91,0	87,9	83,7	76,3
31,1	35,9	46,7	49,9	47,7
49,9	44,3	38,3	25,0	13,9
23,4	28,6	30,5	21,4	11,4
95,6	95,6	94,1	90,8	84,3
12,2	16,1	19,8	21,3	20,0

Tableau 24.8 Usage du tabac et exposition à la fumée secondaire selon le sexe, par province, 2009

	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse
	%			
Fumeurs quotidiens ou occasionnels¹	20,1	23,2	20,4	23,3
Hommes	22,6	27,6	22,0	25,7
Femmes	17,7	19,0	18,9	21,0
Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire au domicile²	6,2	8,0	7,0	7,3
Hommes	6,8	10,1	9,6 ^E	7,2
Femmes	5,7	6,2 ^E	4,7 ^E	7,5
Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans des véhicules³	7,1	9,3	7,2	8,7
Hommes	8,0	9,7	8,3 ^E	8,0
Femmes	6,3	9,0 ^E	6,3 ^E	9,2
Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans des lieux publics⁴	10,0	5,9	6,2^E	7,8
Hommes	11,1	7,2	8,1 ^E	8,6
Femmes	9,0	4,7 ^E	4,5 ^E	7,1

Note : Population de 12 ans et plus.

1. Personnes ayant déclaré qu'elles fumaient tous les jours ou à l'occasion.

2. Personnes ayant déclaré qu'au moins une personne fumait à leur domicile tous les jours ou presque tous les jours.

3. Personnes ayant déclaré avoir été exposées à la fumée secondaire dans des véhicules privés tous les jours ou presque tous les jours au cours du dernier mois.

4. Personnes ayant déclaré avoir été exposées à la fumée secondaire dans des lieux publics tous les jours ou presque tous les jours au cours du dernier mois.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

Tableau 24.9 Consommation d'alcool selon le sexe, par province et territoire, 2003 à 2009

	Canada	Terre-Neuve-et-Labrador	Île-du-Prince-Édouard	Nouvelle-Écosse	Nouveau-Brunswick
	%				
Hommes					
2003	24,5	37,4	28,1	31,1	30,5
2005	25,3	37,3	26,6	29,9	29,8
2007	25,0	37,0	30,8	30,9	28,5
2008	24,1	33,0	24,8	29,1	29,7
2009	24,8	38,4	27,2	30,2	26,0
Femmes					
2003	8,8	12,0	8,8	9,9	10,9
2005	9,6	12,3	9,6	10,0	9,3
2007	9,6	13,2	9,8	13,2	11,1
2008	9,6	12,1	8,6 ^E	12,7	9,7
2009	9,9	12,6	15,4	11,9	12,8

Note : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré avoir bu cinq verres ou plus d'alcool en une même occasion, au moins une fois par mois durant la dernière année.

1. Les données ne sont pas disponibles pour la « Région du Nunavik » et la « Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James ».

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

Nouveau-Brunswick	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique
%						
22,0	22,5	18,6	20,5	21,6	23,3	16,0
23,5	23,8	21,8	22,4	23,6	26,7	17,7
20,6	21,2	15,4	18,5	19,6	19,7	14,5
7,2	9,2	5,3	6,1	6,9	5,8	3,6
6,8	9,7	6,1	7,0 ^E	6,9 ^E	6,9	3,3
7,7	8,7	4,6	5,2	7,0	4,9	3,8
8,7	8,4	6,4	8,9	8,8	7,3	5,6
9,4	9,0	7,2	12,4	8,4	9,0	6,7
8,1	7,8	5,7	5,7	9,2	5,7	4,5
8,0	7,9	11,2	8,9	7,0	10,8	11,5
8,8	8,6	12,3	11,3	7,4	12,8	12,5
7,3	7,3	10,2	6,6 ^E	6,6	8,8	10,5

Québec ¹	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Colombie-Britannique	Yukon	Territoires du Nord-Ouest	Nunavut (les 10 plus grandes communautés)
%								
24,8	24,2	24,9	25,3	25,3	19,7	30,3	37,3	24,9
24,3	25,0	23,6	28,7	25,6	23,8	31,1	29,6	26,2
24,8	24,2	25,9	26,2	27,9	21,0	30,2	37,6	22,6
25,8	22,3	27,9	24,9	23,9	22,2	30,6	31,9	33,7 ^F
26,3	22,9	27,1	26,9	26,1	22,4	36,8	36,1	25,7 ^F
8,9	8,5	9,4	10,2	9,7	7,6	17,8	22,7	15,5
9,5	9,0	10,6	11,0	10,1	9,9	12,8	20,4	17,1 ^F
10,0	8,9	12,3	11,9	9,8	8,0	22,5	21,7	16,3 ^F
9,2	8,9	11,7	12,9	11,2	9,0	17,5 ^E	14,5 ^E	16,3 ^F
11,1	8,7	7,9	10,8	10,1	10,0	19,8	26,0	13,9 ^F

Tableau 24.10 Population souffrant d'embonpoint ou d'obésité selon le groupe d'âge et le sexe, 2003 à 2009

	2003	2005	2007	2008	2009
	% d'hommes				
Embonpoint					
18 à 19 ans	17,2	22,3	17,3	24,0	21,9
20 à 34 ans	34,9	34,6	35,5	33,7	31,9
35 à 44 ans	44,8	44,3	43,3	43,5	43,1
45 à 64 ans	45,3	44,8	44,9	43,5	45,1
65 ans et plus	44,4	44,3	43,1	43,9	42,9
Obésité					
18 à 19 ans	7,2	6,6	6,2 ^E	8,3 ^E	8,1
20 à 34 ans	13,9	13,2	14,5	14,1	14,9
35 à 44 ans	16,0	17,7	19,8	18,8	20,5
45 à 64 ans	19,5	21,1	20,4	22,4	22,0
65 ans et plus	14,2	15,1	17,7	17,8	19,6
	% de femmes				
Embonpoint					
18 à 19 ans	10,4	13,2	13,1	13,0	14,4
20 à 34 ans	18,7	19,0	18,5	19,9	20,0
35 à 44 ans	23,7	24,9	24,2	24,1	24,0
45 à 64 ans	32,2	31,9	32,0	31,6	30,8
65 ans et plus	34,7	34,0	35,4	34,8	35,2
Obésité					
18 à 19 ans	4,0	5,0	6,5 ^E	4,6 ^E	5,5 ^E
20 à 34 ans	10,8	10,9	11,9	12,0	11,1
35 à 44 ans	13,7	13,8	15,0	16,7	17,5
45 à 64 ans	18,4	18,3	19,3	18,8	20,1
65 ans et plus	15,3	15,8	16,8	17,9	18,7

Note : Fondé sur l'indice de masse corporelle autodéclaré, calculé en divisant le poids du répondant (exprimé en kilogrammes) par le carré de la taille (exprimé en mètres).

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

Tableau 24.11 Personnes qui ont un médecin régulier, par province et territoire, 2003 à 2009

	2003	2005	2007	2008	2009
	% d'hommes				
Canada	81,8	81,9	80,4	80,4	80,9
Terre-Neuve-et-Labrador	81,8	83,7	86,0	84,5	82,7
Île-du-Prince-Édouard	90,7	87,1	86,1	84,8	90,2
Nouvelle-Écosse	93,3	92,3	91,7	92,0	89,2
Nouveau-Brunswick	90,3	91,2	89,6	86,9	91,9
Québec	67,0	68,5	65,1	66,3	65,9
Ontario	89,4	89,1	88,3	88,8	89,4
Manitoba	79,7	80,1	79,4	77,9	81,8
Saskatchewan	80,9	79,4	78,4	77,9	78,9
Alberta	78,1	76,4	75,2	74,9	75,3
Colombie-Britannique	86,5	86,4	85,4	83,3	84,1
Yukon ¹	76,8	65,8	74,4	73,9	72,0
Territoires du Nord-Ouest ¹	37,4	41,4	38,2	30,9	36,2
Nunavut (les 10 plus grandes communautés) ¹	F	16,0 ^E	10,4 ^E	9,5 ^E	F
	% de femmes				
Canada	89,9	89,5	89,2	88,3	88,7
Terre-Neuve-et-Labrador	89,7	90,7	90,4	90,1	91,0
Île-du-Prince-Édouard	94,1	92,5	89,8	87,6	91,9
Nouvelle-Écosse	96,3	96,8	96,6	96,4	96,1
Nouveau-Brunswick	94,4	95,4	94,1	94,6	92,3
Québec	81,1	81,5	81,8	78,9	80,5
Ontario	94,2	93,2	92,6	93,2	93,5
Manitoba	87,9	87,8	89,7	88,2	89,3
Saskatchewan	90,2	89,4	90,7	86,5	87,8
Alberta	89,8	88,7	88,3	86,2	86,0
Colombie-Britannique	92,2	91,6	90,7	90,3	89,4
Yukon ¹	86,6	81,8	81,5	84,4	83,7
Territoires du Nord-Ouest ¹	55,1	56,9	43,8	44,3	39,5
Nunavut (les 10 plus grandes communautés) ¹	F	16,0	16,6 ^E	15,3 ^E	15,2 ^E

Note : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré avoir un médecin régulier. En 2005 et 2003, en français, l'indicateur se limitait aux médecins de famille. À compter de 2007, il a été élargi pour devenir « médecin régulier », qui inclut les médecins de famille.

1. Les comparaisons doivent être interprétées avec prudence en raison de changements de méthodologie survenus en 2007.

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501.

Tableau 24.12 Temps d'attente pour des services spécialisés de la santé selon le type de service, 2003 à 2009

	2003	2005 ¹	2007	2009
	%			
Visites chez un spécialiste²				
Moins d'un mois	47,9	46,0	45,6	44,6
1 à 3 mois	40,7	41,1	40,5	40,5
Plus de 3 mois	11,4	12,9	13,9	15,0
Chirurgies non urgentes³				
Moins d'un mois	40,5	40,3	40,7	40,7
1 à 3 mois	42,1	40,7	41,0	42,5
Plus de 3 mois	17,4	19,0	18,3	16,8
Tests diagnostiques⁴				
Moins d'un mois	57,5	56,4	55,4	58,2
1 à 3 mois	31,1	33,3	34,1	32,1
Plus de 3 mois	11,5	10,2	10,5	9,7

1. Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont inclus seulement en 2005.

2. Comprend les visites chez un spécialiste pour un nouveau problème de santé.

3. Comprend l'intervention chirurgicale planifiée et pratiquée en clinique externe ou nécessitant une hospitalisation. Ne se rapporte pas à une intervention chirurgicale pratiquée à la suite d'une admission à l'urgence d'un hôpital, par exemple, à la suite d'un accident ou d'une situation mettant dans l'immédiat la vie en danger.

4. Comprend certains tests diagnostiques (imagerie par résonance magnétique (IRM), tomодensitométrie (CT-scan) et angiographie non urgentes).

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 105-3002, 105-3003 et 105-3004.

Tableau 24.13 Rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du secteur des soins de santé et de l'assistance sociale selon certains groupes, 2000, 2005 et 2010

	2000	2005	2010
	\$		
Ensemble des soins de santé et assistance sociale	562,39	667,40	786,27
Services de soins ambulatoires	520,15	654,46	808,92
Cabinets de médecins	477,29	656,03	913,14
Cabinets de dentistes	518,06	644,38	827,82
Hôpitaux	665,07	788,90	955,18
Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes	492,26	552,35	636,03
Assistance sociale	445,91	540,81	597,10
Services de garderie	397,29	458,24	527,26

Notes : Les données incluent les heures supplémentaires.

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2007.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail et CANSIM, tableau 281-0027.

Tableau 24.14 Dépenses au chapitre de la santé, 2006 à 2010

	2006	2007	2008	2009 ¹	2010 ¹
	millions de \$				
Dépenses au chapitre de la santé	150 801,6	160 322,8	171 776,8	182 100,1	191 639,1
Hôpitaux	43 615,2	46 087,2	49 376,6	52 120,9	55 340,4
Autres établissements	15 442,7	16 123,3	16 976,0	17 673,8	18 573,1
Médecins	19 352,8	20 814,4	22 932,2	24 614,7	26 303,1
Autres professionnels	16 299,9	17 342,1	18 522,8	19 802,6	21 310,6
Services dentaires	10 368,9	11 113,4	11 840,8	12 633,3	13 617,7
Services de soins de la vue	3 444,0	3 769,9	3 927,4	4 221,5	4 557,8
Autres	2 486,9	2 458,8	2 754,7	2 947,8	3 135,1
Médicaments	25 094,1	26 403,8	27 960,7	29 710,0	31 142,9
Médicaments sur ordonnance	20 830,9	21 963,9	23 445,0	24 955,8	26 113,2
Médicaments en vente libre	4 263,2	4 439,9	4 515,7	4 754,1	5 029,7
Autres dépenses	30 996,7	33 551,9	36 008,6	38 178,2	38 969,0
	% du PIB				
Dépenses au chapitre de la santé	10,4	10,5	10,7	11,9	11,7

1. Prévvision des dépenses.

Source : Institut canadien d'information sur la santé, *Tendances des dépenses nationales de santé, 1975-2010*.**Tableau 24.15 Dépenses en immobilisations et en réparations du secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, par province et territoire, 1999, 2004 et 2009**

	1999	2004	2009 ^a
	millions de \$		
Canada	4 116,8	7 420,9	10 295,2
Terre-Neuve-et-Labrador	137,4	84,4	164,6
Île-du-Prince-Édouard	13,7	15,5	49,5
Nouvelle-Écosse	54,7	117,4	241,7
Nouveau-Brunswick	65,3	118,1	156,5
Québec	873,2	2 011,7	2 138,6
Ontario	1 469,5	2 898,9	4 087,7
Manitoba	213,7	238,9	327,5
Saskatchewan	207,4	155,7	293,5
Alberta	502,0	827,7	1 376,1
Colombie-Britannique	542,8	870,0	1 410,2
Yukon	6,0	5,5	17,4
Territoires du Nord-Ouest	x	17,4	26,2
Nunavut	x	59,6	5,7

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 029-0005.