

# RELATIONS SEXUELLES, CONDOMS ET MTS CHEZ LES JEUNES

par Michelle Rotermann



En 2003, environ 6 jeunes sur 10 âgés de 15 à 24 ans ont déclaré avoir eu des relations sexuelles au moins une fois au cours de leur vie (tableau A). La proportion était la même chez les garçons comme chez les filles (62 %) et la plupart de ces jeunes étaient demeurés actifs sexuellement après leur première expérience. L'âge moyen lors de la première relation sexuelle était également le même chez les garçons comme chez les filles, soit 16 ans et demi (données non présentées).

La proportion de jeunes de 15 à 24 ans ayant eu des relations sexuelles était nettement plus élevée que la moyenne nationale au Québec (74 %), à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick (68 % dans les deux cas). En revanche, des proportions significativement inférieures à cette moyenne (de l'ordre de 55 % à 58 %) ont été observées en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta et en Ontario (tableau A).

## L'approche de l'âge adulte

La probabilité d'avoir des relations sexuelles augmente

Pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellement qui ont déclaré avoir eu plusieurs partenaires l'année précédente...



Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003

\* Valeur significativement différente de l'estimation pour les garçons ( $p < 0,05$ ).

\*\* Valeur significativement différente de l'estimation pour le groupe des 20 à 24 ans ( $p < 0,05$ ).

† Valeur significativement différente de l'estimation pour le groupe des 13 ans et moins ( $p < 0,05$ ).

bien entendu à mesure que les adolescents approchent de l'âge adulte. Chez les jeunes de 15 à 17 ans, 28 % ont dit avoir eu des relations sexuelles. En guise de comparaison, les proportions correspondantes étaient de 65 % chez les jeunes de 18 et 19 ans et de 80 % chez ceux de 20 à 24 ans.

## Multiple partenaires

Parmi les jeunes de 15 à 24 ans qui avaient été actifs sexuellement l'année précédente, environ le tiers avaient eu plus d'un partenaire. Les garçons étaient à cet égard plus susceptibles que les filles d'avoir eu de multiples partenaires, soit 37 % contre 25 %.

Il existe un lien entre l'âge au moment de la première expérience sexuelle et la probabilité d'avoir plus d'un partenaire. Les jeunes qui avaient déjà eu des relations sexuelles à l'âge de 13 ans étaient, en général, nettement plus susceptibles d'avoir eu au moins deux partenaires sexuels au cours de l'année précédente que ceux dont la première expérience avait eu lieu plus tard.

De plus fortes proportions de jeunes de 15 à 17 ans et de 18 et 19 ans que de jeunes de 20 à 24 ans avaient eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires au cours de l'année précédente. Cette différence pourrait refléter une tendance à nouer

des relations monogames de plus longue durée à mesure que l'âge augmente.

## Questions

Le pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans ayant eu des relations sexuelles au moins une fois au cours de leur vie ou étant actifs sexuellement est fondé sur les réponses « Oui »/ « Non » aux questions suivantes tirées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2003 :

- Avez-vous déjà eu des relations sexuelles?
- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles?

On a demandé aux participants à l'enquête quel âge ils avaient « la première fois », ce qui a permis d'établir l'âge moyen au moment de la première relation sexuelle.

Le pourcentage de jeunes qui avaient eu des relations sexuelles avec plus d'un ou une partenaire l'année précédente est fondé sur le nombre de partenaires que les participants à l'enquête ont déclaré avoir eu au cours des 12 mois qui ont précédé l'entrevue.

Les estimations de l'usage du condom chez les jeunes qui étaient actifs sexuellement et qui avaient eu plusieurs partenaires l'année précédente et(ou) qui étaient célibataires sont fondées sur les réponses à la question suivante :

- Avez-vous utilisé un condom la dernière fois que vous avez eu des relations sexuelles?

Comme la détermination de l'usage du condom est fondée sur la relation sexuelle la plus récente, les chiffres ne reflètent pas nécessairement le comportement typique d'un individu. Il est également possible que la question proprement dite crée une certaine confusion, car il n'est pas précisé s'il s'agit d'un condom masculin ou féminin.

La prévalence des maladies transmises sexuellement (MTS), également appelées infections transmises sexuellement (ITS), chez les jeunes qui étaient actifs sexuellement est fondée sur les réponses à la question suivante :

- A-t-on déjà diagnostiqué chez vous une maladie transmise sexuellement?

## Condom

Un peu moins de 4 jeunes sur 10 âgés de 15 à 24 ans qui étaient actifs sexuellement et qui avaient eu plusieurs partenaires l'année précédente et(ou) qui étaient célibataires n'avaient pas utilisé de condom la dernière fois qu'ils avaient eu des relations sexuelles. À cet égard, la proportion était significativement plus faible à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, et significativement plus élevée au Québec (tableau B).

L'utilisation d'un condom dépend bien sûr de nombreux autres facteurs. Ainsi, en tenant compte des effets de l'âge, de l'âge lors de la première relation sexuelle, du statut d'autochtone et de l'état matrimonial, la cote exprimant le risque d'avoir des relations sexuelles sans utiliser de condom était plus forte pour les jeunes femmes au Québec et au Nouveau-Brunswick, comparativement à leurs homologues de l'Ontario (données non présentées).

## Relations sexuelles sans condom

Les filles étaient plus susceptibles que les garçons d'avoir des relations sexuelles sans condom (tableau B), comme en témoignent d'ailleurs d'autres études<sup>1-4</sup>. La différence que révèle la présente analyse tient peut-être, en partie, à l'énoncé de la question concernant l'utilisation d'un condom, « Avez-vous utilisé un condom...? ». Ainsi, les filles pourraient avoir pensé qu'on leur demandait si elles avaient utilisé un condom féminin et non si leur partenaire en portait un.

Chez les femmes, il existe un lien entre la déclaration de relations sexuelles sans condom et l'âge de la première expérience. Près de 60 % des filles qui avaient déjà eu des relations sexuelles à l'âge de 13 ans ont déclaré ne pas avoir utilisé de condom lors de leurs dernières relations. Il en allait de même de 46 % des filles qui avaient commencé à avoir des relations sexuelles entre 14 et 17 ans et de 37 % de celles qui avaient commencé entre 20 et 24 ans. En outre, la cote exprimant le risque de ne pas utiliser de condom est plus élevée chez les filles qui avaient

commencé à avoir des relations sexuelles au début de l'adolescence, et ce, en dépit de la prise en compte d'autres facteurs d'influence (données non présentées).

## Utilisation du condom selon le nombre de partenaires et l'âge

Les jeunes qui n'avaient eu qu'un seul partenaire sexuel l'année précédente étaient moins susceptibles de déclarer avoir utilisé un condom la dernière fois qu'ils avaient eu des relations sexuelles que ceux ayant eu plus d'un partenaire. Cette association persiste aussi même en tenant compte de l'effet d'autres facteurs (données non présentées).

L'omission du port du condom dans les relations sexuelles était plus fréquente chez les jeunes de 20 à 24 ans. En fait, 44 % de ces derniers ont déclaré ne pas avoir utilisé de condom la dernière fois qu'ils avaient eu des rapports sexuels (tableau B). Les proportions correspondantes sont de 33 % pour le groupe de 18 et 19 ans et de 22 % pour celui des 15

à 17 ans. Même en tenant compte d'autres facteurs, ce lien entre l'âge et l'usage du condom persiste. De nouveau, il se peut que les relations de longue durée avec un seul partenaire soient plus fréquentes chez le groupe plus âgé et que l'usage du condom soit par conséquent perçu comme moins important.

Les relations sexuelles sans protection étaient presque aussi fréquentes chez les jeunes autochtones que chez les jeunes non autochtones. Cependant, si l'on analyse les données séparément pour les garçons et pour les filles et que l'on tient compte d'autres facteurs d'influence, la cote exprimant le risque de ne pas utiliser de condom est presque deux fois plus élevée pour les jeunes hommes autochtones que pour leurs homologues non autochtones (données non présentées).

## Maladies transmises sexuellement

S'il est utilisé correctement et systématiquement, le condom s'avère une barrière efficace qui protège contre de nombreuses maladies transmises sexuellement (MTS), aujourd'hui appelées infections transmises sexuellement (ITS), dont la gonorrhée et l'infection à Chlamydia. Or le port du condom chez les jeunes de 15 à 24 ans demeure erratique<sup>1,8-10</sup>, et ce, quoique de récentes études aient révélé que la prévalence de ces maladies chez les jeunes est encore élevée, voire à la hausse<sup>11-12</sup>.

Selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2003, 4 % des jeunes de 15 à 24 ans (environ 106 000) qui avaient eu des relations sexuelles au moins une fois au cours de leur vie ont dit avoir reçu un diagnostic de MTS (tableau C). Étant donné la possible absence de symptômes et/ou le manque de sensibilisation au problème, ces chiffres ne représentent vraisemblablement qu'une fraction du nombre réel d'infections chez ce groupe d'âge.

En 2003, un nombre plus de deux fois plus élevé de filles que de garçons de 15 à 24 ans ont déclaré qu'on avait déjà diagnostiqué chez elles une MTS. À ce propos, les soins de santé génésique pour lesquels les filles doivent consulter un médecin sont

### Source des données

La prévalence des relations sexuelles, de l'usage du condom et des maladies transmises sexuellement chez les jeunes de 15 à 24 ans a été estimée au moyen de données provenant de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2003, réalisée de janvier à décembre de cette année-là. L'ESCC a pour champ d'observation la population de 12 ans et plus vivant à domicile. Elle n'inclut pas les habitants des réserves indiennes, ni ceux des bases des Forces canadiennes et de certaines régions éloignées<sup>5</sup>.

Le taux global de réponse était de 80,6 %; la taille totale de l'échantillon était de 135 573. La présente analyse est fondée sur un échantillon de 18 084 personnes, pondérées de sorte qu'elles soient représentatives de la population à domicile de 15 à 24 ans en 2003. Toutes les écarts ont été soumis à des tests afin d'en déterminer la signification statistique, dont le niveau a été fixé à 0,05. Pour tenir compte des effets du plan de sondage, les erreurs-types et les coefficients de variation ont été estimés selon la méthode du *bootstrap*<sup>6,7</sup>.

sans doute ce pourquoi davantage de diagnostics de MTS sont posés chez ces dernières<sup>13,14</sup>. En outre, certains programmes de dépistage des MTS visent les femmes<sup>13,14</sup>.

## Âge et risque de MTS

Sans doute parce qu'ils étaient actifs sexuellement depuis un plus grand nombre d'années, les jeunes adultes de 20 à 24 ans étaient nettement plus susceptibles d'avoir reçu un diagnostic de MTS à un moment donné que les jeunes de 15 à 17 ans (tableau C). En outre, d'un point de vue géographique, les jeunes des territoires et du Manitoba étaient plus susceptibles d'être dans cette situation que ceux des autres provinces (données non présentées).

Avoir eu une première relation sexuelle à un âge précoce, être autochtone et avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires l'année précédente sont autant de facteurs qui accroissent

le risque de MTS. Les jeunes qui avaient déjà eu des relations sexuelles à l'âge de 13 ans étaient deux fois plus susceptibles de déclarer une MTS que ceux dont la première expérience avait eu lieu à un âge plus avancé. La proportion de jeunes autochtones déclarant une MTS était 2,5 fois plus élevée que la proportion correspondante chez les jeunes non autochtones.

Ne pas utiliser de condom est bien entendu associé à un risque plus élevé de MTS. À cet égard, la proportion de jeunes ayant déclaré une MTS était deux fois plus élevée chez ceux qui n'avaient pas utilisé de condom lors de leur dernière relation sexuelle que chez ceux qui l'avaient fait (6 % contre 3 %).

Michelle Rotermann (613-951-3166; Michelle.Rotermann@statcan.ca) travaille à la Division de la statistique de la santé à Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

## Références

1. K. Martin et Z. Wu, « Contraceptive use in Canada: 1984-1995 », *Family Planning Perspectives*, 32(2), 2000, p. 65-73.
2. Matika-Tyndale, A. McKay et M. Barrett, Teenage Sexual and Reproductive Behavior in Developed Countries—Country Report For Canada 2001, disponible à : [http://www.guttmacher.org/pubs/canada\\_teen.pdf](http://www.guttmacher.org/pubs/canada_teen.pdf), site consulté le 9 août 2004.
3. Matika-Tyndale, M. Barrett et A. McKay, « Adolescent sexual and reproductive health in Canada: A review of national data sources and their limitations », *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 9(1), 2000, p. 41-65.
4. Ford, W. Sohn et J. Lepkowski, « Characteristics of adolescents' sexual partners and their association with use of condoms and other contraceptive methods », *Family Planning Perspectives*, 33(3), 2001, p. 101-105, 132.
5. Y. Béland, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - aperçu de la méthodologie », *Rapports sur la santé*, 13(3), 2002, p. 9-15 (Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue).
6. J.N.K. Rao, G.F.J. Wu et K. Yue, « Quelques travaux récents sur les méthodes de rééchantillonnage applicables aux enquêtes complexes », *Techniques d'enquête*, 18(2), 1992, p. 225-234 (Statistique Canada, n° 12-001 au catalogue).
7. K.F. Rust et J.N.K. Rao, « Variance estimation for complex surveys using replication techniques », *Statistical Methods in Medical Research*, 5, 1996, p. 281-310.
8. D.A. Gleit, « Measuring contraceptive use patterns among teenage and adult women », *Family Planning Perspectives*, 31(2), 1999, p. 73-80.
9. N.L. Galambos et L.C. Tilton-Weaver, « Comportements à risque multiple chez les adolescents et les jeunes adultes », *Rapports sur la santé*, 10(2), 1998, p. 9-21 (Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue).
10. B.H. Thomas, A. CiCenso et L. Griffith, « Adolescent sexual behaviour: results from an Ontario sample », *La revue canadienne de santé publique*, 89(2), 1998, p. 94-97.
11. Santé Canada, Maladies transmissibles sexuellement (MTS) au Canada : Rapport de surveillance 1998 et 1999, disponible à : <http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/00pdf/cdr26s6f.pdf>, site consulté le 9 août 2004.
12. Agence de santé publique du Canada, Rapport de surveillance 2002 des infections transmises sexuellement (ITS) au Canada : Version préliminaire, disponible à : [http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/stddata\\_pre06\\_04/index\\_f.html](http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/stddata_pre06_04/index_f.html), site consulté le 19 novembre 2004.
13. C. Panchaud, S. Singh, D. Feivelson *et al.*, « Sexually transmitted diseases among adolescents in developed countries », *Family Planning Perspectives*, 32(1), 2000, p. 24-32, 45.
14. T. Wong, S. Singh, J. Mann *et al.*, Gender differences in bacterial STIs in Canada. *BMC Women's Health* 2004, 4(supplément 1), p. S26, disponible à : <http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6874-4-S1-S26.pdf>, site consulté le 19 novembre 2004.

Tableau A

Pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui avaient eu des relations sexuelles au moins une fois, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada, 2003

	Total		Garçons		Filles <sup>†</sup>	
	milliers	%	milliers	%	milliers	%
Total	2 604,2	61,9	1 321,1	61,5	1 283,1	62,3
<b>Groupe d'âge</b>						
15 à 17 ans <sup>†</sup>	349,7	28,1	173,4	27,4	176,3	28,8
18 à 19 ans	515,9	64,7*	265,3	65,6*	250,6	63,8*
20 à 24 ans	1 738,6	80,2*	882,4	79,4*	856,1	81,1*
<b>État matrimonial</b>						
Célibataire (jamais marié(e)/séparé(e)/divorcé(e)/veuf(ve))	2 224,2	58,5*	1 189,7	59,2*	1 034,6	57,6*
Marié(e)/Union libre <sup>†</sup>	378,2	94,1	130,8	94,7	247,4	93,8
<b>Autochtone</b>						
Oui	135,3	75,7*	54,9	70,5*	80,4	79,7*
Non <sup>†</sup>	2 384,3	62,8	1 221,2	62,5	1 163,2	63,0
<b>Province ou territoire</b>						
Terre-Neuve-et-Labrador	51,1	67,9 <sup>§</sup>	25,4	63,9	25,7	72,3 <sup>§</sup>
Île-du-Prince-Édouard	11,9	62,7	5,7	60,1	6,1	65,3
Nouvelle-Écosse	80,8	64,2	38,6	61,0	42,2	67,5
Nouveau-Brunswick	66,3	68,0 <sup>§</sup>	33,8	65,1	32,6	71,3 <sup>§</sup>
Québec	704,0	73,8 <sup>§</sup>	361,7	73,3 <sup>§</sup>	342,3	74,3 <sup>§</sup>
Ontario	961,7	58,1 <sup>§</sup>	489,7	58,0 <sup>§</sup>	472,0	58,3 <sup>§</sup>
Manitoba	89,5	61,8	44,5	63,5	45,0	60,2
Saskatchewan	78,3	56,4 <sup>§</sup>	37,0	53,8 <sup>§</sup>	41,3	58,9
Alberta	258,4	57,3 <sup>§</sup>	132,5	56,1 <sup>§</sup>	125,9	58,6
Colombie-Britannique	292,1	54,8 <sup>§</sup>	147,9	56,0 <sup>§</sup>	144,2	53,6 <sup>§</sup>
Territoires	10,0	67,2	4,3	60,4	5,7	73,3 <sup>§</sup>

Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003

<sup>†</sup> Groupe de référence.

\* Valeur significativement différente de l'estimation pour le groupe de référence ( $p < 0,05$ ).

§ Valeur significativement différente de l'estimation pour le total du Canada ou pour le total des garçons/filles ( $p < 0,05$ ).

Tableau B

**Non-usage du condom chez les jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellement qui étaient célibataires et/ou avaient eu des relations sexuelles avec plus d'un(e) partenaire l'année précédente, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada, 2003**

	N'a pas utilisé de condom la dernière fois					
	Total		Garçons		Filles <sup>1</sup>	
	milliers	%	milliers	%	milliers	%
<b>Total</b>	771,8	37,8	350,0	32,7 <sup>§</sup>	421,8	43,5
<b>Groupe d'âge</b>						
15 à 17 ans	65,4	21,5 <sup>†</sup>	22,3	14,8 <sup>§</sup>	43,1	28,0
18 à 19 ans	146,2	32,5 <sup>†</sup>	58,1	25,2 <sup>§</sup>	88,0	40,0
20 à 24 ans	560,3	43,6 <sup>†</sup>	269,5	39,1 <sup>§</sup>	290,7	48,8
<b>Nombre de partenaires</b>						
Un(e) <sup>†</sup>	533,2	41,0	243,1	38,4 <sup>§</sup>	290,1	43,6
Plus d'un(e)	238,6	32,3 <sup>*</sup>	106,8	24,6 <sup>§</sup>	131,7	43,4
Deux	133,4	34,0 <sup>*</sup>	49,3	24,2 <sup>§</sup>	84,1	44,4
Trois	50,4	30,5 <sup>*</sup>	26,3	25,7 <sup>§</sup>	24,1	38,5
Quatre ou plus	54,8	30,3 <sup>*</sup>	31,2	24,2 <sup>§</sup>	23,5	45,5
<b>Âge lors de la première relation sexuelle</b>						
13 ans et moins <sup>†</sup>	49,4	42,8	22,1	32,1 <sup>§</sup>	27,3	58,8
14 à 17 ans	522,2	38,9	235,6	33,0 <sup>§</sup>	286,5	45,7 <sup>*</sup>
18 ans et plus	200,2	34,4 <sup>*</sup>	92,3	32,1	108,0	36,5 <sup>*</sup>
<b>Autochtone</b>						
Oui	41,4	42,4	16,2 <sup>E</sup>	41,7	25,1	42,8
Non <sup>†</sup>	703,2	37,5	320,9	32,3 <sup>§</sup>	382,3	43,5
<b>État matrimonial</b>						
Célibataire (jamais marié(e)/séparé(e)/divorcé(e)/veuf(e))	754,8	37,5 <sup>*</sup>	344,1	32,5 <sup>§</sup>	410,7	43,0
Marié(e)/Union libre <sup>†</sup>	16,0 <sup>E</sup>	63,3 <sup>E</sup>	F	49,2 <sup>E</sup>	10,3 <sup>E</sup>	75,3
<b>Province ou territoire</b>						
Terre-Neuve-et-Labrador	11,7 <sup>E</sup>	29,6 <sup>*</sup>	4,9 <sup>E</sup>	23,1 <sup>E</sup>	6,9 <sup>E</sup>	37,0
Île-du-Prince-Édouard	2,5 <sup>E</sup>	27,5 <sup>E</sup>	F	F	2,0 <sup>E</sup>	43,3
Nouvelle-Écosse	18,2	28,6 <sup>*</sup>	6,8 <sup>E</sup>	22,9 <sup>E</sup>	11,4 <sup>E</sup>	33,5
Nouveau-Brunswick	20,1	38,9	7,6 <sup>E</sup>	28,2 <sup>§E</sup>	12,5	50,6
Québec	241,4	44,3 <sup>*</sup>	106,6	37,0 <sup>§</sup>	134,8	52,4
Ontario	270,5	34,9 <sup>*</sup>	130,5	32,0 <sup>§</sup>	140,0	38,1
Manitoba	26,5	36,5	12,5 <sup>E</sup>	33,3 <sup>E</sup>	14,0	39,8
Saskatchewan	19,4	33,9	7,1 <sup>E</sup>	24,7 <sup>§E</sup>	12,3	43,3
Alberta	76,0	40,4	36,4	36,3	39,6	45,1
Colombie-Britannique	83,4	36,3	36,2	29,8 <sup>§</sup>	47,2	43,5
Territoires	2,0	29,9	0,9 <sup>E</sup>	28,4 <sup>E</sup>	1,2 <sup>E</sup>	31,0 <sup>E</sup>

Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003

<sup>†</sup> Groupe de référence.

<sup>‡</sup> Valeur significativement différente de l'estimation pour tous les autres groupes ( $p < 0,05$ ).

<sup>§</sup> Valeur significativement différente de l'estimation pour les filles ( $p < 0,05$ ).

<sup>\*</sup> Valeur significativement différente de l'estimation pour le groupe de référence ou de l'estimation pour le total du Canada ou pour le total des garçons/filles ( $p < 0,05$ ).

<sup>E</sup> Coefficient de variation compris entre 16,6 % à 33,3 %.

<sup>F</sup> Coefficient de variation supérieur à 33,3 %.



Tableau C

MTS autodéclarées, jeunes de 15 à 24 ans ayant déjà eu des relations sexuelles, selon le sexe et certaines caractéristiques, Canada, 2003

	Total		Garçons		Filles <sup>†</sup>	
	milliers	%	milliers	%	milliers	%
Total	105,7	4,1	30,5	2,3 <sup>§</sup>	75,2	6,0
<b>Groupe d'âge</b>						
15 à 17 ans <sup>†</sup>	6,3 <sup>E</sup>	1,8 <sup>E</sup>	F	F	4,3 <sup>E</sup>	2,5 <sup>E</sup>
18 à 19 ans	12,2	2,4	2,7 <sup>E</sup>	1,0 <sup>1E</sup>	9,5 <sup>E</sup>	3,8 <sup>E</sup>
20 à 24 ans	87,3	5,1*	25,8	3,0 <sup>†</sup>	61,4	7,3
<b>Nombre de partenaires</b>						
Un(e) <sup>†</sup>	57,4	3,5	12,1 <sup>E</sup>	1,6 <sup>1E</sup>	45,3	5,1
Plus d'un(e)	45,7	6,2*	17,9 <sup>E</sup>	4,1 <sup>1E</sup>	27,7	9,1
Deux	19,0 <sup>E</sup>	4,8	3,8 <sup>E</sup>	1,9 <sup>1E</sup>	15,2 <sup>E</sup>	8,1 <sup>E</sup>
Trois	7,8 <sup>E</sup>	4,7 <sup>E</sup>	F	F	4,5 <sup>E</sup>	7,2 <sup>E</sup>
Quatre ou plus	18,8 <sup>E</sup>	10,4 <sup>E</sup>	10,8 <sup>E</sup>	8,4 <sup>E</sup>	8,0 <sup>E</sup>	15,5 <sup>E</sup>
<b>Âge lors de la première relation sexuelle</b>						
13 ans et moins <sup>†</sup>	16,3	10,7	3,6 <sup>E</sup>	4,2 <sup>1E</sup>	12,7 <sup>E</sup>	19,1
14 à 17 ans	69,0	4,2*	21,0	2,5 <sup>†</sup>	48,0	6,0
18 ans et plus	20,4 <sup>E</sup>	2,7* <sup>E</sup>	F	F	14,5 <sup>E</sup>	3,7 <sup>E</sup>
<b>Usage du condom la dernière fois</b>						
Oui <sup>†</sup>	37,3	2,9*	13,5 <sup>E</sup>	1,9 <sup>1*E</sup>	23,8	4,4*
Non <sup>†</sup>	48,8	6,3	13,7 <sup>E</sup>	3,9 <sup>1E</sup>	35,1	8,3
<b>Autochtone</b>						
Oui <sup>†</sup>	12,8 <sup>E</sup>	9,7*	3,9 <sup>E</sup>	7,5 <sup>E</sup>	8,9 <sup>E</sup>	11,1 <sup>E</sup>
Non	91,1	3,9	26,5	2,2 <sup>†</sup>	64,6	5,6

Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003

<sup>†</sup> Groupe de référence.

<sup>‡</sup> Valeur significativement différente de l'estimation pour les filles ( $p < 0,05$ ).

\* Valeur significativement différente de l'estimation pour le groupe de référence ( $p < 0,05$ ).

<sup>E</sup> Coefficient de variation compris entre 16,6 % et 33,3 %.

<sup>F</sup> Coefficient de variation supérieur à 33,3 %.