

Tableau 1.2.7.1 Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités	Population			Douleur ou malaise n'empêche pas les activités		Douleur ou malaise empêche peu d'activités		Douleur ou malaise empêche quelques activités		Douleur ou malaise empêche la plupart des activités		Douleur ou malaise, non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995													
Total, 4 ans et plus	27 077 641	22 809 473	84,2	1 346 149	5,0	1 342 381	5,0	768 678	2,8	659 853	2,4	151 107	0,6
Hommes	13 379 456	11 593 595	86,7	652 941	4,9	473 062	3,5	300 065	2,2	283 234	2,1	76 559	0,6
Femmes	13 698 186	11 215 878	81,9	693 208	5,1	869 319	6,3	468 612	3,4	376 620	2,7	74 548	0,5
4 à 11 ans	3 129 038	2 981 121	95,3	66 636	2,1	22 493	0,7	--	--	--	--	44 098	1,4
Hommes	1 599 121	1 525 958	95,4	33 233	2,1	--	--	--	--	--	--	24 637	1,5
Femmes	1 529 917	1 455 164	95,1	33 403	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
12 à 14 ans	1 326 126	1 255 770	94,7	39 185	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Hommes	705 740	668 987	94,8	21 370	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	620 386	586 783	94,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 à 19 ans	2 046 276	1 821 388	89,0	96 998	4,7	83 333	4,1	28 927	1,4	--	--	--	--
Hommes	1 057 275	974 796	92,2	51 000	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	989 001	846 592	85,6	45 998	4,7	63 338	6,4	--	--	--	--	--	--
20 à 24 ans	1 739 548	1 563 565	89,9	61 715	3,5	61 031	3,5	33 007	1,9	--	--	--	--
Hommes	837 416	774 579	92,5	35 146	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	902 131	788 987	87,5	26 569	2,9	47 616	5,3	25 255	2,8	--	--	--	--
25 à 34 ans	4 755 494	4 181 513	87,9	209 961	4,4	208 413	4,4	80 373	1,7	56 673	1,2	--	--
Hommes	2 337 762	2 084 079	89,1	104 075	4,5	78 122	3,3	28 421	1,2	27 350	1,2	--	--
Femmes	2 417 731	2 097 434	86,8	105 886	4,4	130 291	5,4	51 952	2,1	29 323	1,2	--	--
35 à 44 ans	4 864 333	4 107 049	84,4	282 580	5,8	225 027	4,6	120 926	2,5	113 073	2,3	--	--
Hommes	2 474 090	2 127 585	86,0	145 587	5,9	83 535	3,4	53 308	2,2	56 199	2,3	--	--
Femmes	2 390 243	1 979 464	82,8	136 993	5,7	141 492	5,9	67 618	2,8	56 874	2,4	--	--
45 à 54 ans	3 504 060	2 784 319	79,5	225 404	6,4	170 451	4,9	167 185	4,8	135 271	3,9	21 430	0,6
Hommes	1 817 047	1 490 907	82,1	114 823	6,3	67 350	3,7	78 642	4,3	56 152	3,1	--	--
Femmes	1 687 013	1 293 411	76,7	110 581	6,6	103 101	6,1	88 543	5,2	79 119	4,7	--	--
55 à 64 ans	2 461 801	1 899 777	77,2	129 345	5,3	176 228	7,2	128 039	5,2	113 487	4,6	--	--
Hommes	1 152 384	938 834	81,5	52 008	4,5	57 796	5,0	42 398	3,7	54 884	4,8	--	--
Femmes	1 309 417	960 944	73,4	77 338	5,9	118 432	9,0	85 641	6,5	58 603	4,5	--	--
65 à 74 ans	2 059 917	1 442 441	70,0	146 147	7,1	229 714	11,2	115 506	5,6	103 166	5,0	22 944	1,1
Hommes	920 211	680 002	73,9	57 617	6,3	73 227	8,0	57 811	6,3	43 406	4,7	--	--
Femmes	1 139 706	762 439	66,9	88 531	7,8	156 487	13,7	57 695	5,1	59 760	5,2	--	--
75 ans et plus	1 191 050	772 530	64,9	88 178	7,4	145 907	12,3	79 295	6,7	99 327	8,3	--	--
Hommes	478 409	327 869	68,5	38 081	8,0	58 552	12,2	--	--	35 553	7,4	--	--
Femmes	712 640	444 661	62,4	50 096	7,0	87 355	12,3	62 939	8,8	63 774	8,9	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans et plus qui déclarent avoir une douleur ou un malaise qui empêche régulièrement certaines activités.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040003.

Tableau 1.2.7.1 Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités	Population		Aucune douleur ou malaise		Douleur ou malaise n'empêche pas les activités		Douleur ou malaise empêche peu d'activités		Douleur ou malaise empêche quelques activités		Douleur ou malaise empêche la plupart des activités		Douleur ou malaise, non déclaré	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997														
Total, 4 ans et plus	27 834 242		24 481 551	88,0	897 303	3,2	1 107 399	4,0	752 135	2,7	561 772	2,0	34 082	0,1
Hommes	13 755 681		12 311 349	89,5	441 365	3,2	434 302	3,2	278 638	2,0	269 160	2,0	20 867	0,2
Femmes	14 078 561		12 170 202	86,4	455 939	3,2	673 097	4,8	473 497	3,4	292 611	2,1	--	--
4 à 11 ans	3 239 356		3 148 941	97,2	66 161	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Hommes	1 656 240		1 621 560	97,9	22 718	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	1 583 115		1 527 380	96,5	43 443	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
12 à 14 ans	1 150 763		1 111 695	96,6	15 415	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Hommes	580 013		571 702	98,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	570 750		539 992	94,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15 à 19 ans	2 110 798		1 986 424	94,1	40 248	1,9	45 737	2,2	25 986	1,2	--	--	--	--
Hommes	1 085 999		1 047 117	96,4	19 928	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	1 024 799		939 307	91,7	20 320	2,0	33 014	3,2	22 601	2,2	--	--	--	--
20 à 24 ans	1 872 592		1 745 501	93,2	40 421	2,2	50 526	2,7	23 409	1,3	--	--	--	--
Hommes	924 260		904 909	95,4	16 473	1,7	14 544	1,5	--	--	--	--	--	--
Femmes	924 332		840 592	90,9	23 948	2,6	35 982	3,9	18 008	1,9	--	--	--	--
25 à 34 ans	4 471 514		4 065 789	90,9	119 441	2,7	155 707	3,5	74 342	1,7	51 651	1,2	--	--
Hommes	2 208 852		2 026 422	91,7	61 327	2,8	60 960	2,8	27 857	1,3	29 300	1,3	--	--
Femmes	2 262 662		2 039 367	90,1	58 113	2,6	94 747	4,2	46 486	2,1	22 351	1,0	--	--
35 à 44 ans	5 237 644		4 640 789	88,6	158 017	3,0	200 802	3,8	139 619	2,7	96 419	1,8	--	--
Hommes	2 644 862		2 350 461	88,9	94 759	3,6	78 212	3,0	64 624	2,4	55 646	2,1	--	--
Femmes	2 592 782		2 290 328	88,3	63 258	2,4	122 590	4,7	74 995	2,9	40 773	1,6	--	--
45 à 54 ans	3 770 504		3 182 850	84,4	181 872	4,8	167 448	4,4	124 285	3,3	110 821	2,9	--	--
Hommes	1 921 647		1 646 631	85,7	102 839	5,4	67 411	3,5	53 193	2,8	49 772	2,6	--	--
Femmes	1 848 857		1 536 219	83,1	79 033	4,3	100 037	5,4	71 092	3,8	61 049	3,3	--	--
55 à 64 ans	2 564 964		2 028 315	79,1	122 938	4,8	176 558	6,9	131 814	5,1	96 796	3,8	--	--
Hommes	1 231 133		1 001 328	81,3	61 510	5,0	65 600	5,3	44 209	3,6	51 453	4,2	--	--
Femmes	1 333 831		1 026 987	77,0	61 428	4,6	110 958	8,3	87 605	6,6	45 343	3,4	--	--
65 à 74 ans	2 095 818		1 629 648	77,8	100 836	4,8	170 269	8,1	119 132	5,7	71 782	3,4	--	--
Hommes	929 806		743 730	80,0	34 815	3,7	73 988	8,0	43 455	4,7	31 503	3,4	--	--
Femmes	1 166 012		885 918	76,0	66 021	5,7	96 282	8,3	75 677	6,5	40 279	3,5	--	--
75 ans et plus	1 320 289		941 600	71,3	51 953	3,9	122 607	9,3	101 502	7,7	96 232	7,3	--	--
Hommes	548 869		397 488	72,4	20 662	3,8	56 831	10,4	33 460	6,1	38 445	7,0	--	--
Femmes	771 420		544 112	70,5	31 292	4,1	65 776	8,5	68 042	8,8	57 787	7,5	--	--

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans et plus qui déclarent avoir une douleur ou un malaise qui empêche régulièrement certaines activités.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040003.

Tableau 1.2.7.1 Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités	Population		Aucune douleur ou malaise		Douleur ou malaise n'empêche pas les activités		Douleur ou malaise empêche peu d'activités		Douleur ou malaise empêche quelques activités		Douleur ou malaise empêche la plupart des activités		Douleur ou malaise, non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
1998/1999														
Total, 4 ans et plus	28 091 727	24 587 107	87,5	882 655	3,1	1 220 106	4,3	851 618	3,0	536 382	1,9	--	--	
Hommes	13 883 550	12 381 659	89,2	413 143	3,0	513 480	3,7	321 847	2,3	244 242	1,8	--	--	
Femmes	14 208 177	12 205 448	85,9	469 513	3,3	706 626	5,0	529 771	3,7	292 140	2,1	--	--	
4 à 11ans	3 175 600	3 108 058	97,9	27 062	0,9	31 112	1,0	--	--	--	--	--	--	
Hommes	1 624 463	1 596 123	98,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Femmes	1 551 137	1 511 935	97,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
12 à 14 ans	1 132 916	1 106 380	97,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Hommes	596 301	587 483	98,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Femmes	536 615	518 896	96,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
15 à 19 ans	2 140 371	2 060 860	96,3	--	--	29 673	1,4	25 522	1,2	--	--	--	--	
Hommes	1 092 483	1 066 952	97,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Femmes	1 047 889	993 908	94,8	--	--	23 711	2,3	--	--	--	--	--	--	
20 à 24 ans	1 929 787	1 826 032	94,6	48 730	2,5	36 737	1,9	--	--	--	--	--	--	
Hommes	970 659	932 041	96,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Femmes	959 127	893 991	93,2	25 262	2,6	24 805	2,6	--	--	--	--	--	--	
25 à 34 ans	4 124 839	3 781 029	91,7	90 706	2,2	130 008	3,2	91 400	2,2	31 338	0,8	--	--	
Hommes	2 034 597	1 885 117	92,7	47 727	2,3	48 088	2,4	41 025	2,0	--	--	--	--	
Femmes	2 090 241	1 895 911	90,7	42 979	2,1	81 919	3,9	50 375	2,4	--	--	--	--	
35 à 44 ans	5 423 410	4 719 408	87,0	170 008	3,1	255 645	4,7	179 772	3,3	95 656	1,8	--	--	
Hommes	2 740 807	2 396 260	87,4	98 460	3,6	129 710	4,7	76 912	2,8	39 465	1,4	--	--	
Femmes	2 682 603	2 323 148	86,6	71 548	2,7	125 935	4,7	102 860	3,8	56 191	2,1	--	--	
45 à 54 ans	3 985 865	3 312 043	83,1	175 287	4,4	241 319	6,1	157 893	4,0	95 994	2,4	--	--	
Hommes	1 953 552	1 674 029	85,7	73 512	3,8	108 867	5,6	44 425	2,3	49 392	2,5	--	--	
Femmes	2 032 312	1 638 015	80,6	101 775	5,0	132 451	6,5	113 468	5,6	46 603	2,3	--	--	
55 à 64 ans	2 691 326	2 126 408	79,0	146 946	5,5	197 030	7,3	139 854	5,2	81 088	3,0	--	--	
Hommes	1 353 049	1 107 530	81,9	65 087	4,8	89 720	6,6	56 499	4,2	34 212	2,5	--	--	
Femmes	1 338 278	1 018 878	76,1	81 859	6,1	107 310	8,0	83 355	6,2	46 876	3,5	--	--	
65 à 74 ans	1 999 320	1 518 242	75,9	113 550	5,7	149 950	7,5	120 085	6,0	94 641	4,7	--	--	
Hommes	905 148	711 403	78,6	39 855	4,4	48 391	5,3	53 580	5,9	49 067	5,4	--	--	
Femmes	1 094 172	806 839	73,7	73 695	6,7	101 559	9,3	66 505	6,1	45 574	4,2	--	--	
75 ans et plus	1 488 293	1 028 647	69,1	84 618	5,7	144 257	9,7	116 606	7,8	111 547	7,5	--	--	
Hommes	612 491	424 722	69,3	48 880	8,0	55 524	9,1	34 776	5,7	47 730	7,8	--	--	
Femmes	875 802	603 926	69,0	35 739	4,1	88 733	10,1	81 831	9,3	63 817	7,3	--	--	

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995


2. Personnes de 4 ans et plus qui déclarent avoir une douleur ou un malaise qui empêche régulièrement certaines activités.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040003.

Tableau 1.2.7.1 Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999



Statistics
Canada



Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.