

Tableau 1.2.8.2 Intensité des douleurs ou des malaises, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Population		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères		Intensité des douleurs ou des malaises non déclarée	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995												
Canada	27 077 257		22 809 473	84,2	1 270 454	4,7	2 223 837	8,2	622 770	2,3	150 723	0,6
Hommes	13 379 120		11 593 595	86,7	586 784	4,4	876 424	6,6	246 094	1,8	76 223	0,6
Femmes	13 698 137		11 215 878	81,9	683 670	5,0	1 347 413	9,8	376 676	2,7	74 500	0,5
Terre-Neuve	546 482		498 025	91,1	9 396	1,7	29 232	5,3	6 957	1,3	--	--
Hommes	274 482		249 782	91,0	--	--	15 404	5,6	--	--	--	--
Femmes	272 000		248 243	91,3	5 937	2,2	13 829	5,1	--	--	--	--
Île-du-Prince-Édouard	125 537		112 176	89,4	2 593	2,1	7 952	6,3	2 566	2,0	--	--
Hommes	62 002		54 703	88,2	1 560	2,5	3 842	6,2	1 717	2,8	--	--
Femmes	63 535		57 472	90,5	1 033	1,6	4 111	6,5	--	--	--	--
Nouvelle-Écosse	863 479		729 976	84,5	25 600	3,0	78 953	9,1	25 944	3,0	--	--
Hommes	421 275		366 981	87,1	10 089	2,4	32 635	7,7	11 571	2,7	--	--
Femmes	442 204		362 995	82,1	15 511	3,5	46 318	10,5	14 373	3,3	--	--
Nouveau-Brunswick	705 945		579 433	82,1	37 347	5,3	65 297	9,2	20 835	3,0	--	--
Hommes	348 041		293 567	84,3	15 378	4,4	27 656	7,9	8 865	2,5	--	--
Femmes	357 904		285 867	79,9	21 969	6,1	37 642	10,5	11 970	3,3	--	--
Québec	6 754 814		5 388 710	79,8	457 463	6,8	656 871	9,7	224 548	3,3	27 222	0,4
Hommes	3 325 261		2 716 890	81,7	223 610	6,7	282 158	8,5	94 225	2,8	--	--
Femmes	3 429 553		2 671 820	77,9	233 853	6,8	374 713	10,9	130 323	3,8	--	--
Ontario	10 234 611		8 740 033	85,4	397 421	3,9	810 655	7,9	233 056	2,3	53 446	0,5
Hommes	5 044 998		4 446 794	88,1	177 265	3,5	304 052	6,0	89 696	1,8	27 191	0,5
Femmes	5 189 613		4 293 239	82,7	220 156	4,2	506 602	9,8	143 360	2,8	26 256	0,5
Manitoba	1 013 399		868 172	85,7	46 103	4,5	73 520	7,3	18 882	1,9	--	--
Hommes	501 123		439 500	87,7	16 646	3,3	35 528	7,1	--	--	--	--
Femmes	512 277		428 672	83,7	29 457	5,8	37 992	7,4	14 087	2,7	--	--
Saskatchewan	913 866		773 409	84,6	50 988	5,6	68 681	7,5	13 415	1,5	--	--
Hommes	454 392		392 098	86,3	20 637	4,5	28 927	6,4	--	--	--	--
Femmes	459 474		381 311	83,0	30 351	6,6	39 754	8,7	--	--	--	--
Alberta	2 497 765		2 176 142	87,1	116 399	4,7	152 314	6,1	29 541	1,2	23 368	0,9
Hommes	1 252 707		1 120 444	89,4	57 321	4,6	46 613	3,7	--	--	--	--
Femmes	1 245 057		1 055 698	84,8	59 078	4,7	105 701	8,5	--	--	--	--
Colombie-Britannique	3 421 359		2 943 397	86,0	127 144	3,7	280 362	8,2	47 026	1,4	23 430	0,7
Hommes	1 694 840		1 512 837	89,3	60 817	3,6	99 610	5,9	--	--	--	--
Femmes	1 726 519		1 430 560	82,9	66 327	3,8	180 752	10,5	36 886	2,1	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui ont répondu « oui » ou « non » à la question vérifiant si elles étaient habituellement sans douleur ou sans malaise. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040004.

Tableau 1.2.8.2 Intensité des douleurs ou des malaises, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Population Nombre	Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères		Intensité des douleurs ou des malaises non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997											
Canada	27 834 242	24 481 551	88,0	1 005 090	3,6	1 776 836	6,4	527 240	1,9	43 525	0,2
Hommes	13 755 681	12 311 349	89,5	472 400	3,4	753 092	5,5	194 344	1,4	24 496	0,2
Femmes	14 078 561	12 170 202	86,4	532 689	3,8	1 023 744	7,3	332 896	2,4	19 030	0,1
Terre-Neuve	540 462	492 185	91,1	15 220	2,8	29 280	5,4	--	--	--	--
Hommes	270 866	247 999	91,6	8 143	3,0	12 437	4,6	--	--	--	--
Femmes	269 596	244 185	90,6	7 078	2,6	16 843	6,2	--	--	--	--
Île-du-Prince-Édouard	129 119	116 035	89,9	2 640	2,0	9 208	7,1	1 236	1,0	--	--
Hommes	63 916	57 285	89,6	--	--	5 164	8,1	--	--	--	--
Femmes	65 203	58 750	90,1	1 697	2,6	4 044	6,2	--	--	--	--
Nouvelle-Écosse	869 197	770 875	88,7	25 457	2,9	56 419	6,5	16 446	1,9	--	--
Hommes	422 141	376 692	89,2	7 693	1,8	32 997	7,8	--	--	--	--
Femmes	447 056	394 183	88,2	17 764	4,0	23 422	5,2	11 687	2,6	--	--
Nouveau-Brunswick	714 854	610 407	85,4	28 365	4,0	68 098	9,5	7 984	1,1	--	--
Hommes	352 429	307 194	87,2	15 124	4,3	28 616	8,1	--	--	--	--
Femmes	362 426	303 214	83,7	13 241	3,7	39 481	10,9	6 490	1,8	--	--
Québec	6 903 805	6 034 249	87,4	247 319	3,6	438 805	6,4	183 433	2,7	--	--
Hommes	3 399 501	3 015 906	88,7	124 641	3,7	193 277	5,7	65 678	1,9	--	--
Femmes	3 504 305	3 018 343	86,1	122 678	3,5	245 529	7,0	117 755	3,4	--	--
Ontario	10 549 929	9 344 793	88,6	352 132	3,3	633 122	6,0	198 116	1,9	21 766	0,2
Hommes	5 203 800	4 682 661	90,0	170 265	3,3	263 067	5,1	78 426	1,5	9 381	0,2
Femmes	5 346 130	4 662 132	87,2	181 868	3,4	370 056	6,9	119 689	2,2	12 385	0,2
Manitoba	1 025 974	903 034	88,0	38 898	3,8	68 121	6,6	13 427	1,3	--	--
Hommes	507 617	455 488	89,7	20 011	3,9	26 259	5,2	4 273	0,8	--	--
Femmes	518 357	447 545	86,3	18 887	3,6	41 863	8,1	9 154	1,8	--	--
Saskatchewan	931 643	829 950	89,1	34 548	3,7	55 789	6,0	9 329	1,0	--	--
Hommes	460 338	424 330	92,2	11 747	2,6	16 426	3,6	--	--	--	--
Femmes	471 304	405 621	86,1	22 800	4,8	39 364	8,4	--	--	--	--
Alberta	2 574 190	2 284 895	88,8	94 020	3,7	152 830	5,9	38 653	1,5	3 791	0,1
Hommes	1 294 167	1 167 805	90,2	46 894	3,6	61 366	4,7	16 620	1,3	--	--
Femmes	1 280 023	1 117 090	87,3	47 127	3,7	91 464	7,1	22 033	1,7	2 309	0,2
Colombie-Britannique	3 595 069	3 095 129	86,1	166 490	4,6	265 163	7,4	55 426	1,5	--	--
Hommes	1 780 907	1 575 989	88,5	66 940	3,8	113 484	6,4	--	--	--	--
Femmes	1 814 162	1 519 140	83,7	99 549	5,5	151 679	8,4	40 367	2,2	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui ont répondu « oui » ou « non » à la question vérifiant si elles étaient habituellement sans douleur ou sans malaise. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040004.

Tableau 1.2.8.2 Intensité des douleurs ou des malaises, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Population Nombre	Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères		Intensité des douleurs ou des malaises non déclarée	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999											
Canada	28 091 727	24 587 107	87,5	1 062 385	3,8	1 911 833	6,8	514 776	1,8	--	--
Hommes	13 883 550	12 381 659	89,2	516 853	3,7	769 611	5,5	201 558	1,5	--	--
Femmes	14 208 177	12 205 448	85,9	545 532	3,8	1 142 222	8,0	313 218	2,2	--	--
Terre-Neuve	514 059	468 310	91,1	9 623	1,9	29 208	5,7	6 711	1,3	--	--
Hommes	253 586	235 436	92,8	--	--	11 605	4,6	--	--	--	--
Femmes	260 473	232 874	89,4	--	--	17 604	6,8	5 221	2,0	--	--
Île-du-Prince-Édouard	128 864	114 883	89,2	5 029	3,9	6 058	4,7	2 894	2,2	--	--
Hommes	63 765	56 872	89,2	1 932	3,0	3 416	5,4	1 545	2,4	--	--
Femmes	65 099	58 011	89,1	3 097	4,8	2 641	4,1	1 350	2,1	--	--
Nouvelle-Écosse	870 558	752 977	86,5	28 614	3,3	72 525	8,3	16 441	1,9	--	--
Hommes	428 671	377 660	88,1	10 903	2,5	32 939	7,7	7 169	1,7	--	--
Femmes	441 887	375 317	84,9	17 711	4,0	39 587	9,0	9 272	2,1	--	--
Nouveau-Brunswick	704 277	610 368	86,7	27 135	3,9	53 141	7,5	13 454	1,9	--	--
Hommes	348 683	313 369	89,9	11 828	3,4	17 430	5,0	6 055	1,7	--	--
Femmes	355 594	296 999	83,5	15 306	4,3	35 711	10,0	7 399	2,1	--	--
Québec	6 825 354	6 028 269	88,3	197 008	2,9	434 976	6,4	161 745	2,4	--	--
Hommes	3 360 497	3 031 179	90,2	90 729	2,7	177 887	5,3	57 347	1,7	--	--
Femmes	3 464 856	2 997 090	86,5	106 279	3,1	257 089	7,4	104 399	3,0	--	--
Ontario	10 644 486	9 269 187	87,1	457 614	4,3	726 658	6,8	186 774	1,8	--	--
Hommes	5 235 700	4 606 411	88,0	244 807	4,7	298 502	5,7	81 726	1,6	--	--
Femmes	5 408 786	4 662 775	86,2	212 807	3,9	428 156	7,9	105 048	1,9	--	--
Manitoba	1 017 932	884 828	86,9	41 416	4,1	72 638	7,1	18 848	1,9	--	--
Hommes	504 550	452 126	89,6	14 764	2,9	33 115	6,6	--	--	--	--
Femmes	513 382	432 702	84,3	26 652	5,2	39 523	7,7	14 505	2,8	--	--
Saskatchewan	926 388	800 437	86,4	47 247	5,1	66 462	7,2	12 243	1,3	--	--
Hommes	461 900	413 317	89,5	19 511	4,2	25 387	5,5	--	--	--	--
Femmes	464 489	387 120	83,3	27 736	6,0	41 075	8,8	8 558	1,8	--	--
Alberta	2 715 256	2 423 489	89,3	84 698	3,1	185 003	6,8	20 847	0,8	--	--
Hommes	1 373 750	1 253 924	91,3	38 713	2,8	69 655	5,1	--	--	--	--
Femmes	1 341 506	1 169 565	87,2	45 985	3,4	115 348	8,6	--	--	--	--
Colombie-Britannique	3 744 553	3 234 359	86,4	164 001	4,4	265 165	7,1	74 818	2,0	--	--
Hommes	1 852 448	1 641 365	88,6	78 816	4,3	99 676	5,4	27 958	1,5	--	--
Femmes	1 892 105	1 592 994	84,2	85 184	4,5	165 489	8,7	46 860	2,5	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui ont répondu « oui » ou « non » à la question vérifiant si elles étaient habituellement sans douleur ou sans malaise. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040004.

Tableau 1.2.8.2 Intensité des douleurs ou des malaises, selon le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada et provinces, 1994-1995 - 1998-1999



Statistique Canada
Statistics Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.