

Tableau 1.2.8.1 Intensité des douleurs et des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Population		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères		Intensité des douleurs ou des malaises non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995												
Total, 4 ans et plus	27 077 257		22 809 473	84,2	1 270 454	4,7	2 223 837	8,2	622 770	2,3	150 723	0,6
Hommes	13 379 120		11 593 595	86,7	586 784	4,4	876 424	6,6	246 094	1,8	76 223	0,6
Femmes	13 698 137		11 215 878	81,9	683 670	5,0	1 347 413	9,8	376 676	2,7	74 500	0,5
4 à 11 ans	3 128 654		2 981 121	95,3	52 100	1,7	41 686	1,3	--	--	43 713	1,4
Hommes	1 598 785		1 525 958	95,4	24 044	1,5	--	--	--	--	24 301	1,5
Femmes	1 529 869		1 455 164	95,1	28 055	1,8	21 885	1,4	--	--	--	--
12 à 14 ans	1 326 126		1 255 770	94,7	35 997	2,7	32 298	2,4	--	--	--	--
Hommes	705 740		668 987	94,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	620 386		586 783	94,6	--	--	--	--	--	--	--	--
15 à 19 ans	2 046 276		1 821 388	89,0	91 145	4,5	116 802	5,7	--	--	--	--
Hommes	1 057 275		974 796	92,2	45 408	4,3	31 946	3,0	--	--	--	--
Femmes	989 001		846 592	85,6	45 737	4,6	84 856	8,6	--	--	--	--
20 à 24 ans	1 739 548		1 563 565	89,9	66 520	3,8	87 422	5,0	--	--	--	--
Hommes	837 416		774 579	92,5	29 122	3,5	23 205	2,8	--	--	--	--
Femmes	902 131		788 987	87,5	37 398	4,1	64 217	7,1	--	--	--	--
25 à 34 ans	4 755 494		4 181 513	87,9	180 602	3,8	315 183	6,6	59 635	1,3	--	--
Hommes	2 337 762		2 084 079	89,1	91 564	3,9	125 791	5,4	--	--	--	--
Femmes	2 417 731		2 097 434	86,8	89 038	3,7	189 393	7,8	39 022	1,6	--	--
35 à 44 ans	4 864 333		4 107 049	84,4	245 186	5,0	400 731	8,2	95 688	2,0	--	--
Hommes	2 474 090		2 127 585	86,0	110 657	4,5	187 269	7,6	40 703	1,6	--	--
Femmes	2 390 243		1 979 464	82,8	134 530	5,6	213 462	8,9	54 985	2,3	--	--
45 à 54 ans	3 504 060		2 784 319	79,5	204 812	5,8	359 887	10,3	133 612	3,8	21 430	0,6
Hommes	1 817 047		1 490 907	82,1	105 400	5,8	146 479	8,1	65 088	3,6	--	--
Femmes	1 687 013		1 293 411	76,7	99 412	5,9	213 408	12,7	68 524	4,1	--	--
55 à 64 ans	2 461 801		1 899 777	77,2	96 406	3,9	341 615	13,9	109 078	4,4	--	--
Hommes	1 152 384		938 834	81,5	31 848	2,8	135 754	11,8	39 484	3,4	--	--
Femmes	1 309 417		960 944	73,4	64 558	4,9	205 861	15,7	69 595	5,3	--	--
65 à 74 ans	2 059 917		1 442 441	70,0	167 078	8,1	327 223	15,9	100 231	4,9	22 944	1,1
Hommes	920 211		680 002	73,9	72 891	7,9	125 044	13,6	34 125	3,7	--	--
Femmes	1 139 706		762 439	66,9	94 187	8,3	202 179	17,7	66 106	5,8	--	--
75 ans et plus	1 191 050		772 530	64,9	130 608	11,0	200 990	16,9	81 109	6,8	--	--
Hommes	478 409		327 869	68,5	59 763	12,5	61 138	12,8	27 642	5,8	--	--
Femmes	712 640		444 661	62,4	70 845	9,9	139 853	19,6	53 467	7,5	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui ont répondu « oui » ou « non » à la question vérifiant si elles étaient habituellement sans douleur ou sans malaise. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040004.

Tableau 1.2.8.1 Intensité des douleurs et des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Population		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères		Intensité des douleurs ou des malaises non déclarée	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997												
Total, 4 ans et plus	27 834 242		24 481 551	88,0	1 005 090	3,6	1 776 836	6,4	527 240	1,9	43 525	0,2
Hommes	13 755 681		12 311 349	89,5	472 400	3,4	753 092	5,5	194 344	1,4	24 496	0,2
Femmes	14 078 561		12 170 202	86,4	532 689	3,8	1 023 744	7,3	332 896	2,4	19 030	0,1
4 à 11 ans	3 239 356		3 148 941	97,2	34 175	1,1	48 373	1,5	--	--	--	--
Hommes	1 656 240		1 621 560	97,9	16 021	1,0	--	--	--	--	--	--
Femmes	1 583 115		1 527 380	96,5	18 155	1,1	36 484	2,3	--	--	--	--
12 à 14 ans	1 150 763		1 111 695	96,6	19 111	1,7	--	--	--	--	--	--
Hommes	580 013		571 702	98,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	570 750		539 992	94,6	--	--	--	--	--	--	--	--
15 à 19 ans	2 110 798		1 986 424	94,1	49 569	2,3	56 235	2,7	16 337	0,8	--	--
Hommes	1 085 999		1 047 117	96,4	21 695	2,0	15 037	1,4	--	--	--	--
Femmes	1 024 799		939 307	91,7	27 874	2,7	41 197	4,0	15 379	1,5	--	--
20 à 24 ans	1 872 592		1 745 501	93,2	53 606	2,9	62 902	3,4	--	--	--	--
Hommes	948 260		904 909	95,4	19 170	2,0	21 464	2,3	--	--	--	--
Femmes	924 332		840 592	90,9	34 436	3,7	41 438	4,5	--	--	--	--
25 à 34 ans	4 471 514		4 065 789	90,9	129 377	2,9	234 069	5,2	37 521	0,8	--	--
Hommes	2 208 852		2 026 422	91,7	60 144	2,7	102 648	4,6	16 478	0,7	--	--
Femmes	2 262 662		2 039 367	90,1	69 233	3,1	131 421	5,8	21 043	0,9	--	--
35 à 44 ans	5 237 644		4 640 789	88,6	178 510	3,4	319 506	6,1	96 023	1,8	--	--
Hommes	2 644 862		2 350 461	88,9	93 173	3,5	159 765	6,0	39 617	1,5	--	--
Femmes	2 592 782		2 290 328	88,3	85 336	3,3	159 741	6,2	56 407	2,2	--	--
45 à 54 ans	3 770 504		3 182 850	84,4	186 156	4,9	299 838	8,0	97 923	2,6	--	--
Hommes	1 921 647		1 646 631	85,7	88 423	4,6	139 281	7,2	45 110	2,3	--	--
Femmes	1 848 857		1 536 219	83,1	97 733	5,3	160 557	8,7	52 813	2,9	--	--
55 à 64 ans	2 564 964		2 028 315	79,1	138 202	5,4	291 230	11,4	97 671	3,8	--	--
Hommes	1 231 133		1 001 328	81,3	62 769	5,1	124 443	10,1	34 934	2,8	--	--
Femmes	1 333 831		1 026 987	77,0	75 432	5,7	166 786	12,5	62 737	4,7	--	--
65 à 74 ans	2 095 818		1 629 648	77,8	122 285	5,8	258 868	12,4	79 923	3,8	--	--
Hommes	929 806		743 730	80,0	54 161	5,8	99 787	10,7	29 312	3,2	--	--
Femmes	1 166 012		885 918	76,0	68 124	5,8	159 081	13,6	50 611	4,3	--	--
75 ans et plus	1 320 289		941 600	71,3	94 099	7,1	192 822	14,6	81 230	6,2	--	--
Hommes	548 869		397 488	72,4	49 900	9,1	77 411	14,1	21 742	4,0	--	--
Femmes	771 420		544 112	70,5	44 199	5,7	115 411	15,0	59 488	7,7	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui ont répondu « oui » ou « non » à la question vérifiant si elles étaient habituellement sans douleur ou sans malaise. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040004.

Tableau 1.2.8.1 Intensité des douleurs et des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Population		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères		Intensité des douleurs ou des malaises non déclarée	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999												
Total, 4 ans et plus	28 091 727		24 587 107	87,5	1 062 385	3,8	1 911 833	6,8	514 776	1,8	--	--
Hommes	13 883 550		12 381 659	89,2	516 853	3,7	769 611	5,5	201 558	1,5	--	--
Femmes	14 208 177		12 205 448	85,9	545 532	3,8	1 142 222	8,0	313 218	2,2	--	--
4 à 11 ans	3 175 600		3 108 058	97,9	30 257	1,0	29 510	0,9	--	--	--	--
Hommes	1 624 463		1 596 123	98,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	1 551 137		1 511 935	97,5	--	--	--	--	--	--	--	--
12 à 14 ans	1 132 916		1 106 380	97,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Hommes	596 301		587 483	98,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	536 615		518 896	96,7	--	--	--	--	--	--	--	--
15 à 19 ans	2 140 371		2 060 860	96,3	39 501	1,8	29 825	1,4	--	--	--	--
Hommes	1 092 483		1 066 952	97,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Femmes	1 047 889		993 908	94,8	24 088	2,3	23 941	2,3	--	--	--	--
20 à 24 ans	1 929 787		1 826 032	94,6	45 237	2,3	53 956	2,8	--	--	--	--
Hommes	970 659		932 041	96,0	27 066	2,8	--	--	--	--	--	--
Femmes	959 127		893 991	93,2	--	--	43 432	4,5	--	--	--	--
25 à 34 ans	4 124 839		3 781 029	91,7	115 813	2,8	187 249	4,5	40 390	1,0	--	--
Hommes	2 034 597		1 885 117	92,7	59 415	2,9	80 981	4,0	--	--	--	--
Femmes	2 090 241		1 895 911	90,7	56 398	2,7	106 268	5,1	31 664	1,5	--	--
35 à 44 ans	5 423 410		4 719 408	87,0	257 998	4,8	360 965	6,7	83 722	1,5	--	--
Hommes	2 740 807		2 396 260	87,4	141 797	5,2	166 738	6,1	34 695	1,3	--	--
Femmes	2 682 603		2 323 148	86,6	116 201	4,3	194 227	7,2	49 027	1,8	--	--
45 à 54 ans	3 985 865		3 312 043	83,1	174 687	4,4	384 411	9,6	111 395	2,8	--	--
Hommes	1 953 552		1 674 029	85,7	82 348	4,2	147 260	7,5	46 587	2,4	--	--
Femmes	2 032 312		1 638 015	80,6	92 339	4,5	237 151	11,7	64 808	3,2	--	--
55 à 64 ans	2 691 326		2 126 408	79,0	158 700	5,9	321 288	11,9	84 004	3,1	--	--
Hommes	1 353 049		1 107 530	81,9	72 738	5,4	138 160	10,2	33 695	2,5	--	--
Femmes	1 338 278		1 018 878	76,1	85 963	6,4	183 128	13,7	50 309	3,8	--	--
65 à 74 ans	1 999 320		1 518 242	75,9	111 175	5,6	286 352	14,3	80 493	4,0	--	--
Hommes	905 148		711 403	78,6	41 179	4,5	114 380	12,6	35 129	3,9	--	--
Femmes	1 094 172		806 839	73,7	69 996	6,4	171 972	15,7	45 364	4,1	--	--
75 ans et plus	1 488 293		1 028 647	69,1	121 200	8,1	241 338	16,2	92 249	6,2	--	--
Hommes	612 491		424 722	69,3	61 556	10,1	91 741	15,0	31 372	5,1	--	--
Femmes	875 802		603 926	69,0	59 644	6,8	149 598	17,1	60 877	7,0	--	--

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995

2. Personnes de 4 ans ou plus qui ont répondu « oui » ou « non » à la question vérifiant si elles étaient habituellement sans douleur ou sans malaise. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.

3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.

4. Les données présentant une variabilité d'échantillonnage (coefficient de variation) supérieure à 33,3 % ont été supprimées (-); il est possible que la somme des données agrégées ne corresponde pas aux totaux indiqués.

5. Tableau CANSIM numéro 01040004.

Tableau 1.2.8.1 Intensité des douleurs et des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.