Mammographie de dépistage, selon le groupe d'âge, femmes vivant à domicile de 50 à 69 ans, Canada et provinces, 1996-1997

Mammographie de dépistage	Total, mammographie	A passé une mammographie de dépistage de routine au cours des deux dernières années		A passé une mammographie au cours des deux dernières années pour d'autres raisons		Pas de mammographie depuis au moins deux ans		Mammographie - non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997									
Total, 50 à 69 ans	2 812 157	1 388 217	49,4	341 153	12,1	1 011 341	36,0	71 446	2,5
50 à 59 ans	1 593 453	838 642	52,6	193 082	12,1	523 180	32,8	38 550	2,4
60 à 69 ans	1 218 704	549 575	45,1	148 071	12,1	488 161	40,1	32 897	2,7
Canada	2 812 157	1 388 217	49,4	341 153	12,1	1 011 341	36,0	71 446	2,5
Terre-Neuve	50 570	14 042E	27,8	7 633E	15,1E	28 369	56,1	F	F
Île-du-Prince-Édouard	10 428	5 724	54,9	F	F	3 423E	32,8	F	F
Nouvelle-Écosse	84 685	31 344	37,0	13 801E	16,3E	39 540	46,7	F	F
Nouveau-Brunswick	71 219	32 376	45,5	14 861E	20,9E	23 447	32,9	F	F
Québec	773 513	349 091	45,1	89 147E	11,5E	331 394	42,8	F	F
Ontario	1 049 623	558 434	53,2	111 090	10,6	332 264	31,7	47 834	4,6
Manitoba	103 071	46 235	44,9	13 650	13,2	40 757	39,5	F	F
Saskatchewan	89 727	38 123	42,5	19 771E	22,0E	29 649	33,0	F	F
Alberta	220 899	107 065	48,5	24 573	11,1	76 952	34,8	12 309	5,6
Colombie-Britannique	358 421	205 782	57,4	45 345E	12,7E	105 546	29,4	F	F

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997, échantillon transversal, Fichier santé

2. Femmes de 50 à 69 ans déclarant quand elles ont passé leur dernière mammographie pour un dépistage de routine ou pour d'autres raisons.

3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».

4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.

5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.

6. Les données comparables ne sont pas disponibles pour 1994-1995 et 1998-1999.

7. Tableau CANSIM numéro 01040043.

Statistique Canada Statistics Canada

Institut canadien d'information sur la santé Canadian Institute for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.