

Hypertension, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, territoires, 1994-1995 - 1998-1999

| Hypertension | Population totale pour la variable hypertension | | Avec hypertension | | Sans hypertension | | Hypertension, non déclarée | |
|--|---|--|--------------------|------------------|-------------------|------|----------------------------|------------------|
| | Nombre | | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
| 1994/1995 | | | | | | | | |
| Territoires | 65 228 | | 3 482 | 5,3 | 59 266 | 90,9 | 2 480 | 3,8 |
| Hommes | 33 977 | | 1 835 ^E | 5,4 | 30 797 | 90,6 | 1 345 ^E | 4,0 ^E |
| Femmes | 31 251 | | 1 647 | 5,3 | 28 469 | 91,1 | 1 135 ^E | 3,6 ^E |
| Territoire du Yukon | 20 759 | | 1 213 | 5,8 | 19 253 | 92,7 | 292 ^E | 1,4 ^E |
| Hommes | 10 832 | | 654 ^E | 6,0 ^E | 10 060 | 92,9 | F | F |
| Femmes | 9 927 | | 559 ^E | 5,6 ^E | 9 193 | 92,6 | F | F |
| Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut | 44 469 | | 2 269 | 5,1 | 40 013 | 90,0 | 2 187 ^E | 4,9 |
| Hommes | 23 145 | | 1 181 ^E | 5,1 ^E | 20 737 | 89,6 | 1 227 ^E | 5,3 ^E |
| Femmes | 21 324 | | 1 088 ^E | 5,1 ^E | 19 276 | 90,4 | 960 ^E | 4,5 ^E |
| Territoires du Nord-Ouest | 28 228 | | 1 273 ^E | 4,5 ^E | 26 150 | 92,6 | 805 ^E | 2,9 ^E |
| Hommes | 14 692 | | 754 ^E | 5,1 ^E | 13 423 | 91,4 | F | F |
| Femmes | 13 536 | | 519 ^E | 3,8 ^E | 12 727 | 94,0 | F | F |
| Nunavut | 16 241 | | 996 ^E | 6,1 ^E | 13 863 | 85,4 | 1 382 ^E | 8,5 ^E |
| Hommes | 8 453 | | F | F | 7 314 | 86,5 | 712 ^E | 8,4 ^E |
| Femmes | 7 788 | | F | F | 6 549 | 84,1 | 670 ^E | 8,6 ^E |
| 1996/1997 | | | | | | | | |
| Territoires | 69 142 | | 4 047 | 5,9 | 64 787 | 93,7 | F | F |
| Hommes | 36 228 | | 1 792 ^E | 4,9 ^E | 34 207 | 94,4 | F | F |
| Femmes | 32 914 | | 2 255 ^E | 6,9 | 30 580 | 92,9 | F | F |
| Territoire du Yukon | 22 408 | | 1 517 | 6,8 | 20 869 | 93,1 | F | F |
| Hommes | 11 625 | | 861 ^E | 7,4 ^E | 10 764 | 92,6 | F | F |
| Femmes | 10 782 | | 656 ^E | 6,1 ^E | 10 105 | 93,7 | F | F |
| Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut | 46 734 | | 2 530 ^E | 5,4 ^E | 43 917 | 94,0 | F | F |
| Hommes | 24 603 | | 931 ^E | 3,8 ^E | 23 443 | 95,3 | F | F |
| Femmes | 22 131 | | 1 599 ^E | 7,2 ^E | 20 474 | 92,5 | F | F |
| Territoires du Nord-Ouest | 30 344 | | 1 731 ^E | 5,7 ^E | 28 613 | 94,3 | F | F |
| Hommes | 15 880 | | 683 ^E | F | 15 197 | 95,7 | F | F |
| Femmes | 14 464 | | 1 048 ^E | 7,2 ^E | 13 417 | 92,8 | F | F |
| Nunavut | 16 390 | | 799 ^E | 4,9 ^E | 15 304 | 93,4 | F | F |
| Hommes | 8 723 | | F | F | 8 246 | 94,5 | F | F |
| Femmes | 7 667 | | F | F | 7 058 | 92,1 | F | F |
| 1998/1999 | | | | | | | | |
| Territoires | 69 113 | | 4 218 | 6,1 | 64 249 | 93,0 | 646 ^E | 0,9 ^E |
| Hommes | 36 036 | | 2 397 | 6,7 | 33 174 | 92,1 | F | F |
| Femmes | 33 077 | | 1 822 | 5,5 | 31 074 | 93,9 | F | F |
| Territoire du Yukon | 21 826 | | 1 296 | 5,9 | 20 283 | 92,9 | F | F |
| Hommes | 11 252 | | 836 ^E | 7,4 ^E | 10 221 | 90,8 | F | F |
| Femmes | 10 574 | | 461 ^E | 4,4 ^E | 10 062 | 95,2 | F | F |
| Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut | 47 287 | | 2 922 | 6,2 | 43 965 | 93,0 | F | F |
| Hommes | 24 784 | | 1 561 | 6,3 | 22 953 | 92,6 | F | F |
| Femmes | 22 503 | | 1 361 | 6,0 | 21 012 | 93,4 | F | F |
| Territoires du Nord-Ouest | 30 766 | | 1 814 | 5,9 | 28 741 | 93,4 | F | F |
| Hommes | 16 040 | | 928 ^E | 5,8 ^E | 14 943 | 93,2 | F | F |
| Femmes | 14 726 | | 886 | 6,0 | 13 798 | 93,7 | F | F |
| Nunavut | 16 520 | | 1 109 ^E | 6,7 ^E | 15 225 | 92,2 | F | F |
| Hommes | 8 744 | | 633 ^E | 7,2 ^E | 8 011 | 91,6 | F | F |
| Femmes | 7 777 | | 475 ^E | 6,1 ^E | 7 214 | 92,8 | F | F |

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé, volet Nord
2. Personnes de 12 ans et plus qui déclarent avoir reçu un diagnostic d'hypertension d'un professionnel de la santé.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon une formule simple de calcul de la variance.
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
6. Le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest (excluant Nunavut) existent depuis le 1er avril 1999. Cependant, afin de faciliter la comparaison des données de l'Enquête nationale sur la santé de la population volet Nord avec celles publiées par d'autres enquêtes ou projets, les données pour ces deux territoires sont présentées de façon séparée « Territoires du Nord-Ouest » et « Nunavut » et combinée « Territoires du Nord-Ouest incluant Nunavut ».
7. Tableau CANSIM numéro 01045010.