

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités	Total, douleur ou malaise qui a un effet sur les activités		Aucune douleur ou malaise		Douleur ou malaise n'empêche pas les activités		Douleur ou malaise empêche peu ou quelques activités		Douleur ou malaise empêche la plupart des activités		Douleur ou malaise, non déclaré	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995												
Total, 4 ans et plus	27 077 655		22 809 485	84,2	1 346 150	5,0	2 111 059	7,8	659 854	2,4	151 107	0,6
Hommes	13 379 463		11 593 601	86,7	652 941	4,9	773 127	5,8	283 234	2,1	76 559	0,6
Femmes	13 698 192		11 215 884	81,9	693 209	5,1	1 337 932	9,8	376 620	2,7	74 548	0,5
4 à 11 ans	3 129 038		2 981 121	95,3	66 636	2,1	29 355	0,9	F	F	44 098	1,4
Hommes	1 599 121		1 525 958	95,4	33 233	2,1	13 070	0,8	F	F	24 637	1,5
Femmes	1 529 917		1 455 164	95,1	33 403	2,2	16 285E	1,1E	F	F	19 460	1,3
12 ans et plus	23 948 617		19 828 363	82,8	1 279 514	5,3	2 081 704	8,7	652 026	2,7	107 010	0,4
Hommes	11 780 342		10 067 644	85,5	619 708	5,3	760 057	6,5	281 011	2,4	51 922E	0,4E
Femmes	12 168 275		9 760 720	80,2	659 806	5,4	1 321 647	10,9	371 015	3,0	55 088E	0,5E
12 à 14 ans	1 326 127		1 255 771	94,7	39 185E	3,0E	28 341E	2,1E	F	F	F	F
Hommes	705 741		668 988	94,8	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	620 386		586 784	94,6	F	F	F	F	F	F	F	F
15 à 19 ans	2 046 278		1 821 390	89,0	96 998E	4,7E	112 260	5,5	F	F	F	F
Hommes	1 057 276		974 797	92,2	51 000E	4,8E	F	F	F	F	F	F
Femmes	989 002		846 593	85,6	45 998E	4,7E	84 271E	8,5E	F	F	F	F
20 à 24 ans	1 739 550		1 563 568	89,9	61 715E	3,5E	94 039	5,4	F	F	F	F
Hommes	837 418		774 580	92,5	35 146E	4,2E	21 168E	2,5E	F	F	F	F
Femmes	902 132		788 987	87,5	26 569E	2,9E	72 871E	8,1E	F	F	F	F
25 à 34 ans	4 755 495		4 181 514	87,9	209 961	4,4	288 786	6,1	56 673E	1,2E	F	F
Hommes	2 337 763		2 084 080	89,1	104 075	4,5	106 543	4,6	F	F	F	F
Femmes	2 417 732		2 097 434	86,8	105 886	4,4	182 244	7,5	29 323E	1,2E	F	F
35 à 44 ans	4 864 334		4 107 050	84,4	282 580	5,8	345 953	7,1	113 073	2,3	F	F
Hommes	2 474 091		2 127 585	86,0	145 587	5,9	136 843	5,5	56 199E	2,3E	F	F
Femmes	2 390 243		1 979 465	82,8	136 993	5,7	209 110	8,7	56 874E	2,4E	F	F
45 à 54 ans	3 504 062		2 784 320	79,5	225 404	6,4	337 636	9,6	135 271	3,9	21 430E	0,6E
Hommes	1 817 048		1 490 908	82,1	114 823E	6,3	145 992	8,0	56 152E	3,1E	F	F
Femmes	1 687 014		1 293 412	76,7	110 581	6,6	191 644	11,4	79 119E	4,7E	F	F
55 à 64 ans	2 461 802		1 899 778	77,2	129 345	5,3	304 268	12,4	113 487	4,6	F	F
Hommes	1 152 384		938 834	81,5	52 008E	4,5E	100 195	8,7	54 884E	4,8E	F	F
Femmes	1 309 418		960 944	73,4	77 338	5,9	204 073	15,6	58 603E	4,5E	F	F
65 à 74 ans	2 059 918		1 442 442	70,0	146 147	7,1	345 219	16,8	103 166	5,0	F	F
Hommes	920 211		680 002	73,9	57 617E	6,3E	131 037	14,2	43 406E	4,7E	F	F
Femmes	1 139 707		762 440	66,9	88 531E	7,8E	214 182	18,8	59 760	5,2	F	F
75 ans et plus	1 191 051		772 531	64,9	88 178	7,4	225 202	18,9	99 327	8,3	F	F
Hommes	478 410		327 870	68,5	38 081E	8,0E	74 908E	15,7	35 553E	7,4E	F	F
Femmes	712 641		444 661	62,4	50 096E	7,0E	150 294	21,1	63 774	8,9	F	F

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités	Total, douleur ou malaise qui a un effet sur les activités		Aucune douleur ou malaise		Douleur ou malaise n'empêche pas les activités		Douleur ou malaise empêche peu ou quelques activités		Douleur ou malaise empêche la plupart des activités		Douleur ou malaise, non déclaré	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997												
Total, 4 ans et plus	27 834 243		24 481 552	88,0	897 303	3,2	1 859 534	6,7	561 772	2,0	34 082E	0,1E
Hommes	13 755 681		12 311 349	89,5	441 365	3,2	712 940	5,2	269 161	2,0	F	F
Femmes	14 078 562		12 170 203	86,4	455 939	3,2	1 146 594	8,1	292 611	2,1	13 215	0,1
4 à 11 ans	3 239 356		3 148 941	97,2	66 161E	2,0E	10 391E	0,3E	F	F	F	F
Hommes	1 656 241		1 621 561	97,9	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	1 583 115		1 527 380	96,5	F	F	F	F	F	F	F	F
12 ans et plus	24 594 887		21 332 612	86,7	831 142	3,4	1 849 143	7,5	551 568	2,2	30 423E	0,1E
Hommes	12 099 440		10 689 789	88,3	418 646	3,5	707 432	5,8	265 668	2,2	F	F
Femmes	12 495 447		10 642 823	85,2	412 496	3,3	1 141 711	9,1	285 900	2,3	12 518E	0,1E
12 à 14 ans	1 150 763		1 111 695	96,6	15 415E	1,3E	19 400E	1,7E	F	F	F	F
Hommes	580 013		571 702	98,6	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	570 750		539 992	94,6	F	F	17 821E	3,1E	F	F	F	F
15 à 19 ans	2 110 798		1 986 423	94,1	40 248E	1,9E	71 723	3,4	11 233E	0,5E	F	F
Hommes	1 085 998		1 047 116	96,4	19 928E	1,8E	16 108E	1,5E	F	F	F	F
Femmes	1 024 800		939 307	91,7	F	F	55 615E	5,4E	F	F	F	F
20 à 24 ans	1 872 592		1 745 501	93,2	40 421E	2,2E	73 935	3,9	12 714E	0,7E	F	F
Hommes	948 260		904 909	95,4	16 473E	1,7E	19 946E	2,1E	F	F	F	F
Femmes	924 332		840 592	90,9	23 948E	2,6E	53 990	5,8	5 803E	0,6E	F	F
25 à 34 ans	4 471 514		4 065 790	90,9	119 440	2,7	230 049	5,1	51 651	1,2	F	F
Hommes	2 208 851		2 026 422	91,7	61 327	2,8	88 816	4,0	29 300E	1,3E	F	F
Femmes	2 262 663		2 039 368	90,1	58 113E	2,6E	141 233	6,2	22 351	1,0	F	F
35 à 44 ans	5 237 643		4 640 789	88,6	158 017	3,0	340 421	6,5	96 419	1,8	F	F
Hommes	2 644 862		2 350 461	88,9	94 758	3,6	142 836	5,4	55 646	2,1	F	F
Femmes	2 592 781		2 290 328	88,3	63 258	2,4	197 585	7,6	40 773	1,6	F	F
45 à 54 ans	3 770 504		3 182 851	84,4	181 872	4,8	291 732	7,7	110 821	2,9	3 229E	0,1E
Hommes	1 921 647		1 646 632	85,7	102 839	5,4	120 604	6,3	49 772	2,6	F	F
Femmes	1 848 857		1 536 219	83,1	79 033	4,3	171 129	9,3	61 049	3,3	F	F
55 à 64 ans	2 564 965		2 028 315	79,1	122 939	4,8	308 372	12,0	96 796	3,8	F	F
Hommes	1 231 134		1 001 328	81,3	61 510	5,0	109 810	8,9	51 453E	4,2E	F	F
Femmes	1 333 831		1 026 987	77,0	61 428	4,6	198 563	14,9	45 343	3,4	F	F
65 à 74 ans	2 095 818		1 629 648	77,8	100 836	4,8	289 401	13,8	71 782	3,4	4 151E	0,2E
Hommes	929 806		743 730	80,0	34 815	3,7	117 443	12,6	31 503	3,4	F	F
Femmes	1 166 013		885 918	76,0	66 021E	5,7E	171 958	14,7	40 279	3,5	1 836E	0,2E
75 ans et plus	1 320 290		941 601	71,3	51 953	3,9	224 109	17,0	96 232	7,3	6 395E	0,5E
Hommes	548 869		397 488	72,4	20 661E	3,8E	90 290	16,5	38 445E	7,0E	1 985E	0,4E
Femmes	771 420		544 112	70,5	31 292E	4,1E	133 818	17,3	57 787	7,5	4 411E	0,6E

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités	Total, douleur ou malaise qui a un effet sur les activités		Aucune douleur ou malaise		Douleur ou malaise n'empêche pas les activités		Douleur ou malaise empêche peu ou quelques activités		Douleur ou malaise empêche la plupart des activités		Douleur ou malaise, non déclaré	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999												
Total, 4 ans et plus	28 091 727		24 587 107	87,5	882 655	3,1	2 071 724	7,4	536 382	1,9	F	F
Hommes	13 883 550		12 381 658	89,2	413 143	3,0	835 327	6,0	244 242	1,8	F	F
Femmes	14 208 177		12 205 448	85,9	469 513	3,3	1 236 397	8,7	292 140	2,1	F	F
4 à 11 ans	3 175 600		3 108 058	97,9	F	F	F	F	F	F	F	F
Hommes	1 624 463		1 596 123	98,3	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	1 551 137		1 511 935	97,5	F	F	F	F	F	F	F	F
12 ans et plus	24 916 127		21 479 048	86,2	855 594	3,4	2 036 701	8,2	530 925	2,1	F	F
Hommes	12 259 087		10 785 535	88,0	404 734	3,3	820 042	6,7	239 597	2,0	F	F
Femmes	12 657 040		10 693 513	84,5	450 860	3,6	1 216 659	9,6	291 328	2,3	F	F
12 à 14 ans	1 132 916		1 106 379	97,7	F	F	F	F	F	F	F	F
Hommes	596 301		587 483	98,5	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	536 615		518 896	96,7	F	F	F	F	F	F	F	F
15 à 19 ans	2 140 371		2 060 860	96,3	F	F	55 194E	2,6E	F	F	F	F
Hommes	1 092 483		1 066 952	97,7	F	F	F	F	F	F	F	F
Femmes	1 047 889		993 908	94,8	F	F	38 092E	3,6E	F	F	F	F
20 à 24 ans	1 929 787		1 826 032	94,6	48 730E	2,5E	47 946E	2,5E	F	F	F	F
Hommes	970 659		932 041	96,0	23 467E	2,4E	F	F	F	F	F	F
Femmes	959 127		893 991	93,2	F	F	33 624E	3,5E	F	F	F	F
25 à 34 ans	4 124 839		3 781 029	91,7	90 706	2,2	221 408	5,4	31 338E	0,8E	F	F
Hommes	2 034 597		1 885 117	92,7	47 727E	2,3E	89 114	4,4	F	F	F	F
Femmes	2 090 242		1 895 912	90,7	42 979E	2,1E	132 294	6,3	F	F	F	F
35 à 44 ans	5 423 410		4 719 407	87,0	170 008	3,1	435 416	8,0	95 656	1,8	F	F
Hommes	2 740 807		2 396 259	87,4	98 460E	3,6E	206 622E	7,5	39 465E	1,4E	F	F
Femmes	2 682 603		2 323 148	86,6	71 548E	2,7E	228 794	8,5	56 191E	2,1E	F	F
45 à 54 ans	3 985 865		3 312 043	83,1	175 287	4,4	399 212	10,0	95 994	2,4	F	F
Hommes	1 953 552		1 674 029	85,7	73 512E	3,8E	153 292	7,8	49 392E	2,5E	F	F
Femmes	2 032 312		1 638 015	80,6	101 775E	5,0E	245 919	12,1	46 603E	2,3E	F	F
55 à 64 ans	2 691 326		2 126 408	79,0	146 946	5,5	336 884	12,5	81 088E	3,0E	F	F
Hommes	1 353 049		1 107 530	81,9	65 087E	4,8E	146 219	10,8	34 212E	2,5E	F	F
Femmes	1 338 278		1 018 878	76,1	81 859E	6,1E	190 665	14,2	46 876E	3,5E	F	F
65 à 74 ans	1 999 320		1 518 242	75,9	113 550	5,7	270 035	13,5	94 641	4,7	F	F
Hommes	905 148		711 403	78,6	39 855E	4,4E	101 971	11,3	49 067E	5,4E	F	F
Femmes	1 094 172		806 839	73,7	73 695E	6,7	168 064	15,4	45 574E	4,2E	F	F
75 ans et plus	1 488 293		1 028 647	69,1	84 618E	5,7	260 863	17,5	111 547	7,5	F	F
Hommes	612 491		424 722	69,3	48 880E	8,0E	90 300E	14,7	47 730E	7,8E	F	F
Femmes	875 802		603 926	69,0	35 739E	4,1E	170 563	19,5	63 817	7,3	F	F

Douleur ou malaise qui a un effet sur les activités, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995
2. Personnes de 4 ans et plus qui déclarent avoir une douleur ou un malaise qui empêche régulièrement certaines activités.
3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.
4. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
5. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
6. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
7. Tableau CANSIM numéro 01040003.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2001
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.