

Intensité des douleurs ou des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Total, intensité des douleurs ou des malaises		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1994/1995										
Total, 4 ans et plus	27 077 655		22 809 485	84,2	1 270 455	4,7	2 223 838	8,2	622 770	2,3
Hommes	13 379 463		11 593 601	86,7	586 784	4,4	876 425	6,6	246 094	1,8
Femmes	13 698 192		11 215 884	81,9	683 671	5,0	1 347 414	9,8	376 676	2,7
4 à 11 ans	3 129 038		2 981 121	95,3	52 100	1,7	41 686	1,3	10 034E	0,3E
Hommes	1 599 121		1 525 958	95,4	24 044	1,5	19 801	1,2	4 681E	0,3E
Femmes	1 529 917		1 455 164	95,1	28 055	1,8	21 885E	1,4E	5 353E	0,3E
12 ans et plus	23 948 617		19 828 363	82,8	1 218 355	5,1	2 182 152	9,1	612 736	2,6
Hommes	11 780 342		10 067 644	85,5	562 740	4,8	856 623	7,3	241 413	2,0
Femmes	12 168 275		9 760 720	80,2	655 615	5,4	1 325 529	10,9	371 323	3,1
12 à 14 ans	1 326 127		1 255 771	94,7	35 997E	2,7E	32 298E	2,4E	F	F
Hommes	705 741		668 988	94,8	F	F	F	F	F	F
Femmes	620 386		586 784	94,6	F	F	F	F	F	F
15 à 19 ans	2 046 278		1 821 390	89,0	91 145E	4,5	116 802E	5,7	F	F
Hommes	1 057 276		974 797	92,2	45 408E	4,3E	31 946E	3,0E	F	F
Femmes	989 002		846 593	85,6	45 737E	4,6E	84 856E	8,6E	F	F
20 à 24 ans	1 739 550		1 563 568	89,9	66 520E	3,8E	87 422E	5,0E	F	F
Hommes	837 418		774 580	92,5	29 122E	3,5E	23 205E	2,8E	F	F
Femmes	902 132		788 987	87,5	37 398E	4,1E	64 217E	7,1E	F	F
25 à 34 ans	4 755 495		4 181 514	87,9	180 602	3,8	315 183	6,6	59 635E	1,3E
Hommes	2 337 763		2 084 080	89,1	91 564	3,9	125 791	5,4	F	F
Femmes	2 417 732		2 097 434	86,8	89 038	3,7	189 393	7,8	39 022E	1,6E
35 à 44 ans	4 864 334		4 107 050	84,4	245 186	5,0	400 731	8,2	95 688	2,0
Hommes	2 474 091		2 127 585	86,0	110 657	4,5	187 269	7,6	40 703E	1,6E
Femmes	2 390 243		1 979 465	82,8	134 530	5,6	213 462	8,9	54 985E	2,3E
45 à 54 ans	3 504 062		2 784 320	79,5	204 812	5,8	359 887	10,3	133 612	3,8
Hommes	1 817 048		1 490 908	82,1	105 401E	5,8	146 479	8,1	65 088E	3,6E
Femmes	1 687 014		1 293 412	76,7	99 412	5,9	213 408	12,7	68 524E	4,1E
55 à 64 ans	2 461 802		1 899 778	77,2	96 406	3,9	341 615	13,9	109 079	4,4
Hommes	1 152 384		938 834	81,5	31 848E	2,8E	135 755	11,8	39 484E	3,4E
Femmes	1 309 418		960 944	73,4	64 558	4,9	205 861	15,7	69 595	5,3
65 à 74 ans	2 059 918		1 442 442	70,0	167 078	8,1	327 223	15,9	100 231	4,9
Hommes	920 211		680 002	73,9	72 891	7,9	125 044	13,6	34 125E	3,7E
Femmes	1 139 707		762 440	66,9	94 187E	8,3E	202 179	17,7	66 106E	5,8E
75 ans et plus	1 191 051		772 531	64,9	130 608	11,0	200 991	16,9	81 109	6,8
Hommes	478 410		327 870	68,5	59 763E	12,5	61 138E	12,8	27 642E	5,8E
Femmes	712 641		444 661	62,4	70 845	9,9	139 853	19,6	53 467E	7,5

Intensité des douleurs ou des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Total, intensité des douleurs ou des malaises		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1996/1997										
Total, 4 ans et plus	27 834 243		24 481 552	88,0	1 005 089	3,6	1 776 836	6,4	527 240	1,9
Hommes	13 755 681		12 311 349	89,5	472 400	3,4	753 092	5,5	194 344	1,4
Femmes	14 078 562		12 170 203	86,4	532 689	3,8	1 023 744	7,3	332 896	2,4
4 à 11 ans	3 239 356		3 148 941	97,2	34 175E	1,1E	F	F	F	F
Hommes	1 656 241		1 621 561	97,9	F	F	F	F	F	F
Femmes	1 583 115		1 527 380	96,5	F	F	F	F	F	F
12 ans et plus	24 594 887		21 332 612	86,7	970 914	3,9	1 728 463	7,0	523 344	2,1
Hommes	12 099 440		10 689 789	88,3	456 380	3,8	741 203	6,1	190 846	1,6
Femmes	12 495 447		10 642 823	85,2	514 534	4,1	987 260	7,9	332 497	2,7
12 à 14 ans	1 150 763		1 111 695	96,6	19 111E	1,7E	12 995E	1,1E	F	F
Hommes	580 013		571 702	98,6	F	F	F	F	F	F
Femmes	570 750		539 992	94,6	F	F	11 628E	2,0E	F	F
15 à 19 ans	2 110 798		1 986 423	94,1	49 569	2,3	56 235E	2,7E	F	F
Hommes	1 085 998		1 047 116	96,4	21 695E	2,0E	15 037E	1,4E	F	F
Femmes	1 024 800		939 307	91,7	27 874E	2,7E	41 197E	4,0E	F	F
20 à 24 ans	1 872 592		1 745 501	93,2	53 606E	2,9E	62 902	3,4	10 563E	0,6E
Hommes	948 260		904 909	95,4	19 170E	2,0E	21 464E	2,3E	F	F
Femmes	924 332		840 592	90,9	34 436E	3,7E	41 438	4,5	F	F
25 à 34 ans	4 471 514		4 065 790	90,9	129 376	2,9	234 069	5,2	37 521E	0,8E
Hommes	2 208 851		2 026 422	91,7	60 144	2,7	102 648	4,6	16 478E	0,7E
Femmes	2 262 663		2 039 368	90,1	69 233	3,1	131 421	5,8	21 043E	0,9E
35 à 44 ans	5 237 643		4 640 789	88,6	178 510	3,4	319 506	6,1	96 023	1,8
Hommes	2 644 862		2 350 461	88,9	93 173	3,5	159 765	6,0	39 617	1,5
Femmes	2 592 781		2 290 328	88,3	85 336	3,3	159 741	6,2	56 406E	2,2E
45 à 54 ans	3 770 504		3 182 851	84,4	186 156	4,9	299 838	8,0	97 923	2,6
Hommes	1 921 647		1 646 632	85,7	88 423	4,6	139 281	7,2	45 110E	2,3E
Femmes	1 848 857		1 536 219	83,1	97 733	5,3	160 557	8,7	52 813E	2,9E
55 à 64 ans	2 564 965		2 028 315	79,1	138 202	5,4	291 229	11,4	97 671	3,8
Hommes	1 231 134		1 001 328	81,3	62 770	5,1	124 443	10,1	34 934E	2,8E
Femmes	1 333 831		1 026 987	77,0	75 432	5,7	166 786	12,5	62 737E	4,7E
65 à 74 ans	2 095 818		1 629 648	77,8	122 285	5,8	258 868	12,4	79 923	3,8
Hommes	929 806		743 730	80,0	54 161	5,8	99 787	10,7	29 312E	3,2E
Femmes	1 166 013		885 918	76,0	68 123	5,8	159 081	13,6	50 611	4,3
75 ans et plus	1 320 290		941 601	71,3	94 099	7,1	192 822	14,6	81 230	6,2
Hommes	548 869		397 488	72,4	49 900E	9,1	77 411E	14,1	F	F
Femmes	771 420		544 112	70,5	44 199	5,7	115 411	15,0	59 488	7,7

Intensité des douleurs ou des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

Douleurs ou malaises selon l'intensité	Total, intensité des douleurs ou des malaises		Aucune douleur ou malaise		Douleurs ou malaises légers		Douleurs ou malaises modérés		Douleurs ou malaises sévères	
	Nombre		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
1998/1999										
Total, 4 ans et plus	28 091 727		24 587 107	87,5	1 062 385	3,8	1 911 833	6,8	514 776	1,8
Hommes	13 883 550		12 381 658	89,2	516 853	3,7	769 611	5,5	201 558	1,5
Femmes	14 208 177		12 205 448	85,9	545 532	3,8	1 142 222	8,0	313 218	2,2
4 à 11 ans	3 175 600		3 108 058	97,9						
Hommes	1 624 463		1 596 123	98,3						
Femmes	1 551 137		1 511 935	97,5						
12 ans et plus	24 916 127		21 479 048	86,2	1 032 127	4,1	1 882 323	7,6	507 001	2,0
Hommes	12 259 087		10 785 535	88,0	502 739	4,1	761 475	6,2	195 468	1,6
Femmes	12 657 040		10 693 513	84,5	529 388	4,2	1 120 848	8,9	311 533	2,5
12 à 14 ans	1 132 916		1 106 379	97,7						
Hommes	596 301		587 483	98,5						
Femmes	536 615		518 896	96,7						
15 à 19 ans	2 140 371		2 060 860	96,3	39 501E	1,8E	29 825E	1,4E		
Hommes	1 092 483		1 066 952	97,7						
Femmes	1 047 889		993 908	94,8	24 088E	2,3E	23 941E	2,3E		
20 à 24 ans	1 929 787		1 826 032	94,6	45 237E	2,3E	53 956E	2,8E		
Hommes	970 659		932 041	96,0	27 066E	2,8E				
Femmes	959 127		893 991	93,2			43 432E	4,5E		
25 à 34 ans	4 124 839		3 781 029	91,7	115 813	2,8	187 249	4,5	40 390E	1,0E
Hommes	2 034 597		1 885 117	92,7	59 415E	2,9E	80 981	4,0		
Femmes	2 090 242		1 895 912	90,7	56 398E	2,7E	106 268	5,1	31 664E	1,5E
35 à 44 ans	5 423 410		4 719 407	87,0	257 998	4,8	360 965	6,7	83 722	1,5
Hommes	2 740 807		2 396 259	87,4	141 797E	5,2E	166 737	6,1	34 695E	1,3E
Femmes	2 682 603		2 323 148	86,6	116 201	4,3	194 227	7,2	49 027E	1,8E
45 à 54 ans	3 985 865		3 312 043	83,1	174 687	4,4	384 411	9,6	111 395	2,8
Hommes	1 953 552		1 674 029	85,7	82 348E	4,2E	147 260	7,5	46 587E	2,4E
Femmes	2 032 312		1 638 015	80,6	92 339	4,5	237 151	11,7	64 808E	3,2E
55 à 64 ans	2 691 326		2 126 408	79,0	158 700	5,9	321 288	11,9	84 004	3,1
Hommes	1 353 049		1 107 530	81,9	72 738E	5,4E	138 160	10,2	33 695E	2,5E
Femmes	1 338 278		1 018 878	76,1	85 962	6,4	183 128	13,7	50 309E	3,8E
65 à 74 ans	1 999 320		1 518 242	75,9	111 175	5,6	286 352	14,3	80 493	4,0
Hommes	905 148		711 403	78,6	41 179E	4,5E	114 380	12,6	35 129E	3,9E
Femmes	1 094 172		806 839	73,7	69 996E	6,4E	171 972	15,7	45 364E	4,1E
75 ans et plus	1 488 293		1 028 647	69,1	121 200E	8,1	241 338	16,2	92 249	6,2
Hommes	612 491		424 722	69,3	61 556E	10,1	91 741	15,0	31 372E	5,1E
Femmes	875 802		603 926	69,0	59 644E	6,8	149 598	17,1	60 877E	7,0E

Intensité des douleurs ou des malaises, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 4 ans et plus, Canada, territoires non compris, 1994-1995 - 1998-1999

1. Sources des données : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999, échantillon transversal, Fichier santé; Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes (enfants âgés de 4 à 11 ans), 1994-1995
2. Personnes de 4 ans et plus qui ont répondu « oui » ou « non » à la question vérifiant si elles étaient habituellement sans douleur ou sans malaise. L'intensité de la douleur est mesurée comme sévère, modérée ou légère.
3. Pour 1994-1995, la source des données pour les enfants âgés de 4 à 11 ans est l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des enfants et des jeunes. Les données devraient être comparées avec prudence.
4. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
5. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
6. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
7. Tableau CANSIM numéro 01040004.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

- © Ministre de l'Industrie, 2001
- © Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.