

**Risque de dépression, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2000-2001**

Risque de dépression	Total, risque de dépression	Aucun risque de dépression		Risque de dépression possible		Risque de dépression probable		Risque de dépression, non déclaré	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
<b>2000-2001</b>									
Total, 12 ans et plus	25 680 051	22 740 135	88,6	717 530	2,8	1 826 552	7,1	395 833	1,5
Hommes	12 645 433	11 510 457	91,0	310 962	2,5	632 083	5,0	191 930	1,5
Femmes	13 034 618	11 229 678	86,2	406 567	3,1	1 194 469	9,2	203 903	1,6
12 à 19 ans	3 224 268	2 885 184	89,5	95 439	3,0	208 868	6,5	34 776	1,1
Hommes	1 652 814	1 530 693	92,6	50 147	3,0	55 843	3,4	16 131	1,0
Femmes	1 571 453	1 354 491	86,2	45 291	2,9	153 025	9,7	18 646	1,2
12 à 14 ans	1 148 107	1 072 955	93,5	22 731	2,0	43 627	3,8	8 794	0,8
Hommes	598 598	568 113	94,9	13 735	2,3	12 865E	2,1E	3 885E	0,6E
Femmes	549 509	504 842	91,9	8 996E	1,6E	30 762	5,6	4 909E	0,9E
15 à 19 ans	2 076 160	1 812 229	87,3	72 707	3,5	165 241	8,0	25 982	1,3
Hommes	1 054 216	962 580	91,3	36 412	3,5	42 978	4,1	12 246E	1,2E
Femmes	1 021 944	849 649	83,1	36 295	3,6	122 263	12,0	13 737E	1,3E
20 à 34 ans	6 273 637	5 421 982	86,4	204 207	3,3	550 347	8,8	97 100	1,5
Hommes	3 175 388	2 828 645	89,1	93 437	2,9	205 581	6,5	47 726	1,5
Femmes	3 098 249	2 593 338	83,7	110 770	3,6	344 767	11,1	49 374	1,6
20 à 24 ans	2 119 805	1 809 935	85,4	78 324	3,7	203 268	9,6	28 278	1,3
Hommes	1 075 293	944 027	87,8	36 289	3,4	78 296	7,3	16 681E	1,6E
Femmes	1 044 512	865 909	82,9	42 035	4,0	124 972	12,0	11 596E	1,1E
25 à 34 ans	4 153 831	3 612 047	87,0	125 883	3,0	347 079	8,4	68 822	1,7
Hommes	2 100 095	1 884 618	89,7	57 148	2,7	127 284	6,1	31 045	1,5
Femmes	2 053 736	1 727 429	84,1	68 736	3,3	219 794	10,7	37 777	1,8
35 à 44 ans	5 296 378	4 610 632	87,1	151 843	2,9	461 730	8,7	72 173	1,4
Hommes	2 638 908	2 376 808	90,1	66 273	2,5	161 188	6,1	34 638	1,3
Femmes	2 657 471	2 233 823	84,1	85 570	3,2	300 543	11,3	37 535	1,4
45 à 64 ans	7 254 774	6 465 790	89,1	186 379	2,6	488 519	6,7	114 086	1,6
Hommes	3 591 252	3 281 465	91,4	75 968	2,1	173 603	4,8	60 216	1,7
Femmes	3 663 522	3 184 326	86,9	110 411	3,0	314 916	8,6	53 870	1,5
45 à 54 ans	4 429 783	3 908 290	88,2	111 929	2,5	334 650	7,6	74 915	1,7
Hommes	2 187 744	1 982 715	90,6	44 241	2,0	120 802	5,5	39 986	1,8
Femmes	2 242 040	1 925 575	85,9	67 687	3,0	213 849	9,5	34 929	1,6
55 à 64 ans	2 824 990	2 557 500	90,5	74 450	2,6	153 869	5,4	39 171	1,4
Hommes	1 403 508	1 298 750	92,5	31 727	2,3	52 801	3,8	20 230	1,4
Femmes	1 421 482	1 258 751	88,6	42 723	3,0	101 067	7,1	18 941	1,3
65 ans et plus	3 630 994	3 356 547	92,4	79 662	2,2	117 088	3,2	77 698	2,1
Hommes	1 587 071	1 492 846	94,1	25 137	1,6	35 869	2,3	33 219	2,1
Femmes	2 043 923	1 863 700	91,2	54 525	2,7	81 219	4,0	44 479	2,2
65 à 74 ans	2 147 482	1 990 543	92,7	46 964	2,2	73 531	3,4	36 443	1,7
Hommes	1 001 080	946 079	94,5	13 749E	1,4E	24 451	2,4	16 801	1,7
Femmes	1 146 402	1 044 464	91,1	33 215	2,9	49 080	4,3	19 642E	1,7E
75 ans et plus	1 483 513	1 366 004	92,1	32 698	2,2	43 556	2,9	41 255	2,8
Hommes	585 991	546 767	93,3	11 388E	1,9E	11 418	1,9	16 418	2,8
Femmes	897 522	819 236	91,3	21 310	2,4	32 139	3,6	24 837	2,8

## Risque de dépression, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2000-2001

1. Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001
2. Personnes de 12 ans et plus présentant des symptômes de dépression, d'après leurs réponses à une série de questions visant à établir la possibilité d'un « trouble dépressif majeur ».
3. La mesure de la dépression est tirée d'un groupe de questions sur la santé mentale concernant les pensées et les émotions des répondants à propos de divers sujets.
4. Les totaux pour l'Ontario et la Saskatchewan excluent les données d'une ou plusieurs régions socio-sanitaires qui n'ont pas choisi cet indicateur dans leurs modules optionnels lors de l'enquête. Interpréter avec prudence.
5. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
6. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
7. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
8. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.
9. Un « groupe de régions homologues » est un groupe de régions socio-sanitaires qui comportent des caractéristiques sociales et économiques similaires.
10. À Terre-Neuve-et-Labrador, les régions socio-sanitaires sont généralement appelées des régions « Health and Community Services (HCS) ».
11. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ».
12. L'Île-du-Prince-Édouard a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques; lesquelles ne correspondent en rien aux cinq régions socio-sanitaires créées à des fins de gestion.
13. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.
14. En Ontario, les « Public Health Units (PHU) » gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les « District Health Councils (DHC) » sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.
15. Compte tenu de la faible population de Churchill au Manitoba (1 110 habitants en 1996), l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes recueille seulement des données pour l'agrégat de Burntwood et Churchill (régions 4680, 4690).
16. En Saskatchewan, des « service areas (SA) » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.
17. En Alberta, les régions socio-sanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».
18. En 2002, le Ministère de la santé en Colombie-Britannique a changé les limites des régions socio-sanitaires. Le nombre de régions est passé de 20 à 16 « health service delivery areas » (HSDA).
19. Pour les HSDA de la Colombie-Britannique, l'année de référence est ajoutée au nom de la région socio-sanitaire; un « T » suit le code afin de distinguer les anciennes régions socio-sanitaires.
20. Les données calculées pour les HSDA en Colombie-Britannique seront différentes des données diffusées précédemment pour les régions socio-sanitaires (surtout là où les limites n'ont pas été changées) à cause des estimations révisées de la population.
21. Les signes suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres non disponibles et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.
22. Tableau CANSIM numéro 01050005.



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada



Institut canadien  
d'information sur la santé  
Canadian Institute  
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2002  
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.