

N° 82-231-X au catalogue

Incidence du cancer au Canada

2008 et 2009



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 263-1136; 613 951-1746 (hd-ds@statcan.gc.ca).

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 82-231-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Incidence du cancer au Canada

2008 et 2009

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2011

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division de la gestion de l'information, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Septembre 2011

Nº 82-231-X au catalogue

ISSN 1715-8176

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Remerciements

Les données du Registre canadien du cancer utilisées dans la préparation des tableaux sur l'incidence du cancer ont été fournies à Statistique Canada par les registres provinciaux et territoriaux du cancer. Nous les remercions vivement de leur coopération.

Table des matières

Faits saillants	5
Aperçu du Registre canadien du cancer	6
Buts	6
Couverture	7
Produits connexes	9
Tableaux statistiques	
1 Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011)	11
1-1 Canada (Il n'existe à l'heure actuelle aucunes données nationales à déclarer pour 2008 et 2009)	11
1-2 Terre-Neuve-et-Labrador	12
1-3 Île-du-Prince-Édouard	13
1-4 Nouvelle-Écosse	14
1-5 Nouveau-Brunswick	15
1-6 Québec (Il n'existe à l'heure actuelle aucunes données à déclarer pour le Québec pour 2008 et 2009)	16
1-7 Ontario	17
1-8 Manitoba	18
1-9 Saskatchewan	19
1-10 Alberta	20
1-11 Colombie-Britannique	21
1-12 Yukon	22
1-13 Territoires du Nord-Ouest	23
1-14 Nunavut	24
2 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011)	25
2-1 Canada (Il n'existe à l'heure actuelle aucunes données nationales à déclarer pour 2008 et 2009)	25
2-2 Terre-Neuve-et-Labrador	28
2-3 Île-du-Prince-Édouard	31
2-4 Nouvelle-Écosse	34
2-5 Nouveau-Brunswick	37
2-6 Québec (Il n'existe à l'heure actuelle aucunes données à déclarer pour le Québec pour 2008 et 2009)	40

Table des matières – suite

2-7	Ontario	43
2-8	Manitoba	46
2-9	Saskatchewan	49
2-10	Alberta	52
2-11	Colombie-Britannique	55
2-12	Yukon	58
2-13	Territoires du Nord-Ouest	61
2-14	Nunavut	64
Qualité des données, concepts et méthodologie		
	Notes explicatives pour les tableaux	67
Appendice		
I	Sièges de cancer	69

Faits saillants

Les tableaux dans cette publication présentent des données sur l'incidence du cancer pour les cas diagnostiqués en 2008 et en 2009 dans les provinces et les territoires. Il n'existe à l'heure actuelle aucune données nationales à déclarer pour 2008 et 2009. Les tableaux contiennent des données tirées du fichier de totalisations du RCC de juillet 2011. Les données sur l'incidence du cancer de 1992 à 2009 sont disponibles sur CANSIM. Les tendances relatives à l'incidence du cancer et les estimations pour l'an 2011 basées sur ces données ont été diffusées en mai 2011 par la Société canadienne du cancer dans la monographie Statistiques canadiennes sur le cancer.

Aperçu du Registre canadien du cancer

Le Registre canadien du cancer, qui est une base de données axée sur le patient, émane du Système national de déclaration des cas de cancer établi en 1969. Le Registre canadien du cancer est une enquête administrative. Les registres provinciaux et territoriaux du cancer transmettent au Registre canadien du cancer toutes les données qu'ils recueillent pour les cas de cancer diagnostiqués depuis 1992. Le Registre canadien du cancer a été élaboré afin de produire l'information requise sur l'incidence et le taux de survie au Canada, aux fins de la lutte contre le cancer. Le Registre canadien du cancer correspond à une banque de données personnelles qui figure dans la publication annuelle Info Source à Sources de renseignements fédéraux.

Le Registre canadien du cancer est le fruit d'une collaboration entre les treize registres provinciaux et territoriaux du cancer du Canada et de la Division de la statistique de la santé de Statistique Canada où les données sont entreposées. Les données transmises décrivent la personne atteinte du cancer ainsi que les caractéristiques de la tumeur. Le Conseil canadien des registres du cancer collabore avec les registres du cancer afin d'établir des normes nationales. L'autorité et la responsabilité finales en ce qui a trait à la complétude et à la qualité des données incombent aux provinces et territoires.

Le Registre canadien du cancer est une base de données dynamique sur tous les résidents du Canada en vie ou décédés chez lesquels on a diagnostiqué un cancer depuis 1992. Sa fonction est de produire des données normalisées et comparables sur l'incidence du cancer et des statistiques sur la survie pour chaque siège primaire de tumeur. Le Registre canadien du cancer est un système axé sur la personne, qui est conçu pour enregistrer le type et le nombre (incidence) de tumeurs primaires diagnostiquées chez une personne jusqu'à son décès. Ce système fait en sorte que des données longitudinales sont disponibles pour chaque personne atteinte d'un cancer. Il permet de repérer les nouvelles tumeurs primaires qui se manifestent chez des patients déjà atteints d'un cancer. Les données sur les patients sont couplées régulièrement aux données sur la mortalité de sorte qu'on connaisse, en dernière analyse, la date et la cause du décès de tous les patients enregistrés dans la base de données.

En plus de l'information sur l'incidence du cancer, le Registre canadien du cancer contient des données sur les caractéristiques des patients atteints d'une tumeur unique ou de tumeurs multiples, ainsi que sur la nature et la fréquence de ces tumeurs. Puisque les enregistrements patients demeurent actifs dans le Registre canadien du cancer jusqu'à la confirmation du décès, il est possible de calculer des taux de survie aux diverses formes de cancer.

Le Registre canadien du cancer utilise aussi des logiciels spécialisés pour le couplage interne des enregistrements, afin de déceler les enregistrements en double et pour la confirmation des décès de confirmer les enregistrements de décès. Ces procédures sont exécutées régulièrement. Les questions concernant les renseignements contradictoires et d'autres problèmes de données découverts lors de ces traitements sont résolus en consultation avec les provinces et les territoires déclarants.

Buts

L'objectif du RCC est avant tout de créer une grande base de données nationale permettant d'observer les profils et les tendances du cancer et d'étudier les variations du risque de cancer et la survie chez diverses populations au Canada.

Les statistiques sur la santé servent à fournir des renseignements précis, actuels et pertinents concernant la santé des Canadiens et le système de soins de santé. Statistique Canada fournit des analyses statistiques et d'autres renseignements concernant la santé de la population, les déterminants de la santé, ainsi que la portée et l'utilisation des ressources en soins de santé au Canada. Ces données servent à aider et à appuyer les planificateurs et les décideurs de tous les niveaux de gouvernement dans le domaine de la santé, à soutenir les

recherches démographiques et épidémiologiques, et à tenir le public canadien au courant de l'état de santé de la population et du système de soins de santé.

Couverture

Chaque registre provincial ou territorial du cancer enregistre tous les cas de cancer survenus dans la population de sa province ou de son territoire en combinant l'information provenant de diverses sources, comme les dossiers des centres de traitement anticancéreux et les rapports de radiothérapie, les dossiers médicaux d'hospitalisation, les dossiers médicaux des services de consultations externes et des hôpitaux privés, les rapports d'anatomopathologie et d'autres rapports de laboratoire ou d'autopsie, les rapports de radiologie et de programmes de dépistage, les rapports des médecins exerçant dans le privé et les certificats de décès par cancer émis par les bureaux de la statistique de l'état civil.

Chaque année, environ 145 000 nouveaux enregistrements de tumeur sont chargés dans la base de données du Registre canadien du cancer. Les modifications subséquentes qu'il convient d'apporter aux données des registres en raison d'erreurs ou d'omissions sont également communiquées à Statistique Canada aussitôt que l'information est disponible.

Le Conseil canadien des registres du cancer recommande que les tumeurs qui suivent soient déclarées au Registre canadien du cancer :

1992 et années suivantes

- toutes les tumeurs malignes primaires (CIM-O-3, codes de topographie C00.0 à C80.9 avec code de comportement de 3)*;
- tous les carcinomes in situ/intraépithéliaux/non infiltrants/non invasifs (CIM-O-3, codes de topographie C00.0 à C80.9 avec code de comportement de 2)*; toutes les tumeurs à la limite de la malignité (CIM-O-3, codes de topographie C00.0 à C80.9 avec code de comportement de 1)*; les tumeurs primaires bénignes des méninges, du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central (CIM-O-3, codes de topographie C70.0 à C72.9 avec code de comportement de 0).

2007 et années suivantes

Les tumeurs primaires bénignes de l'hypophyse, du canal crâniopharingé et de la glande pinéale (CIM-O-3, codes de topographie C75.1, C75.2, C75.3 avec code de comportement de 0);

* **EXCEPTIONS** (ces tumeurs ne doivent pas être déclarées au RCC);

1992 et années suivantes

- Col de l'utérus (CIM-O-3, codes de topographie C53.0 à C53.9 avec code de comportement de 2)
- Prostate (CIM-O-3, code de topographie C61.9 avec code de comportement de 2);

Peau (CIM-O-3, code de topographie C44 avec codes de comportement 1, 2, 3) pour les codes d'histologie de la CIM-O-3 suivants :

- 8050 à 8084 (tumeurs spinocellulaires)
- 8090 à 8110 (tumeurs basocellulaires)

2007 et années suivantes (en plus des exceptions susmentionnées),

Peau (CIM-O-3, code de topographie C44 avec codes de comportement 1, 2, 3) pour les codes d'histologie de la CIM-O-3 suivants :

- 8000 à 8005 (tumeurs, sans autre histologie indiquée)

- 8010 à 8046 (tumeurs épithéliales, sans autre indication)

Les enregistrements patients comprennent les données nominales, démographiques et sur la mortalité concernant la personne. Les enregistrements tumeur comprennent des renseignements sur les caractéristiques de la tumeur et son diagnostic.

Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

82-221-X	Indicateurs de la santé
82-226-X	Statistiques sur la survie au cancer
82-401-X	Indicateurs de la santé comparables, Canada, provinces et territoires

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

103-0550	Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel
103-0553	Nouveaux cas et taux normalisé selon l'âge pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011), selon le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3207	Registre canadien du cancer (www.statcan.ca/francais/sdds/3207_f.htm)
------	--

Choisis parmi les tableaux sommaires de Statistique Canada

- *Cancer, nouveaux cas selon les sièges primaires choisis du cancer, selon le sexe*
- *Décès et taux de mortalité, par province et territoire*

Tableaux statistiques

Tableau 1-1

Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Canada (Il n'existe à l'heure actuelle aucune données nationales à déclarer pour 2008 et 2009)

	Les deux sexes			Hommes			Femmes					
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Tous les âges												
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
Groupe d'âge, non déclaré
2008												
Tous les âges												
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
Groupe d'âge, non déclaré

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-2
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Terre-Neuve-et-Labrador

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	2 900	570,7	549,9	591,5	1 668	669,2	637,1	701,3	1 232	475,9	449,3	502,4
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	14	44,7	24,4	75,0	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	16	55,3	31,6	89,8	7	48,9	19,6	100,8	9	61,5	28,2	116,7
30 à 34 ans	20	66,6	40,7	102,8	8	54,8	23,6	107,9	12	77,7	40,2	135,7
35 à 39 ans	47	138,3	101,6	183,9	16	97,6	55,8	158,4	31	176,2	119,7	250,1
40 à 44 ans	76	192,5	149,2	235,7	30	157,1	106,0	224,3	46	225,6	165,2	300,9
45 à 49 ans	148	345,6	289,9	401,3	56	263,8	194,7	332,9	92	425,9	338,9	512,9
50 à 54 ans	268	633,6	557,8	709,5	140	677,8	565,6	790,1	128	591,5	489,0	693,9
55 à 59 ans	349	854,8	765,1	944,5	196	975,3	838,8	1 111,9	153	738,0	621,0	854,9
60 à 64 ans	440	1 236,0	1 120,5	1 351,4	276	1 566,9	1 382,1	1 751,8	164	911,8	772,3	1 051,4
65 à 69 ans	484	1 940,3	1 767,5	2 113,2	313	2 548,7	2 266,3	2 831,0	171	1 350,4	1 148,0	1 552,8
70 à 74 ans	377	2 034,9	1 829,5	2 240,3	255	2 848,5	2 498,9	3 198,2	122	1 274,2	1 048,1	1 500,2
75 à 79 ans	305	2 179,3	1 934,8	2 423,9	171	2 656,9	2 258,7	3 055,2	134	1 772,7	1 472,6	2 072,9
80 à 84 ans	210	2 208,0	1 909,3	2 506,6	120	3 069,1	2 519,9	3 618,2	90	1 606,9	1 274,9	1 938,8
85 ans et plus	131	1 589,6	1 317,4	1 861,8	64	2 498,0	1 886,0	3 110,1	67	1 179,8	897,3	1 462,3
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	2 712	535,8	515,6	555,9	1 505	605,8	575,2	636,4	1 207	468,3	441,8	494,7
0 à 4 ans	9	39,2	18,0	74,5	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	8	25,6	11,0	50,4	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	10	35,0	16,8	64,4	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	23	76,1	48,2	114,2	10	68,4	32,8	125,8	13	83,3	44,3	142,4
35 à 39 ans	47	134,4	98,7	178,7	8	47,3	20,4	93,1	39	216,0	153,6	295,3
40 à 44 ans	71	174,7	134,1	215,3	22	111,9	70,1	169,4	49	233,6	172,8	308,9
45 à 49 ans	142	333,6	278,8	388,5	62	294,7	221,3	368,1	80	371,7	290,2	453,1
50 à 54 ans	212	500,0	432,7	567,3	101	488,5	393,2	583,7	111	511,0	415,9	606,0
55 à 59 ans	284	711,2	628,5	793,9	150	759,2	637,7	880,7	134	664,2	551,8	776,7
60 à 64 ans	409	1 205,4	1 088,5	1 322,2	258	1 531,1	1 344,2	1 717,9	151	884,0	743,0	1 025,0
65 à 69 ans	448	1 890,0	1 715,0	2 065,0	278	2 384,2	2 103,9	2 664,5	170	1 411,5	1 199,3	1 623,7
70 à 74 ans	376	2 088,8	1 877,6	2 299,9	238	2 719,1	2 373,6	3 064,5	138	1 492,2	1 243,2	1 741,2
75 à 79 ans	321	2 329,1	2 074,3	2 583,9	189	3 021,1	2 590,4	3 451,8	132	1 753,9	1 454,7	2 053,1
80 à 84 ans	212	2 277,6	1 971,0	2 584,2	111	2 899,7	2 360,2	3 439,1	101	1 843,1	1 483,6	2 202,5
85 ans et plus	129	1 583,0	1 309,8	1 856,2	58	2 294,3	1 703,8	2 884,8	71	1 263,1	969,3	1 556,9
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondants.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-3
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Île-du-Prince-Édouard

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	805	570,5	531,1	609,9	460	667,6	606,6	728,6	345	477,9	427,4	528,3
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	7	79,6	31,9	163,9	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	14	138,7	75,8	232,7	6	117,3	43,0	255,4	8	160,6	69,2	316,3
45 à 49 ans	32	273,0	186,7	385,3	11	191,5	95,6	342,6	21	351,3	217,5	537,0
50 à 54 ans	55	505,5	371,9	639,1	24	454,9	291,5	676,8	31	553,2	375,8	785,2
55 à 59 ans	92	923,8	735,0	1 112,6	59	1 204,6	897,2	1 511,9	33	652,0	448,9	915,6
60 à 64 ans	113	1 220,0	995,1	1 445,0	76	1 664,5	1 290,3	2 038,7	37	787,9	554,7	1 086,0
65 à 69 ans	115	1 766,5	1 443,6	2 089,4	78	2 495,2	1 941,5	3 049,0	37	1 093,4	769,8	1 507,1
70 à 74 ans	115	2 214,1	1 809,4	2 618,8	72	2 913,8	2 240,7	3 586,9	43	1 579,1	1 142,9	2 127,1
75 à 79 ans	96	2 338,0	1 870,3	2 805,7	46	2 426,2	1 776,4	3 236,3	50	2 262,4	1 635,3	2 889,6
80 à 84 ans	67	2 287,5	1 739,7	2 835,2	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	84	2 885,6	2 268,5	3 502,7	39	4 421,8	3 144,0	6 044,2	45	2 217,8	1 617,5	2 967,5
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	810	580,5	540,5	620,4	434	637,1	577,2	697,1	376	526,4	473,2	579,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	8	100,0	43,1	196,9	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	11	125,1	62,5	223,9	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	21	202,8	125,6	310,1	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	33	290,9	200,2	408,4	8	144,4	62,3	284,5	25	430,6	278,7	635,5
50 à 54 ans	54	505,7	370,8	640,6	28	541,3	359,8	782,3	26	472,3	308,4	692,1
55 à 59 ans	77	780,0	605,8	954,2	41	844,5	606,0	1 145,6	36	717,6	502,5	993,4
60 à 64 ans	119	1 353,0	1 109,9	1 596,1	74	1 698,0	1 311,1	2 084,9	45	1 014,2	739,7	1 357,0
65 à 69 ans	121	1 953,2	1 605,2	2 301,2	74	2 448,7	1 890,8	3 006,6	47	1 481,2	1 088,2	1 969,7
70 à 74 ans	116	2 271,4	1 858,0	2 684,7	73	2 990,6	2 304,5	3 676,6	43	1 612,9	1 167,3	2 172,5
75 à 79 ans	98	2 448,8	1 963,9	2 933,6	54	2 957,3	2 168,5	3 746,1	44	2 022,1	1 469,2	2 714,6
80 à 84 ans	64	2 239,3	1 690,7	2 788,0	32	2 782,6	1 903,5	3 927,8	32	1 873,5	1 281,6	2 644,6
85 ans et plus	79	2 731,7	2 129,3	3 334,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-4
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nouvelle-Écosse

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	5 361	570,9	555,6	586,1	2 847	624,5	601,5	647,4	2 514	520,3	499,9	540,6
0 à 4 ans	8	18,2	7,9	35,9	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	11	17,9	8,9	32,0	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	22	35,2	22,0	53,2	12	38,5	19,9	67,3	10	31,8	15,3	58,5
25 à 29 ans	25	44,5	28,8	65,7	11	41,1	20,5	73,6	14	47,7	26,0	80,0
30 à 34 ans	39	70,9	50,4	96,9	10	37,9	18,2	69,7	29	101,3	67,8	145,5
35 à 39 ans	82	133,8	104,9	162,8	26	86,6	56,5	126,9	56	179,2	132,3	226,2
40 à 44 ans	123	183,0	150,7	215,4	33	99,9	68,8	140,3	90	263,4	209,0	317,8
45 à 49 ans	255	318,5	279,4	357,6	102	258,8	208,6	309,0	153	376,4	316,8	436,0
50 à 54 ans	408	534,1	482,3	586,0	205	549,2	474,0	624,3	203	519,8	448,3	591,3
55 à 59 ans	571	835,6	767,1	904,1	308	917,2	814,8	1 019,6	263	756,8	665,3	848,2
60 à 64 ans	789	1 277,5	1 188,3	1 366,6	464	1 529,3	1 390,2	1 668,5	325	1 034,3	921,8	1 146,7
65 à 69 ans	754	1 654,7	1 536,6	1 772,8	425	1 929,9	1 746,4	2 113,4	329	1 397,3	1 246,3	1 548,3
70 à 74 ans	690	1 998,2	1 849,1	2 147,3	406	2 487,0	2 245,1	2 728,9	284	1 559,9	1 378,5	1 741,4
75 à 79 ans	653	2 393,0	2 209,4	2 576,5	397	3 290,0	2 966,3	3 613,6	256	1 681,9	1 475,9	1 887,9
80 à 84 ans	456	2 282,5	2 073,0	2 492,0	241	3 029,9	2 647,4	3 412,5	215	1 788,1	1 549,1	2 027,1
85 ans et plus	466	2 303,1	2 093,9	2 512,2	196	3 159,8	2 717,4	3 602,1	270	1 924,3	1 694,8	2 153,8
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	5 513	588,5	573,0	604,1	2 883	633,8	610,7	656,9	2 630	545,8	524,9	566,7
0 à 4 ans	11	25,3	12,6	45,3	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	9	14,3	6,6	27,2	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	14	22,8	12,4	38,2	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	31	56,1	38,1	79,6	12	45,7	23,6	79,9	19	65,4	39,4	102,1
30 à 34 ans	37	66,9	47,1	92,1	11	41,3	20,6	73,8	26	90,7	59,2	132,8
35 à 39 ans	67	107,8	82,0	133,6	22	71,8	45,0	108,7	45	142,8	104,2	191,1
40 à 44 ans	145	204,2	171,0	237,4	50	143,1	103,4	182,8	95	263,4	210,4	316,4
45 à 49 ans	243	305,4	267,0	343,9	78	199,6	155,3	243,8	165	407,7	345,5	469,9
50 à 54 ans	402	531,6	479,7	583,6	194	524,4	450,6	598,2	208	538,6	465,4	611,8
55 à 59 ans	575	856,3	786,3	926,3	313	945,2	840,5	1 049,9	262	769,8	676,6	863,0
60 à 64 ans	707	1 191,1	1 103,3	1 278,9	427	1 464,3	1 325,4	1 603,2	280	927,3	818,7	1 035,9
65 à 69 ans	784	1 792,5	1 667,1	1 918,0	461	2 181,9	1 982,8	2 381,1	323	1 428,6	1 272,8	1 584,4
70 à 74 ans	795	2 362,1	2 197,9	2 526,3	474	2 983,2	2 714,6	3 251,8	321	1 806,6	1 609,0	2 004,3
75 à 79 ans	665	2 456,7	2 270,0	2 643,4	359	3 002,2	2 691,6	3 312,7	306	2 025,0	1 798,1	2 251,9
80 à 84 ans	519	2 623,7	2 398,0	2 849,5	253	3 261,6	2 859,7	3 663,5	266	2 212,2	1 946,4	2 478,1
85 ans et plus	497	2 508,8	2 288,3	2 729,4	206	3 415,7	2 949,2	3 882,1	291	2 111,9	1 869,3	2 354,6
Groupe d'âge, non déclaré	1	1	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-5
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nouveau-Brunswick

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	4 394	586,4	569,1	603,7	2 378	646,5	620,5	672,5	2 016	528,4	505,4	551,5
0 à 4 ans	9	25,4	11,6	48,1	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	8	21,4	9,2	42,2	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	8	16,6	7,2	32,7	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	10	43,7	21,0	80,4
25 à 29 ans	26	57,0	37,2	83,5	12	52,5	27,1	91,7	14	61,5	33,6	103,1
30 à 34 ans	38	82,9	58,6	113,7	13	57,8	30,8	98,9	25	106,9	69,2	157,8
35 à 39 ans	44	89,7	65,2	120,4	16	66,1	37,8	107,3	28	112,6	74,9	162,8
40 à 44 ans	96	177,5	142,0	213,0	29	108,9	72,9	156,3	67	244,2	185,7	302,7
45 à 49 ans	202	324,7	280,0	369,5	74	242,9	187,6	298,3	128	403,2	333,4	473,1
50 à 54 ans	364	596,7	535,4	658,0	182	608,8	520,4	697,3	182	585,1	500,1	670,1
55 à 59 ans	509	907,8	828,9	986,6	290	1 053,8	932,5	1 175,1	219	767,0	665,5	868,6
60 à 64 ans	637	1 290,9	1 190,7	1 391,2	372	1 516,3	1 362,2	1 670,4	265	1 068,0	939,4	1 196,6
65 à 69 ans	617	1 723,8	1 587,8	1 859,9	394	2 231,0	2 010,7	2 451,3	223	1 229,9	1 068,4	1 391,3
70 à 74 ans	594	2 220,1	2 041,6	2 398,7	356	2 806,0	2 514,5	3 097,5	238	1 691,8	1 476,8	1 906,7
75 à 79 ans	507	2 365,6	2 159,7	2 571,5	288	3 033,5	2 683,1	3 383,8	219	1 834,5	1 591,5	2 077,4
80 à 84 ans	366	2 256,3	2 025,2	2 487,5	188	2 922,4	2 504,7	3 340,2	178	1 818,6	1 551,4	2 085,7
85 ans et plus	345	2 156,3	1 928,7	2 383,8	140	2 802,2	2 338,0	3 266,4	205	1 863,0	1 607,9	2 118,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	4 488	600,9	583,3	618,5	2 526	689,0	662,1	715,8	1 962	516,0	493,1	538,8
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	13	26,7	14,2	45,7	6	24,0	8,8	52,3	7	29,6	11,9	61,0
20 à 24 ans	15	31,9	17,8	52,5	9	37,2	17,1	70,7	6	26,2	9,6	57,0
25 à 29 ans	24	53,0	34,0	78,9	14	61,6	33,7	103,3	10	44,3	21,3	81,5
30 à 34 ans	31	67,3	45,7	95,5	15	66,7	37,3	110,0	16	67,9	38,8	110,3
35 à 39 ans	63	126,7	95,4	158,0	22	89,3	56,0	135,2	41	163,5	117,3	221,7
40 à 44 ans	107	189,0	153,2	224,8	40	142,9	102,1	194,7	67	234,0	178,0	290,1
45 à 49 ans	197	318,9	274,4	363,5	69	228,0	174,2	281,8	128	406,3	336,0	476,7
50 à 54 ans	329	540,9	482,4	599,3	165	552,4	468,1	636,7	164	529,8	448,7	610,8
55 à 59 ans	475	860,9	783,5	938,3	264	975,0	857,4	1 092,6	211	751,0	649,6	852,3
60 à 64 ans	660	1 407,8	1 300,4	1 515,2	410	1 762,6	1 592,0	1 933,2	250	1 058,4	927,2	1 189,6
65 à 69 ans	667	1 945,2	1 797,6	2 092,9	441	2 605,8	2 362,6	2 849,0	226	1 301,5	1 131,8	1 471,2
70 à 74 ans	618	2 379,9	2 192,2	2 567,5	395	3 228,7	2 910,3	3 547,1	223	1 623,7	1 410,6	1 836,8
75 à 79 ans	494	2 327,2	2 122,0	2 532,5	278	2 972,6	2 623,2	3 322,1	216	1 818,9	1 576,4	2 061,5
80 à 84 ans	419	2 575,0	2 328,4	2 821,5	228	3 559,7	3 097,7	4 021,8	191	1 935,7	1 661,2	2 210,3
85 ans et plus	361	2 332,2	2 091,6	2 572,8	166	3 487,4	2 956,9	4 017,9	195	1 819,2	1 563,9	2 074,5
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondants.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-6
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Québec¹ (Il n'existe à l'heure actuelle aucune données à déclarer pour le Québec pour 2008 et 2009)

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
Groupe d'âge, non déclaré
2008												
Tous les âges
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et plus
Groupe d'âge, non déclaré

1. Pour aider à l'interprétation des résultats, il est important de souligner que les cancers déclarés au Fichier des tumeurs du Québec (FITQ) sont ceux ayant fait l'objet d'une hospitalisation ou d'une chirurgie d'un jour. Certains cancers ne sont donc pas déclarés au FITQ s'ils sont diagnostiqués et traités uniquement sur une base externe ou ambulatoire, ou encore ils sont déclarés à un stade plus avancé de la maladie qui requiert une hospitalisation. Une étude d'exhaustivité produite en 2003 évalue entre autres que plus du tiers des cancers de la prostate et des mélanomes ne sont pas déclarés au FITQ en raison de notre source de déclaration. Globalement, 90 % des cas de cancer confirmés par histopathologie seraient déclarés au FITQ.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-7
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Ontario¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	64 874	496,6	492,7	500,4	32 572	505,8	500,3	511,3	32 302	487,5	482,2	492,9
0 à 4 ans	174	24,6	21,0	28,3	97	26,8	21,5	32,1	77	22,4	17,4	27,4
5 à 9 ans	115	16,0	13,1	18,9	65	17,6	13,3	21,8	50	14,3	10,3	18,2
10 à 14 ans	105	13,3	10,8	15,9	51	12,7	9,2	16,1	54	14,0	10,3	17,8
15 à 19 ans	214	24,2	20,9	27,4	114	25,2	20,6	29,8	100	23,1	18,6	27,6
20 à 24 ans	346	38,0	34,0	42,1	142	30,6	25,5	35,6	204	45,8	39,6	52,1
25 à 29 ans	527	59,2	54,2	64,3	193	43,6	37,5	49,8	334	74,6	66,6	82,7
30 à 34 ans	820	94,6	88,1	101,0	274	64,6	56,9	72,2	546	123,2	112,9	133,6
35 à 39 ans	1 328	144,4	136,7	152,2	384	84,1	75,7	92,5	944	204,0	191,0	217,0
40 à 44 ans	2 207	221,0	211,8	230,2	688	137,6	127,3	147,9	1 519	304,5	289,2	319,8
45 à 49 ans	3 659	333,5	322,7	344,3	1 337	242,3	229,3	255,3	2 322	425,8	408,5	443,1
50 à 54 ans	5 291	546,0	531,3	560,7	2 294	475,7	456,2	495,1	2 997	615,7	593,7	637,8
55 à 59 ans	6 585	800,1	780,8	819,4	3 308	821,2	793,2	849,1	3 277	779,9	753,2	806,6
60 à 64 ans	8 438	1 197,5	1 172,0	1 223,1	4 680	1 362,2	1 323,1	1 401,2	3 758	1 040,9	1 007,6	1 074,2
65 à 69 ans	8 498	1 618,7	1 584,3	1 653,2	4 914	1 948,2	1 893,7	2 002,6	3 584	1 314,1	1 271,1	1 357,1
70 à 74 ans	8 274	1 991,0	1 948,1	2 033,9	4 745	2 462,6	2 392,5	2 532,7	3 529	1 583,3	1 531,0	1 635,5
75 à 79 ans	7 655	2 186,5	2 137,5	2 235,5	4 236	2 699,4	2 618,1	2 780,7	3 419	1 769,8	1 710,5	1 829,2
80 à 84 ans	5 947	2 255,9	2 198,5	2 313,2	3 115	2 907,6	2 805,5	3 009,7	2 832	1 809,7	1 743,1	1 876,4
85 ans et plus	4 687	2 010,6	1 953,1	2 068,2	1 933	2 562,5	2 448,3	2 676,8	2 754	1 746,6	1 681,4	1 811,8
Groupe d'âge, non déclaré	4	2	2
2008												
Tous les âges	61 612	476,4	472,7	480,2	31 694	497,0	491,5	502,5	29 918	456,4	451,2	461,6
0 à 4 ans	181	25,7	22,0	29,5	90	24,9	19,8	30,1	91	26,6	21,1	32,0
5 à 9 ans	87	12,1	9,6	14,7	43	11,7	8,4	15,7	44	12,6	9,1	16,9
10 à 14 ans	116	14,5	11,8	17,1	63	15,4	11,6	19,2	53	13,5	9,9	17,2
15 à 19 ans	213	24,0	20,8	27,2	109	24,0	19,5	28,6	104	24,0	19,4	28,6
20 à 24 ans	346	38,6	34,6	42,7	165	36,1	30,6	41,6	181	41,2	35,2	47,3
25 à 29 ans	498	57,4	52,3	62,4	188	43,7	37,4	49,9	310	70,9	63,0	78,8
30 à 34 ans	762	88,3	82,0	94,6	267	63,0	55,5	70,6	495	112,7	102,7	122,6
35 à 39 ans	1 277	137,3	129,8	144,9	433	93,2	84,4	102,0	844	181,4	169,1	193,6
40 à 44 ans	2 125	205,9	197,1	214,6	686	132,5	122,5	142,4	1 439	279,8	265,3	294,2
45 à 49 ans	3 401	316,8	306,1	327,4	1 219	225,7	213,0	238,3	2 182	409,1	391,9	426,3
50 à 54 ans	4 977	526,7	512,1	541,4	2 272	484,9	464,9	504,8	2 705	568,0	546,6	589,4
55 à 59 ans	6 369	796,0	776,4	815,5	3 329	848,8	819,9	877,6	3 040	745,2	718,7	771,7
60 à 64 ans	7 758	1 152,0	1 126,4	1 177,7	4 377	1 330,7	1 291,3	1 370,1	3 381	981,4	948,3	1 014,5
65 à 69 ans	8 008	1 587,3	1 552,5	1 622,1	4 667	1 932,2	1 876,7	1 987,6	3 341	1 270,5	1 227,5	1 313,6
70 à 74 ans	7 826	1 922,9	1 880,3	1 965,5	4 608	2 441,6	2 371,1	2 512,1	3 218	1 474,4	1 423,4	1 525,3
75 à 79 ans	7 335	2 107,7	2 059,4	2 155,9	4 219	2 714,9	2 633,0	2 796,8	3 116	1 617,8	1 561,0	1 674,6
80 à 84 ans	5 872	2 251,8	2 194,2	2 309,4	2 999	2 874,4	2 771,5	2 977,3	2 873	1 836,6	1 769,4	1 903,8
85 ans et plus	4 458	2 025,7	1 966,2	2 085,1	1 959	2 774,9	2 652,0	2 897,7	2 499	1 671,8	1 606,3	1 737,4
Groupe d'âge, non déclaré	3	1	2

1. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer. Les cancers cutanés sans mélanome ne sont pas répertoriés en Ontario. Les sarcomes de Kaposi sont considérablement sous-estimés.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-8
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Manitoba

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	6 021	493,7	481,2	506,2	3 010	495,9	478,2	513,6	3 011	491,5	474,0	509,1
0 à 4 ans	15	19,9	11,2	32,9	7	18,2	7,3	37,5	8	21,8	9,4	42,9
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	17	19,0	11,1	30,4	8	17,5	7,6	34,5	9	20,5	9,4	38,9
20 à 24 ans	32	36,9	25,2	52,1	15	33,6	18,8	55,4	17	40,4	23,5	64,6
25 à 29 ans	41	49,5	35,5	67,1	25	59,0	38,2	87,0	16	39,5	22,6	64,2
30 à 34 ans	60	77,2	57,7	96,7	27	68,8	45,3	100,0	33	85,8	59,1	120,5
35 à 39 ans	91	116,4	92,5	140,3	32	80,7	55,2	113,9	59	153,0	114,0	192,0
40 à 44 ans	146	179,0	150,0	208,1	46	111,4	81,6	148,6	100	248,4	199,7	297,1
45 à 49 ans	284	300,9	265,9	335,9	95	198,0	158,2	237,8	189	407,2	349,2	465,3
50 à 54 ans	462	520,7	473,2	568,2	194	428,8	368,4	489,1	268	616,4	542,6	690,2
55 à 59 ans	544	707,6	648,1	767,0	267	700,7	616,6	784,7	277	714,4	630,3	798,5
60 à 64 ans	809	1 258,6	1 171,9	1 345,4	435	1 373,1	1 244,1	1 502,2	374	1 147,3	1 031,1	1 263,6
65 à 69 ans	787	1 671,2	1 554,4	1 788,0	447	1 957,3	1 775,8	2 138,7	340	1 401,8	1 252,8	1 550,8
70 à 74 ans	747	2 048,5	1 901,6	2 195,4	395	2 336,9	2 106,4	2 567,3	352	1 799,3	1 611,3	1 987,3
75 à 79 ans	731	2 274,4	2 109,5	2 439,2	423	2 956,4	2 674,6	3 238,1	308	1 727,1	1 534,2	1 920,0
80 à 84 ans	613	2 389,4	2 200,2	2 578,6	315	3 076,2	2 736,5	3 415,9	298	1 933,2	1 713,7	2 152,7
85 ans et plus	629	2 338,7	2 156,0	2 521,5	274	3 226,2	2 844,2	3 608,2	355	1 929,1	1 728,5	2 129,8
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	5 892	488,8	476,3	501,2	2 954	492,7	474,9	510,4	2 938	484,9	467,3	502,4
0 à 4 ans	13	17,7	9,4	30,3	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	6	8,1	3,0	17,6	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	10	12,2	5,9	22,5	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	14	15,7	8,6	26,4	6	13,3	4,9	28,9	8	18,3	7,9	36,1
20 à 24 ans	21	24,7	15,3	37,7	9	20,6	9,4	39,0	12	29,0	15,0	50,6
25 à 29 ans	42	52,2	37,7	70,6	22	53,5	33,5	81,0	20	50,9	31,1	78,7
30 à 34 ans	64	83,7	63,2	104,2	17	43,9	25,5	70,2	47	124,7	91,6	165,8
35 à 39 ans	83	106,7	83,8	129,7	30	76,2	51,4	108,8	53	138,0	100,9	175,2
40 à 44 ans	136	161,4	134,3	188,5	41	96,2	69,0	130,5	95	228,1	182,2	274,0
45 à 49 ans	296	315,0	279,1	350,9	112	233,8	190,5	277,0	184	399,5	341,8	457,2
50 à 54 ans	419	479,5	433,6	525,4	187	422,3	361,7	482,8	232	538,2	469,0	607,5
55 à 59 ans	539	723,7	662,6	784,8	264	715,1	628,8	801,3	275	732,1	645,6	818,6
60 à 64 ans	728	1 180,3	1 094,5	1 266,0	391	1 281,6	1 154,6	1 408,6	337	1 081,1	965,7	1 196,6
65 à 69 ans	752	1 664,5	1 545,5	1 783,4	434	1 996,6	1 808,7	2 184,4	318	1 356,5	1 207,4	1 505,6
70 à 74 ans	736	2 035,4	1 888,3	2 182,4	434	2 584,9	2 341,7	2 828,1	302	1 559,1	1 383,3	1 735,0
75 à 79 ans	761	2 347,5	2 180,7	2 514,2	415	2 898,9	2 619,9	3 177,8	346	1 911,4	1 710,0	2 112,8
80 à 84 ans	650	2 503,7	2 311,2	2 696,1	326	3 180,8	2 835,5	3 526,1	324	2 062,0	1 837,5	2 286,5
85 ans et plus	622	2 383,6	2 196,3	2 570,9	246	3 001,5	2 626,4	3 376,5	376	2 100,7	1 888,3	2 313,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-9
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Saskatchewan

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	5 101	495,7	482,1	509,3	2 670	521,9	502,1	541,7	2 431	469,7	451,1	488,4
0 à 4 ans	14	21,4	11,7	35,9	8	23,8	10,3	46,9	6	18,9	6,9	41,1
5 à 9 ans	6	9,6	3,5	21,0	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	8	12,0	5,2	23,6	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	15	19,8	11,1	32,6	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	18	23,6	14,0	37,4	9	22,9	10,5	43,5	9	24,4	11,2	46,3
25 à 29 ans	24	33,6	21,5	50,0	13	36,2	19,2	61,8	11	31,1	15,5	55,6
30 à 34 ans	52	80,8	58,9	102,8	16	49,7	28,4	80,6	36	112,1	78,5	155,2
35 à 39 ans	53	88,3	64,5	112,1	24	79,3	50,8	118,0	29	97,4	65,3	140,0
40 à 44 ans	127	197,3	163,0	231,6	41	126,5	90,8	171,6	86	269,1	212,2	326,0
45 à 49 ans	252	323,3	283,4	363,2	92	236,1	187,9	284,4	160	410,4	346,8	474,0
50 à 54 ans	364	479,4	430,2	528,7	169	445,4	378,3	512,6	195	513,3	441,3	585,4
55 à 59 ans	491	761,9	694,5	829,3	252	773,8	678,3	869,3	239	749,7	654,7	844,8
60 à 64 ans	638	1 223,3	1 128,4	1 318,2	354	1 361,1	1 219,3	1 502,9	284	1 086,2	959,8	1 212,5
65 à 69 ans	655	1 649,6	1 523,3	1 775,9	407	2 098,8	1 894,9	2 302,7	248	1 220,8	1 068,8	1 372,7
70 à 74 ans	712	2 140,2	1 983,0	2 297,4	396	2 512,7	2 265,2	2 760,2	316	1 804,9	1 605,9	2 003,9
75 à 79 ans	652	2 185,6	2 017,8	2 353,3	369	2 720,8	2 443,2	2 998,5	283	1 739,4	1 536,7	1 942,1
80 à 84 ans	527	2 178,9	1 992,8	2 364,9	281	2 770,1	2 446,2	3 094,0	246	1 751,8	1 532,9	1 970,7
85 ans et plus	493	1 964,9	1 791,5	2 138,4	218	2 614,8	2 267,7	2 962,0	275	1 641,5	1 447,5	1 835,5
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	5 152	508,2	494,3	522,1	2 775	551,7	531,2	572,2	2 377	465,4	446,7	484,1
0 à 4 ans	20	31,7	19,4	48,9	13	40,0	21,3	68,5	7	22,8	9,2	47,0
5 à 9 ans	7	11,4	4,6	23,4	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	7	10,4	4,2	21,4	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	13	16,9	9,0	28,9	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	15	20,2	11,3	33,4	9	23,6	10,8	44,9	6	16,7	6,1	36,3
25 à 29 ans	35	51,1	35,6	71,1	16	46,5	26,6	75,5	19	55,8	33,6	87,1
30 à 34 ans	48	78,4	57,8	103,9	24	78,2	50,1	116,4	24	78,5	50,3	116,8
35 à 39 ans	69	116,4	88,9	143,9	27	90,7	59,8	131,9	42	142,4	102,6	192,5
40 à 44 ans	97	145,0	116,2	173,9	36	107,5	75,3	148,8	61	182,7	136,9	228,6
45 à 49 ans	228	293,7	255,6	331,8	107	276,0	223,7	328,2	121	311,4	255,9	366,9
50 à 54 ans	420	561,7	508,0	615,4	184	492,5	421,3	563,6	236	630,8	550,4	711,3
55 à 59 ans	482	781,5	711,7	851,2	240	770,3	672,8	867,7	242	792,9	693,0	892,8
60 à 64 ans	612	1 235,8	1 137,9	1 333,7	353	1 428,5	1 279,4	1 577,5	259	1 043,8	916,7	1 171,0
65 à 69 ans	647	1 670,5	1 541,8	1 799,2	395	2 093,2	1 886,7	2 299,6	252	1 268,9	1 112,2	1 425,5
70 à 74 ans	680	2 038,7	1 885,5	2 192,0	395	2 512,7	2 264,9	2 760,5	285	1 616,2	1 428,6	1 803,8
75 à 79 ans	674	2 241,7	2 072,5	2 411,0	401	2 941,0	2 653,1	3 228,8	273	1 661,5	1 464,4	1 858,6
80 à 84 ans	570	2 347,7	2 155,0	2 540,4	300	2 954,8	2 620,4	3 289,2	270	1 911,4	1 683,4	2 139,4
85 ans et plus	528	2 135,6	1 953,4	2 317,7	262	3 231,8	2 840,4	3 623,1	266	1 600,8	1 408,4	1 793,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-10
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Alberta

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	14 674	399,8	393,3	406,2	7 818	416,9	407,7	426,1	6 856	381,8	372,8	390,9
0 à 4 ans	47	19,8	14,6	26,4	26	21,4	13,9	31,3	21	18,2	11,3	27,8
5 à 9 ans	21	9,9	6,1	15,1	12	10,9	5,6	19,0	9	8,8	4,0	16,7
10 à 14 ans	19	8,6	5,2	13,4	10	8,8	4,2	16,2	9	8,4	3,8	15,9
15 à 19 ans	49	19,9	14,7	26,2	23	18,1	11,5	27,2	26	21,7	14,2	31,8
20 à 24 ans	71	24,7	18,9	30,4	37	24,5	17,2	33,7	34	24,9	17,3	34,8
25 à 29 ans	172	55,7	47,3	64,0	74	45,3	35,0	55,6	98	67,3	54,0	80,6
30 à 34 ans	184	65,0	55,6	74,4	70	46,9	35,9	57,9	114	85,2	69,6	100,9
35 à 39 ans	306	111,9	99,3	124,4	87	60,5	47,8	73,3	219	168,7	146,3	191,0
40 à 44 ans	465	173,5	157,7	189,3	157	112,9	95,3	130,6	308	238,8	212,1	265,5
45 à 49 ans	875	297,2	277,5	316,9	347	230,4	206,1	254,6	528	367,2	335,9	398,5
50 à 54 ans	1 326	490,5	464,1	516,9	655	471,8	435,7	507,9	671	510,2	471,6	548,8
55 à 59 ans	1 650	767,6	730,6	804,6	917	838,6	784,3	892,9	733	694,1	643,8	744,3
60 à 64 ans	1 890	1 130,4	1 079,4	1 181,4	1 103	1 315,1	1 237,5	1 392,7	787	944,5	878,5	1 010,5
65 à 69 ans	1 896	1 610,7	1 538,2	1 683,2	1 131	1 948,3	1 834,7	2 061,8	765	1 282,2	1 191,3	1 373,0
70 à 74 ans	1 750	1 972,6	1 880,2	2 065,0	1 076	2 557,2	2 404,4	2 710,0	674	1 445,2	1 336,1	1 554,3
75 à 79 ans	1 696	2 264,2	2 156,4	2 371,9	976	2 828,2	2 650,8	3 005,7	720	1 782,3	1 652,1	1 912,5
80 à 84 ans	1 244	2 300,0	2 172,1	2 427,8	674	2 960,8	2 737,3	3 184,3	570	1 819,7	1 670,3	1 969,1
85 ans et plus	1 012	2 035,5	1 910,1	2 160,9	443	2 693,3	2 442,5	2 944,1	569	1 710,3	1 569,8	1 850,8
Groupe d'âge, non déclaré	1	0	1
2008												
Tous les âges	14 465	402,8	396,2	409,3	7 736	422,1	412,7	431,5	6 729	382,7	373,5	391,8
0 à 4 ans	51	22,3	16,2	28,5	28	23,8	15,8	34,4	23	20,8	13,2	31,2
5 à 9 ans	34	16,2	11,2	22,6	17	15,7	9,1	25,1	17	16,8	9,8	26,8
10 à 14 ans	31	13,9	9,5	19,8	21	18,4	11,4	28,1	10	9,2	4,4	16,9
15 à 19 ans	56	22,5	16,6	28,4	34	26,5	18,4	37,1	22	18,2	11,4	27,6
20 à 24 ans	101	35,4	28,5	42,2	53	35,2	25,7	44,7	48	35,5	26,2	47,1
25 à 29 ans	164	55,8	47,3	64,3	82	52,8	41,4	64,2	82	59,2	46,3	72,0
30 à 34 ans	207	75,9	65,6	86,3	81	56,4	44,1	68,7	126	97,6	80,6	114,7
35 à 39 ans	271	101,5	89,4	113,6	106	75,9	61,4	90,3	165	129,6	109,9	149,4
40 à 44 ans	460	169,5	154,0	185,0	148	105,5	88,5	122,5	312	237,8	211,4	264,2
45 à 49 ans	861	295,8	276,1	315,6	338	227,4	203,2	251,7	523	367,2	335,7	398,6
50 à 54 ans	1 273	483,5	457,0	510,1	637	471,3	434,7	507,9	636	496,4	457,8	535,0
55 à 59 ans	1 558	762,3	724,5	800,2	853	821,1	766,0	876,2	705	701,6	649,8	753,4
60 à 64 ans	1 818	1 150,0	1 097,2	1 202,9	1 046	1 318,3	1 238,4	1 398,2	772	980,5	911,3	1 049,6
65 à 69 ans	1 869	1 668,2	1 592,6	1 743,8	1 126	2 045,7	1 926,2	2 165,2	743	1 303,7	1 209,9	1 397,4
70 à 74 ans	1 764	2 016,1	1 922,0	2 110,2	1 030	2 476,2	2 325,0	2 627,4	734	1 599,2	1 483,5	1 714,9
75 à 79 ans	1 654	2 225,5	2 118,2	2 332,7	973	2 850,1	2 671,0	3 029,2	681	1 694,7	1 567,5	1 822,0
80 à 84 ans	1 206	2 284,0	2 155,1	2 413,0	669	3 051,6	2 820,3	3 282,8	537	1 739,1	1 592,0	1 886,2
85 ans et plus	1 087	2 289,1	2 153,0	2 425,2	494	3 163,0	2 884,1	3 441,9	593	1 860,8	1 711,0	2 010,6
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-11

Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Colombie-Britannique

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	21 594	484,1	477,7	490,6	11 414	516,0	506,5	525,4	10 180	452,8	444,0	461,6
0 à 4 ans	39	17,8	12,6	24,3	17	15,0	8,7	24,0	22	20,7	13,0	31,4
5 à 9 ans	23	10,4	6,6	15,7	16	14,0	8,0	22,8	7	6,6	2,6	13,6
10 à 14 ans	22	8,9	5,6	13,5	10	7,9	3,8	14,5	12	10,0	5,2	17,5
15 à 19 ans	48	16,7	12,3	22,2	29	19,6	13,1	28,1	19	13,7	8,3	21,4
20 à 24 ans	97	30,9	24,8	37,1	44	27,0	19,6	36,3	53	35,2	25,7	44,6
25 à 29 ans	160	51,4	43,4	59,4	77	49,5	38,4	60,5	83	53,4	41,9	64,9
30 à 34 ans	210	73,2	63,3	83,1	92	64,9	51,6	78,1	118	81,3	66,6	96,0
35 à 39 ans	341	112,3	100,3	124,2	108	71,7	58,2	85,2	233	152,2	132,7	171,8
40 à 44 ans	570	173,9	159,6	188,2	176	108,1	92,2	124,1	394	238,7	215,1	262,3
45 à 49 ans	1 038	281,9	264,8	299,1	371	203,0	182,4	223,7	667	359,7	332,4	387,0
50 à 54 ans	1 507	434,2	412,3	456,2	637	373,8	344,8	402,8	870	492,5	459,8	525,3
55 à 59 ans	2 077	671,4	642,5	700,2	1 081	710,9	668,5	753,3	996	633,1	593,8	672,5
60 à 64 ans	2 818	1 072,7	1 033,1	1 112,3	1 617	1 248,6	1 187,7	1 309,4	1 201	901,7	850,7	952,7
65 à 69 ans	3 038	1 549,6	1 494,5	1 604,7	1 820	1 888,0	1 801,2	1 974,7	1 218	1 222,3	1 153,6	1 290,9
70 à 74 ans	2 826	1 875,7	1 806,6	1 944,9	1 653	2 265,8	2 156,6	2 375,0	1 173	1 509,5	1 423,1	1 595,9
75 à 79 ans	2 659	2 120,2	2 039,6	2 200,8	1 546	2 600,9	2 471,2	2 730,5	1 113	1 687,1	1 588,0	1 786,2
80 à 84 ans	2 123	2 252,7	2 156,8	2 348,5	1 171	2 884,2	2 719,0	3 049,4	952	1 774,7	1 662,0	1 887,4
85 ans et plus	1 998	2 216,9	2 119,7	2 314,1	949	3 022,9	2 830,5	3 215,2	1 049	1 786,0	1 678,0	1 894,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	20 988	478,8	472,3	485,2	11 250	517,6	508,1	527,2	9 738	440,5	431,8	449,3
0 à 4 ans	45	20,9	15,2	28,0	26	23,3	15,2	34,2	19	18,3	11,0	28,5
5 à 9 ans	27	12,3	8,1	17,9	10	8,8	4,2	16,2	17	16,0	9,3	25,6
10 à 14 ans	37	14,8	10,4	20,3	18	13,9	8,2	22,0	19	15,6	9,4	24,4
15 à 19 ans	55	19,1	14,1	24,2	29	19,5	13,0	27,9	26	18,7	12,2	27,5
20 à 24 ans	81	26,7	20,9	32,5	45	28,8	21,0	38,5	36	24,5	17,2	34,0
25 à 29 ans	145	48,7	40,8	56,7	64	43,2	32,6	53,8	81	54,3	42,4	66,1
30 à 34 ans	179	64,0	54,6	73,3	84	60,6	47,7	73,6	95	67,2	53,7	80,7
35 à 39 ans	281	91,7	80,9	102,4	101	66,3	53,4	79,3	180	116,6	99,6	133,7
40 à 44 ans	604	180,8	166,4	195,3	191	115,0	98,7	131,3	413	246,0	222,3	269,7
45 à 49 ans	1 016	281,0	263,7	298,3	386	215,8	194,3	237,3	630	344,9	318,0	371,9
50 à 54 ans	1 562	458,3	435,6	481,1	694	414,3	383,5	445,1	868	500,9	467,6	534,2
55 à 59 ans	2 103	699,2	669,3	729,0	1 113	751,4	707,3	795,5	990	648,5	608,1	688,9
60 à 64 ans	2 641	1 056,0	1 015,7	1 096,2	1 483	1 197,8	1 136,9	1 258,8	1 158	916,9	864,1	969,7
65 à 69 ans	2 775	1 491,7	1 436,2	1 547,2	1 681	1 838,2	1 750,3	1 926,0	1 094	1 156,7	1 088,2	1 225,2
70 à 74 ans	2 626	1 784,0	1 715,8	1 852,3	1 569	2 199,2	2 090,4	2 308,1	1 057	1 393,5	1 309,5	1 477,5
75 à 79 ans	2 725	2 189,4	2 107,2	2 271,6	1 617	2 753,0	2 618,9	2 887,2	1 108	1 685,7	1 586,5	1 785,0
80 à 84 ans	2 105	2 275,4	2 178,2	2 372,6	1 184	3 023,4	2 851,2	3 195,6	921	1 726,3	1 614,8	1 837,8
85 ans et plus	1 981	2 322,1	2 219,9	2 424,4	955	3 248,2	3 042,2	3 454,2	1 026	1 835,2	1 722,9	1 947,5
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-12
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Yukon

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	129	383,3	317,2	449,5	68	395,8	301,7	489,8	61	370,4	277,4	463,3
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	7	211,8	85,0	436,3	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	18	594,6	352,5	939,9	8	488,1	210,5	961,6	10	720,5	345,8	1 324,9
55 à 59 ans	17	657,4	382,8	1 052,6	8	573,1	247,1	1 128,9	9	756,3	346,2	1 435,3
60 à 64 ans	29	1 491,0	998,5	2 141,4	17	1 647,3	959,3	2 637,6	12	1 314,3	679,1	2 295,7
65 à 69 ans	17	1 499,1	873,0	2 400,4	9	1 386,7	634,8	2 631,7	8	1 649,5	711,3	3 249,5
70 à 74 ans	16	2 318,8	1 326,1	3 765,2	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	6	2 752,3	1 009,2	5 990,8	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	87	262,7	207,5	317,9	40	236,4	168,9	321,9	47	290,3	213,3	386,0
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	10	331,9	159,3	610,4	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	8	321,2	138,5	632,7	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	13	712,7	379,4	1 218,8	7	697,2	279,9	1 436,3	6	731,7	268,3	1 592,7
65 à 69 ans	14	1 417,0	774,3	2 377,5	8	1 441,4	621,6	2 839,6	6	1 385,7	508,1	3 016,2
70 à 74 ans	9	1 363,6	624,2	2 587,9	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-13

Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Territoires du Nord-Ouest

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	128	293,1	242,3	343,9	66	292,0	221,6	362,5	62	294,2	221,0	367,4
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	10	590,0	283,2	1 085,0
50 à 54 ans	13	425,3	226,4	727,2	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	16	645,7	369,2	1 048,4	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	24	1 488,8	954,1	2 215,3	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	19	3 578,2	2 154,4	5 587,6	10	3 773,6	1 811,3	6 939,6	9	3 383,5	1 548,9	6 421,1
75 à 79 ans	11	2 669,9	1 332,5	4 776,7	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	107	244,9	198,5	291,3	53	234,0	171,0	297,1	54	256,5	188,1	324,9
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	20	845,3	516,5	1 305,6	11	842,3	420,4	1 506,9	9	849,1	388,7	1 611,3
60 à 64 ans	15	996,0	557,8	1 642,8	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	15	2 895,8	1 621,6	4 776,1	6	2 222,2	814,8	4 837,0	9	3 629,0	1 661,3	6 887,1
75 à 79 ans	8	2 015,1	869,0	3 969,8	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	6	2 521,0	924,4	5 487,4	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-14
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nunavut

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2009												
Tous les âges	54	167,7	123,0	212,5	31	185,8	126,2	263,8	23	148,3	94,0	222,5
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	6	407,3	149,4	886,6	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	7	635,8	255,2	1 309,7	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	12	1 602,1	827,8	2 798,4	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	7	2 702,7	1 084,9	5 567,6	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2008												
Tous les âges	44	139,3	101,2	187,0	21	128,1	79,3	195,8	23	151,3	95,9	227,0
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	10	947,0	454,5	1 741,5	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	6	868,3	318,4	1 890,0	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	6	2 479,3	909,1	5 396,7	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 2-1

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Canada (Il n'existe à l'heure actuelle aucunes données nationales à déclarer pour 2008 et 2009)

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer
Lèvre (C00.0-C00.9)
Langue (C01.9-C02.9)
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)
Nasopharynx (C11.0-C11.9)
Oropharynx (C10.0-C10.9)
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)
Oesophage (C15.0-C15.9)
Estomac (C16.0-C16.9)
Intestin grêle (C17.0-C17.9)
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)
Anus (C21.0-C21.8)
Foie (C22.0)
Vésicule biliaire (C23.9)
Pancréas (C25.0-C25.9)
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)
Larynx (C32.0-C32.9)
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)
Os et articulations (C40.0-C41.9)
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)
Sein (C50.0-C50.9)
Col utérin (C53.0-C53.9)
Corps utérin (C54.0-C54.9)
Utérus, sans autre indication (C55.9)
Ovaire (C56.9)
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)
Prostate (C61.9)
Testicule (C62.0-C62.9)
Verge (C60.0-C60.9)
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)
Uretere (C66.9)
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)
Oeil (C69.0-C69.9)
Cerveau (C71.0-C71.9)
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)
Thyroïde (C73.9)

Tableau 2-1 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Canada (Il n'existe à l'heure actuelle aucune données nationales à déclarer pour 2008 et 2009)

	Structure démographique du Recensement de 1991												
	Les deux sexes			Hommes			Femmes						
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer		Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure				Limite inférieure	Limite supérieure
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	
Lymphomes non hodgkiniens	
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	
Autres leucémies	
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	
Sarcome de Kaposi (M-9140)	
2008													
Total, tous les sièges primaires de cancer	
Lèvre (C00.0-C00.9)	
Langue (C01.9-C02.9)	
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	
Oropharynx (C10.0-C10.9)	
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	
Oesophage (C15.0-C15.9)	
Estomac (C16.0-C16.9)	
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	
Anus (C21.0-C21.8)	
Foie (C22.0)	
Vésicule biliaire (C23.9)	
Pancréas (C25.0-C25.9)	
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	
Larynx (C32.0-C32.9)	
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	
Os et articulations (C40.0-C41.9)	
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	
Sein (C50.0-C50.9)	
Col utérin (C53.0-C53.9)	
Corps utérin (C54.0-C54.9)	
Utérus, sans autre indication (C55.9)	

Tableau 2-1 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Canada (Il n'existe à l'heure actuelle aucune données nationales à déclarer pour 2008 et 2009)

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Ovaire (C56.9)
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)
Prostate (C61.9)
Testicule (C62.0-C62.9)
Verge (C60.0-C60.9)
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)
Ureètre (C66.9)
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)
Oeil (C69.0-C69.9)
Cerveau (C71.0-C71.9)
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)
Thyroïde (C73.9)
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)
Lymphomes non hodgkiniens
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)
Autres leucémies
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues
Mésotéliome (M-9050-M-9055)
Sarcome de Kaposi (M-9140)

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-2
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	2 900	414,9	399,4	430,4	1 668	503,5	478,8	528,3	1 232	338,7	319,1	358,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	7	1,1	0,5	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	11	1,4	0,8	2,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	6	1,1	0,5	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	15	1,8	1,1	3,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	24	3,3	2,2	4,9	14	4,0	2,4	6,9	10	2,4	1,3	4,9
Estomac (C16.0-C16.9)	93	13,0	10,3	15,6	58	18,0	13,2	22,7	35	8,8	6,5	12,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	456	63,8	57,8	69,7	271	81,1	71,2	91,0	185	48,6	41,5	55,8
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	294	41,5	36,7	46,3	167	51,4	43,5	59,4	127	33,4	27,5	39,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	162	22,3	18,8	25,7	104	29,7	23,8	35,5	58	15,2	11,2	19,2
Anus (C21.0-C21.8)	10	1,5	0,8	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	9	1,4	0,7	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	47	6,5	5,0	8,6	30	8,8	6,3	12,4	17	4,5	2,9	7,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	13	1,7	1,0	3,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	388	54,8	49,3	60,3	246	74,6	65,1	84,1	142	38,3	32,0	44,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	6	1,4	0,6	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	20	3,4	2,2	5,3	8	2,8	1,3	5,6	12	4,0	2,2	7,2
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	79	12,0	9,2	14,7	43	13,5	10,2	18,0	36	10,5	7,7	14,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	8	1,2	0,6	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	316	84,6	75,0	94,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	30	5,3	3,7	7,4	30	10,3	7,2	14,5
Corps utérin (C54.0-C54.9)	69	9,3	7,0	11,5	69	17,8	13,4	22,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	1,1	0,5	2,3	7	2,0	0,9	4,5
Ovaire (C56.9)	30	4,2	3,0	6,0	30	8,0	5,7	11,5
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	13	1,8	1,1	3,2	13	3,4	2,0	6,1
Prostate (C61.9)	497	68,6	62,5	74,7	497	144,0	131,1	156,8
Testicule (C62.0-C62.9)	11	2,6	1,4	4,4	11	5,3	2,9	9,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	127	17,5	14,4	20,6	98	30,4	24,3	36,5	29	7,3	5,1	10,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	127	18,2	14,9	21,4	67	19,6	14,8	24,5	60	16,8	12,5	21,2
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	35	5,4	4,0	7,5	21	6,3	4,2	9,7	14	4,6	2,7	7,8

Tableau 2-2 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	56	9,1	6,6	11,6	20	6,8	4,4	10,4	36	11,4	8,3	15,7
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	21	4,4	2,9	6,6	12	5,0	2,8	8,5	9	3,9	1,9	7,2
Lymphomes non hodgkiniens	124	17,7	14,5	20,8	63	18,9	14,1	23,8	61	16,7	12,5	21,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	29	3,9	2,8	5,7	19	5,4	3,5	8,5	10	2,5	1,4	5,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	13	2,4	1,4	4,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	7	1,0	0,5	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	66	9,3	7,0	11,6	33	10,1	7,3	14,0	33	8,9	6,5	12,5
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	2 712	401,6	386,2	417,1	1 505	470,7	446,4	495,1	1 207	342,5	322,5	362,5
Lèvre (C00.0-C00.9)	6	0,9	0,4	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	19	2,8	1,8	4,4	13	3,7	2,2	6,6	6	2,0	0,8	4,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	13	1,9	1,1	3,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	19	2,8	1,8	4,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	79	11,8	9,2	14,5	55	17,9	13,1	22,7	24	7,1	4,8	10,6
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	461	66,9	60,6	73,1	260	80,5	70,5	90,5	201	54,7	46,9	62,4
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	297	42,8	37,9	47,7	152	47,0	39,4	54,6	145	39,0	32,5	45,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	164	24,1	20,3	27,8	108	33,6	27,1	40,1	56	15,7	11,4	19,9
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	10	1,5	0,8	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	46	6,6	5,1	8,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	22	3,6	2,4	5,5	8	2,6	1,3	5,4	14	4,4	2,5	7,5
Larynx (C32.0-C32.9)	31	4,6	3,3	6,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	332	49,1	43,8	54,5	214	68,1	58,9	77,3	118	33,6	27,4	39,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	13	2,5	1,4	4,3	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-2 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	85	12,7	9,9	15,5	50	15,9	11,3	20,4	35	10,0	7,2	13,8
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	9	1,3	0,7	2,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	340	93,0	82,8	103,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	22	4,0	2,6	6,0	22	7,7	5,0	11,6
Corps utérin (C54.0-C54.9)	76	10,6	8,2	13,0	76	20,6	15,9	25,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	1,0	0,5	2,3	7	2,0	0,9	4,6
Ovaire (C56.9)	26	3,8	2,7	5,6	26	7,4	5,1	10,8
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	448	63,9	57,9	69,9	448	133,9	121,3	146,5
Testicule (C62.0-C62.9)	6	1,1	0,5	2,5	6	2,3	1,0	5,1
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	94	13,5	10,8	16,3	67	21,8	16,5	27,1	27	7,2	5,0	10,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	103	14,5	11,7	17,4	59	17,3	12,8	21,8	44	12,1	9,2	16,1
Ureètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	43	6,3	4,8	8,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	57	10,1	7,3	12,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	8	1,6	0,8	3,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	98	15,2	12,1	18,3	47	15,5	11,9	20,4	51	14,6	10,4	18,7
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	24	3,4	2,3	5,0	10	3,1	1,6	5,8	14	3,6	2,2	6,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	11	2,7	1,5	4,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	19	2,8	1,9	4,5	9	2,9	1,5	5,6	10	2,8	1,5	5,4
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	16	3,0	1,8	4,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	11	1,7	0,9	3,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	84	13,1	10,2	15,9	47	15,7	12,0	20,5	37	10,2	7,6	14,0
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-3

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	805	411,3	382,1	440,4	460	512,7	465,0	560,3	345	327,7	291,6	363,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	11	5,4	3,0	10,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	11	6,4	3,5	11,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	9	4,4	2,3	8,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	107	53,5	43,1	63,9	55	61,0	44,7	77,3	52	46,7	33,3	60,2
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	70	35,2	26,7	43,8	31	36,1	26,0	50,7	39	35,4	26,1	48,7
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	37	18,3	13,6	25,1	24	24,9	17,1	37,4	13	11,3	6,5	20,6
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	24	11,7	8,0	17,5	14	15,1	9,1	25,9	10	8,4	4,4	17,1
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	6	3,0	1,3	7,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	136	69,5	57,7	81,3	79	88,9	69,1	108,6	57	53,3	39,1	67,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	88	86,1	67,3	104,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	6	3,6	1,4	8,4	6	6,9	2,8	16,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	143	71,5	59,7	83,4	143	154,8	129,2	180,4
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	42	20,9	15,9	28,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	20	10,8	7,0	16,9	12	13,8	7,7	25,0	8	7,8	3,8	16,6
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	10	5,2	2,8	10,1	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-3 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	11	7,6	4,1	13,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	25	13,1	9,0	19,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	16	7,8	4,8	13,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	810	430,6	400,2	461,0	434	499,0	451,4	546,7	376	376,5	336,7	416,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	6	3,1	1,3	7,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	11	6,3	3,4	11,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	12	6,0	3,5	11,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	104	54,4	43,8	65,0	52	59,3	43,1	75,5	52	49,6	35,5	63,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	84	43,9	34,4	53,5	38	43,9	32,8	59,5	46	43,3	32,9	57,8
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	20	10,5	6,9	16,2	14	15,4	9,2	26,3	6	6,3	2,7	14,7
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	21	10,9	7,1	16,9	10	12,5	6,5	23,6	11	9,6	5,2	18,7
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	11	6,0	3,3	11,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	119	62,3	51,0	73,6	76	87,9	68,0	107,8	43	39,9	30,2	53,6
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-3 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	28	15,2	10,7	21,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	102	55,5	44,5	66,6	0	0,0	0,0	0,0	102	106,2	84,9	127,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	9	4,8	2,5	9,6	9	9,1	4,6	18,2
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	118	59,6	48,7	70,5	118	131,5	107,5	155,4
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	33	16,4	11,9	23,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	36	19,1	14,1	26,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Uretrère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	27	14,2	9,8	20,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	7	3,7	1,7	8,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	32	15,4	11,1	21,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-4
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 361	408,0	396,8	419,2	2 847	469,1	451,6	486,6	2 514	361,3	346,5	376,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	39	3,0	2,2	4,0	28	4,5	3,2	6,6	11	1,5	0,9	2,9
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	7	0,5	0,3	1,2	7	1,1	0,5	2,5	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	28	2,1	1,5	3,1	17	2,9	1,8	4,6	11	1,4	0,7	2,7
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	9	0,7	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	30	2,2	1,5	3,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	74	5,3	4,1	6,5	58	9,2	6,8	11,6	16	2,0	1,2	3,4
Estomac (C16.0-C16.9)	98	7,5	6,0	9,1	56	9,7	7,1	12,2	42	5,8	4,3	7,8
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	27	2,0	1,4	2,9	11	2,0	1,1	3,6	16	1,9	1,2	3,3
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	729	54,1	50,1	58,1	391	64,1	57,6	70,5	338	46,1	41,0	51,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	468	34,4	31,2	37,6	235	38,3	33,4	43,3	233	31,6	27,4	35,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	261	19,7	17,3	22,2	156	25,7	21,6	29,9	105	14,5	11,6	17,4
Anus (C21.0-C21.8)	19	1,5	1,0	2,4	8	1,3	0,6	2,6	11	1,8	1,0	3,3
Foie (C22.0)	27	1,9	1,4	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	10	0,7	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	131	9,5	7,9	11,2	64	10,4	7,9	13,0	67	9,0	6,7	11,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	43	3,2	2,4	4,3	18	3,0	2,0	4,8	25	3,4	2,3	5,0
Larynx (C32.0-C32.9)	34	2,6	1,9	3,6	25	4,0	2,8	5,9	9	1,4	0,7	2,7
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	822	61,1	56,8	65,3	453	74,2	67,3	81,1	369	50,8	45,5	56,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	10	0,7	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	10	1,0	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	22	1,9	1,2	2,8	16	2,7	1,7	4,5	6	1,2	0,5	2,6
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	251	20,4	17,7	23,0	118	19,8	16,2	23,5	133	21,4	17,5	25,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	15	1,1	0,7	1,9	9	1,5	0,8	3,0	6	0,9	0,4	2,2
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	675	97,8	90,1	105,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	38	3,9	2,8	5,2	38	7,5	5,5	10,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	118	8,7	7,1	10,4	118	16,6	13,5	19,7
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	67	5,1	3,8	6,4	67	9,6	7,2	12,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	31	2,4	1,7	3,4	31	4,5	3,2	6,4
Prostate (C61.9)	718	53,3	49,4	57,3	718	114,6	106,1	123,1
Testicule (C62.0-C62.9)	25	2,8	1,9	4,0	25	5,7	3,8	8,2
Verge (C60.0-C60.9)	9	0,7	0,3	1,3	9	1,4	0,7	2,8
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	256	18,9	16,5	21,2	193	32,1	27,5	36,6	63	8,3	6,2	10,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	184	13,6	11,6	15,6	122	19,6	16,1	23,2	62	8,4	6,3	10,5
Urètre (C66.9)	9	0,7	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	9	0,6	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	67	5,8	4,3	7,3	37	6,6	4,9	9,0	30	5,0	3,5	7,2

Tableau 2-4 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	86	8,1	6,3	9,9	23	4,2	2,8	6,2	63	11,8	8,7	14,9
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	9	0,9	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	36	3,7	2,7	5,0	23	4,6	3,1	6,8	13	2,9	1,7	4,8
Lymphomes non hodgkiniens	192	14,5	12,4	16,6	107	17,8	14,3	21,2	85	11,6	9,1	14,2
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	60	4,3	3,2	5,4	38	6,2	4,6	8,4	22	2,9	1,9	4,5
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	10	1,4	0,7	2,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	38	2,9	2,1	3,9	16	2,4	1,5	4,1	22	3,4	2,3	5,2
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	34	2,5	1,8	3,5	20	3,5	2,3	5,4	14	1,9	1,1	3,3
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	11	1,0	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	12	0,8	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	186	13,3	11,4	15,3	98	16,3	13,0	19,5	88	11,0	8,6	13,4
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	14	1,0	0,6	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 513	428,3	416,7	439,9	2 883	489,3	471,2	507,5	2 630	380,8	365,6	396,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	9	0,6	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	42	3,1	2,4	4,2	30	4,6	3,3	6,5	12	1,7	1,0	3,1
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	10	0,9	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	16	1,1	0,7	1,9	8	1,3	0,7	2,8	8	1,0	0,5	2,2
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	6	0,5	0,2	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	7	0,5	0,3	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	21	1,5	1,0	2,4	15	2,3	1,4	3,9	6	0,9	0,4	2,1
Oesophage (C15.0-C15.9)	57	4,3	3,2	5,5	40	6,6	5,0	8,9	17	2,4	1,5	3,9
Estomac (C16.0-C16.9)	101	7,7	6,2	9,3	65	11,0	8,2	13,7	36	5,1	3,8	7,1
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	18	1,6	1,0	2,5	8	1,6	0,7	3,1	10	1,5	0,8	3,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	800	60,4	56,1	64,6	436	73,6	66,6	80,6	364	49,4	44,1	54,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	576	42,9	39,3	46,5	281	47,6	42,0	53,3	295	39,0	34,4	43,7
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	224	17,5	15,2	19,8	155	25,9	21,8	30,1	69	10,4	7,8	13,0
Anus (C21.0-C21.8)	13	1,1	0,6	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	45	3,3	2,6	4,4	36	6,0	4,4	8,2	9	1,1	0,6	2,4
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	127	9,4	7,8	11,1	64	10,9	8,2	13,6	63	8,2	6,1	10,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	38	2,8	2,0	3,8	24	3,8	2,6	5,7	14	2,0	1,1	3,4
Larynx (C32.0-C32.9)	40	3,1	2,3	4,1	34	5,6	4,1	7,8	6	0,8	0,3	2,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	838	63,9	59,5	68,3	432	73,3	66,3	80,2	406	57,1	51,4	62,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	10	1,1	0,6	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-4 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	28	2,5	1,7	3,5	10	2,0	1,1	3,8	18	2,9	1,8	4,6
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	228	18,4	15,9	20,9	120	20,4	16,7	24,1	108	16,8	13,5	20,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	19	1,4	0,9	2,2	9	1,7	0,8	3,2	10	1,2	0,7	2,5
Sein (C50.0-C50.9)	707	55,2	51,0	59,4	7	1,1	0,5	2,4	700	103,5	95,5	111,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	43	4,2	3,2	5,6	43	8,1	6,1	10,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	107	8,0	6,4	9,5	107	15,2	12,2	18,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	58	4,2	3,1	5,3	58	7,6	5,6	9,7
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	27	2,1	1,4	3,0	27	3,7	2,5	5,5
Prostate (C61.9)	735	56,3	52,2	60,5	735	121,7	112,8	130,6
Testicule (C62.0-C62.9)	25	3,1	2,1	4,4	25	6,3	4,3	9,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	245	18,2	15,9	20,5	182	31,1	26,6	35,6	63	8,3	6,1	10,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	204	15,7	13,5	17,9	123	20,5	16,8	24,1	81	11,4	8,8	14,0
Uretère (C66.9)	11	0,8	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	11	1,1	0,6	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	91	7,6	6,0	9,2	44	8,0	6,0	10,5	47	7,5	5,7	10,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	116	10,4	8,4	12,4	30	5,3	3,8	7,5	86	15,2	11,8	18,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	7	0,7	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	22	2,3	1,6	3,5	10	2,2	1,2	4,0	12	2,5	1,4	4,3
Lymphomes non hodgkiniens	216	16,7	14,4	18,9	102	16,9	13,6	20,3	114	16,3	13,2	19,4
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	68	5,3	4,0	6,5	44	7,5	5,7	9,9	24	3,5	2,4	5,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	40	3,1	2,3	4,2	29	4,7	3,3	6,7	11	1,5	0,8	2,9
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	32	2,6	1,9	3,7	19	3,4	2,2	5,3	13	2,0	1,1	3,6
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	19	1,4	0,9	2,3	13	2,2	1,3	3,9	6	0,7	0,3	1,8
Autres leucémies	17	1,4	0,9	2,3	9	1,8	0,9	3,4	8	1,1	0,6	2,4
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	176	13,1	11,1	15,1	87	15,2	11,9	18,4	89	11,5	9,0	14,1
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	17	1,4	0,9	2,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	6	0,7	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-5
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 394	421,8	409,0	434,6	2 378	490,5	470,4	510,5	2 016	365,0	348,3	381,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	26	2,3	1,6	3,4	17	3,2	2,0	5,2	9	1,5	0,8	3,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	10	0,9	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	8	0,8	0,4	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	7	0,7	0,3	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	8	0,8	0,4	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	27	2,3	1,6	3,3	18	3,2	2,1	5,2	9	1,4	0,7	2,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	57	5,1	3,8	6,5	43	8,1	6,2	10,8	14	2,4	1,4	4,2
Estomac (C16.0-C16.9)	87	8,1	6,4	9,9	52	11,1	8,0	14,2	35	5,9	4,3	8,2
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	19	1,8	1,2	2,8	8	1,7	0,8	3,4	11	1,9	1,1	3,6
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	565	52,7	48,3	57,2	317	65,7	58,4	73,0	248	41,2	35,8	46,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	349	32,3	28,9	35,8	175	36,8	31,2	42,3	174	28,2	23,8	32,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	216	20,4	17,6	23,2	142	28,9	24,1	33,8	74	13,0	9,8	16,1
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	18	1,7	1,1	2,7	10	2,0	1,1	3,8	8	1,4	0,7	3,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	113	10,2	8,3	12,2	53	10,8	7,9	13,8	60	9,7	7,2	12,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	29	2,7	1,9	3,9	16	3,4	2,1	5,5	13	2,2	1,3	3,9
Larynx (C32.0-C32.9)	29	2,6	1,9	3,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	685	65,0	60,1	70,0	393	82,2	74,0	90,5	292	51,2	45,2	57,3
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	6	0,6	0,2	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	7	0,9	0,4	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	15	1,6	1,0	2,7	8	1,8	0,9	3,7	7	1,3	0,6	2,8
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	161	16,6	13,9	19,3	71	15,3	11,6	18,9	90	18,3	14,2	22,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	9	0,8	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	527	96,5	88,0	105,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	23	3,0	2,0	4,5	23	5,9	3,9	8,8
Corps utérin (C54.0-C54.9)	99	8,9	7,2	10,7	99	17,1	13,7	20,5
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	53	5,0	3,6	6,4	53	9,5	6,8	12,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	19	1,6	1,1	2,6	19	3,0	1,9	4,8
Prostate (C61.9)	709	67,0	62,0	72,0	709	140,5	130,1	151,0
Testicule (C62.0-C62.9)	19	3,1	2,0	4,6	19	6,2	4,0	9,2
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	220	20,2	17,5	23,0	169	35,3	29,9	40,7	51	8,2	5,8	10,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	138	13,3	11,0	15,5	75	15,3	11,8	18,8	63	11,5	8,6	14,4
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	66	7,2	5,3	9,0	39	9,1	6,7	12,2	27	5,4	3,7	7,9

Tableau 2-5 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	122	13,7	11,1	16,3	26	6,1	4,2	8,9	96	21,0	16,5	25,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	12	1,5	0,9	2,6	6	1,6	0,7	3,4	6	1,6	0,7	3,5
Lymphomes non hodgkiniens	185	17,8	15,2	20,5	103	20,7	16,6	24,8	82	15,2	11,7	18,6
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	56	5,1	3,7	6,4	27	5,4	3,8	7,8	29	4,7	3,3	6,8
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	14	2,0	1,2	3,3	7	2,0	0,9	4,0	7	2,0	0,9	4,1
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	41	3,9	2,9	5,2	25	5,2	3,6	7,5	16	2,9	1,8	4,8
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	25	2,4	1,6	3,6	14	3,0	1,8	5,1	11	1,9	1,0	3,6
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	9	1,0	0,5	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	117	10,8	8,8	12,8	58	12,0	8,9	15,1	59	10,3	7,5	13,1
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	12	1,1	0,6	2,0	12	2,5	1,4	4,4	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 488	441,1	427,9	454,4	2 526	539,4	518,1	560,8	1 962	360,6	344,0	377,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	11	1,1	0,6	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	6	0,6	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	12	1,1	0,6	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	6	0,6	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	23	2,1	1,5	3,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	46	4,4	3,4	5,8	36	7,8	5,8	10,6	10	1,6	0,8	3,1
Estomac (C16.0-C16.9)	67	6,1	4,6	7,6	46	9,7	7,5	12,7	21	3,5	2,3	5,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	15	1,6	1,0	2,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	537	50,5	46,2	54,9	304	64,6	57,2	71,9	233	39,3	34,1	44,6
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	339	32,0	28,6	35,5	175	37,9	32,2	43,6	164	27,5	23,2	31,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	198	18,5	15,8	21,1	129	26,7	22,0	31,3	69	11,8	8,9	14,7
Anus (C21.0-C21.8)	15	1,4	0,8	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	18	1,8	1,1	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	109	10,1	8,2	12,0	55	11,6	8,5	14,7	54	9,1	6,6	11,6
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	35	3,2	2,3	4,4	16	3,4	2,1	5,4	19	3,2	2,0	5,1
Larynx (C32.0-C32.9)	29	2,7	1,9	3,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	723	70,1	64,9	75,3	400	85,6	77,1	94,1	323	57,9	51,4	64,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	7	0,9	0,4	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	11	1,1	0,6	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-5 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	17	2,2	1,3	3,4	9	2,3	1,1	4,3	8	2,1	1,0	4,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	160	16,2	13,6	18,8	78	16,6	12,8	20,3	82	16,2	12,5	19,9
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	10	1,1	0,6	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	504	93,5	85,1	101,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	35	3,8	2,8	5,3	35	7,4	5,4	10,3
Corps utérin (C54.0-C54.9)	97	9,4	7,5	11,3	97	18,0	14,3	21,7
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	54	5,4	3,9	6,8	54	10,1	7,3	12,9
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	11	1,0	0,5	1,8	11	1,8	1,0	3,4
Prostate (C61.9)	825	80,4	74,9	86,0	825	170,8	159,0	182,6
Testicule (C62.0-C62.9)	23	3,7	2,5	5,4	23	7,5	5,0	10,8
Verge (C60.0-C60.9)	11	1,2	0,6	2,1	11	2,5	1,4	4,5
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	197	18,9	16,2	21,6	146	31,1	26,0	36,2	51	8,9	6,3	11,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	155	15,8	13,2	18,3	96	20,7	16,5	24,9	59	11,4	8,4	14,4
Utrère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	7	0,7	0,3	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	57	5,9	4,3	7,5	29	6,3	4,4	8,9	28	5,7	3,9	8,2
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	119	13,0	10,5	15,5	33	7,3	5,2	10,1	86	18,6	14,4	22,7
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	12	1,8	1,0	3,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	173	17,4	14,8	20,1	90	19,8	15,6	24,0	83	15,3	11,9	18,8
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	55	5,1	3,7	6,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	10	1,7	0,9	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	47	4,4	3,4	5,8	30	6,2	4,5	8,8	17	2,7	1,6	4,5
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	24	2,5	1,7	3,7	10	2,1	1,1	3,9	14	3,1	1,8	5,3
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	12	1,1	0,6	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	18	1,9	1,2	3,0	9	2,3	1,2	4,3	9	1,6	0,8	3,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	124	11,9	9,8	14,1	66	14,8	11,2	18,4	58	9,3	6,8	11,9
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	12	1,2	0,7	2,1	12	2,6	1,5	4,6	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-6

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Québec¹ (Il n'existe à l'heure actuelle aucunes données à déclarer pour le Québec pour 2008 et 2009)

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes			Hommes				Femmes				
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer
Lèvre (C00.0-C00.9)
Langue (C01.9-C02.9)
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)
Nasopharynx (C11.0-C11.9)
Oropharynx (C10.0-C10.9)
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)
Oesophage (C15.0-C15.9)
Estomac (C16.0-C16.9)
Intestin grêle (C17.0-C17.9)
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)
Anus (C21.0-C21.8)
Foie (C22.0)
Vésicule biliaire (C23.9)
Pancréas (C25.0-C25.9)
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)
Larynx (C32.0-C32.9)
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)
Os et articulations (C40.0-C41.9)
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)
Sein (C50.0-C50.9)
Col utérin (C53.0-C53.9)
Corps utérin (C54.0-C54.9)
Utérus, sans autre indication (C55.9)
Ovaire (C56.9)
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)
Prostate (C61.9)
Testicule (C62.0-C62.9)
Verge (C60.0-C60.9)
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)
Uretere (C66.9)
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)
Oeil (C69.0-C69.9)
Cerveau (C71.0-C71.9)

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Québec¹ (Il n'existe à l'heure actuelle aucune données à déclarer pour le Québec pour 2008 et 2009)

	Structure démographique du Recensement de 1991									
	Les deux sexes			Hommes			Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 % Limite inférieure Limite supérieure	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 % Limite inférieure Limite supérieure	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 % Limite inférieure Limite supérieure	
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)
Thyroïde (C73.9)
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)
Lymphomes non hodgkiniens
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)
Autres leucémies
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues
Mésotéliome (M-9050-M-9055)
Sarcome de Kaposi (M-9140)
2008										
Total, tous les sièges primaires de cancer
Lèvre (C00.0-C00.9)
Langue (C01.9-C02.9)
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)
Nasopharynx (C11.0-C11.9)
Oropharynx (C10.0-C10.9)
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)
Oesophage (C15.0-C15.9)
Estomac (C16.0-C16.9)
Intestin grêle (C17.0-C17.9)
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)
Anus (C21.0-C21.8)
Foie (C22.0)
Vésicule biliaire (C23.9)
Pancréas (C25.0-C25.9)
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)
Larynx (C32.0-C32.9)
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)
Os et articulations (C40.0-C41.9)
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Québec¹ (Il n'existe à l'heure actuelle aucune données à déclarer pour le Québec pour 2008 et 2009)

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes			Hommes				Femmes				
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	
Sein (C50.0-C50.9)	
Col utérin (C53.0-C53.9)	
Corps utérin (C54.0-C54.9)	
Utérus, sans autre indication (C55.9)	
Ovaire (C56.9)	
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	
Prostate (C61.9)	
Testicule (C62.0-C62.9)	
Verge (C60.0-C60.9)	
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	
Rein et bassin du rein (C64.9, C65.9)	
Urètre (C66.9)	
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	
Oeil (C69.0-C69.9)	
Cerveau (C71.0-C71.9)	
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	
Thyroïde (C73.9)	
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	
Lymphomes non hodgkiniens	
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	
Autres leucémies	
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	
Sarcome de Kaposi (M-9140)	

1. Pour aider à l'interprétation des résultats, il est important de souligner que les cancers déclarés au Fichier des tumeurs du Québec (FiTQ) sont ceux ayant fait l'objet d'une hospitalisation ou d'une chirurgie d'un jour. Certains cancers ne sont donc pas déclarés au FiTQ s'ils sont diagnostiqués et traités uniquement sur une base externe ou ambulatoire, ou encore ils sont déclarés à un stade plus avancé de la maladie qui requiert une hospitalisation. Une étude d'exhaustivité produite en 2003 évalue entre autres que plus du tiers des cancers de la prostate et des mélanomes ne sont pas déclarés au FiTQ en raison de notre source de déclaration. Globalement, 90 % des cas de cancer confirmés par histopathologie seraient déclarés au FiTQ.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-7
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	64 874	404,1	400,9	407,2	32 572	439,9	435,1	444,8	32 302	379,2	374,9	383,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	113	0,7	0,6	0,8	79	1,1	0,8	1,3	34	0,4	0,3	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	393	2,4	2,1	2,6	262	3,3	2,9	3,7	131	1,5	1,2	1,8
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	214	1,3	1,2	1,5	120	1,6	1,3	1,9	94	1,1	0,9	1,4
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	90	0,5	0,4	0,7	58	0,7	0,5	0,9	32	0,4	0,3	0,5
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	206	1,3	1,1	1,4	105	1,4	1,1	1,7	101	1,2	0,9	1,4
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	98	0,6	0,5	0,8	64	0,9	0,7	1,1	34	0,4	0,3	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	72	0,4	0,3	0,5	49	0,6	0,5	0,8	23	0,2	0,2	0,4
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	82	0,5	0,4	0,6	74	1,0	0,7	1,2	8	0,1	0,0	0,2
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	232	1,4	1,2	1,6	171	2,1	1,8	2,4	61	0,7	0,5	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	716	4,3	4,0	4,6	528	7,0	6,4	7,6	188	2,0	1,7	2,3
Estomac (C16.0-C16.9)	1 180	7,2	6,7	7,6	748	10,1	9,3	10,8	432	4,8	4,3	5,2
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	268	1,6	1,4	1,8	158	2,1	1,7	2,4	110	1,2	1,0	1,5
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	7 725	46,8	45,7	47,8	4 166	56,0	54,3	57,7	3 559	39,0	37,7	40,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	5 342	32,2	31,3	33,1	2 720	36,8	35,4	38,2	2 622	28,5	27,4	29,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	2 383	14,5	13,9	15,1	1 446	19,2	18,2	20,2	937	10,5	9,8	11,1
Anus (C21.0-C21.8)	251	1,5	1,3	1,7	99	1,3	1,0	1,5	152	1,7	1,4	1,9
Foie (C22.0)	659	4,0	3,7	4,4	531	6,9	6,3	7,5	128	1,5	1,2	1,8
Vésicule biliaire (C23.9)	172	1,0	0,9	1,2	51	0,7	0,5	0,9	121	1,3	1,1	1,6
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 378	8,3	7,8	8,7	661	8,8	8,1	9,5	717	7,8	7,2	8,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	664	4,0	3,7	4,3	332	4,5	4,0	4,9	332	3,7	3,3	4,1
Larynx (C32.0-C32.9)	369	2,3	2,0	2,5	310	4,1	3,7	4,6	59	0,7	0,5	0,8
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	7 873	48,3	47,2	49,4	4 127	55,9	54,2	57,7	3 746	42,5	41,1	43,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	148	0,9	0,8	1,1	84	1,2	0,9	1,4	64	0,7	0,5	0,9
Os et articulations (C40.0-C41.9)	145	1,0	0,9	1,2	75	1,1	0,8	1,3	70	1,0	0,7	1,2
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	481	3,2	2,9	3,5	265	3,6	3,2	4,1	216	2,8	2,4	3,2
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	2 519	16,1	15,4	16,7	1 369	18,5	17,5	19,5	1 150	14,3	13,5	15,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	9 078	55,9	54,8	57,1	82	1,1	0,9	1,3	8 996	105,9	103,7	108,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	619	4,5	4,1	4,8	619	8,8	8,0	9,5
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 996	12,2	11,6	12,7	1 996	23,2	22,2	24,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	41	0,2	0,2	0,3	41	0,5	0,3	0,6
Ovaire (C56.9)	1 029	6,4	6,0	6,8	1 029	12,2	11,5	13,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	471	2,9	2,7	3,2	471	5,5	5,0	6,0
Prostate (C61.9)	8 975	55,9	54,7	57,0	8 975	120,1	117,6	122,6
Testicule (C62.0-C62.9)	351	2,9	2,6	3,2	351	5,8	5,2	6,5
Verge (C60.0-C60.9)	54	0,3	0,2	0,4	54	0,7	0,5	0,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	31	0,2	0,1	0,3	31	0,4	0,3	0,6
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	2 007	12,0	11,5	12,5	1 520	20,6	19,5	21,6	487	5,1	4,6	5,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 745	10,8	10,3	11,3	1 020	13,4	12,5	14,2	725	8,4	7,8	9,1
Uretere (C66.9)	83	0,5	0,4	0,6	48	0,7	0,5	0,9	35	0,4	0,3	0,5
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	231	1,4	1,2	1,6	163	2,2	1,9	2,6	68	0,7	0,5	0,9
Oeil (C69.0-C69.9)	147	1,0	0,8	1,1	77	1,1	0,9	1,4	70	0,9	0,6	1,1
Cerveau (C71.0-C71.9)	1 007	6,8	6,4	7,2	580	8,2	7,5	8,8	427	5,5	5,0	6,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	51	0,4	0,3	0,5	23	0,4	0,2	0,5	28	0,4	0,3	0,6
Thyroïde (C73.9)	2 495	17,5	16,8	18,2	537	7,5	6,9	8,2	1 958	27,2	26,0	28,4
Autre endocrinienne (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	141	1,0	0,8	1,1	70	1,0	0,8	1,2	71	0,9	0,7	1,2
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	336	2,6	2,3	2,9	167	2,6	2,2	3,0	169	2,6	2,2	3,0
Lymphomes non hodgkiniens	2 818	17,5	16,9	18,2	1 521	20,5	19,4	21,5	1 297	14,9	14,1	15,8
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	843	5,1	4,8	5,5	480	6,4	5,9	7,0	363	3,9	3,5	4,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	132	1,1	0,9	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	919	5,5	5,2	5,9	561	7,5	6,9	8,2	358	3,8	3,4	4,3
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	486	3,1	2,8	3,4	251	3,5	3,1	4,0	235	2,8	2,4	3,2
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	193	1,3	1,1	1,4	108	1,5	1,2	1,8	85	1,0	0,8	1,2
Autres leucémies	321	2,1	1,8	2,3	173	2,4	2,1	2,8	148	1,8	1,5	2,1
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 046	12,2	11,7	12,8	1 071	14,5	13,6	15,3	975	10,4	9,7	11,1
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	167	1,0	0,9	1,2	141	1,9	1,6	2,2	26	0,3	0,2	0,4
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	61 612	392,6	389,4	395,8	31 694	440,3	435,4	445,2	29 918	358,0	353,8	362,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	126	0,8	0,6	0,9	89	1,2	0,9	1,5	37	0,4	0,3	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	363	2,3	2,0	2,5	240	3,2	2,8	3,6	123	1,4	1,2	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	197	1,2	1,1	1,4	104	1,4	1,1	1,7	93	1,1	0,9	1,4
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	86	0,5	0,4	0,7	58	0,8	0,6	1,0	28	0,3	0,2	0,5
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	176	1,1	0,9	1,3	100	1,3	1,1	1,6	76	0,9	0,7	1,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	115	0,7	0,6	0,9	77	1,0	0,8	1,3	38	0,5	0,3	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	60	0,4	0,3	0,5	45	0,6	0,4	0,8	15	0,2	0,1	0,3
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	90	0,6	0,5	0,7	66	0,9	0,7	1,1	24	0,3	0,2	0,4
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	205	1,3	1,1	1,4	157	2,0	1,7	2,3	48	0,5	0,4	0,7
Oesophage (C15.0-C15.9)	638	4,0	3,7	4,3	495	6,8	6,2	7,4	143	1,5	1,3	1,8
Estomac (C16.0-C16.9)	1 130	7,0	6,6	7,4	691	9,5	8,8	10,2	439	4,9	4,5	5,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	270	1,7	1,5	1,9	140	1,9	1,6	2,2	130	1,6	1,3	1,9
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	7 763	48,3	47,2	49,4	4 254	58,9	57,1	60,7	3 509	39,1	37,8	40,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	5 343	33,2	32,3	34,1	2 748	38,3	36,8	39,7	2 595	28,8	27,7	30,0
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	2 420	15,1	14,5	15,7	1 506	20,6	19,6	21,7	914	10,3	9,6	11,0
Anus (C21.0-C21.8)	241	1,5	1,3	1,7	114	1,5	1,2	1,8	127	1,5	1,2	1,8
Foie (C22.0)	572	3,6	3,3	3,9	431	5,8	5,2	6,3	141	1,7	1,4	2,0
Vésicule biliaire (C23.9)	169	1,0	0,9	1,2	54	0,7	0,5	0,9	115	1,3	1,1	1,5
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 338	8,3	7,9	8,8	663	9,1	8,4	9,8	675	7,6	7,0	8,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	641	4,0	3,7	4,3	354	4,9	4,4	5,4	287	3,3	2,9	3,6
Larynx (C32.0-C32.9)	376	2,4	2,1	2,6	313	4,2	3,8	4,7	63	0,7	0,5	0,9
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	7 561	47,7	46,6	48,8	3 941	55,0	53,2	56,7	3 620	42,2	40,8	43,6
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	132	0,9	0,7	1,0	80	1,1	0,9	1,4	52	0,6	0,4	0,8
Os et articulations (C40.0-C41.9)	104	0,8	0,6	0,9	54	0,8	0,6	1,0	50	0,7	0,5	0,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	512	3,5	3,1	3,8	297	4,2	3,7	4,7	215	2,8	2,4	3,2
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	2 285	15,0	14,3	15,6	1 245	17,5	16,5	18,5	1 040	13,0	12,1	13,8
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	8 047	50,5	49,4	51,7	60	0,8	0,6	1,0	7 987	95,8	93,7	98,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	536	3,8	3,5	4,1	536	7,4	6,8	8,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 790	11,2	10,6	11,7	1 790	21,3	20,3	22,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	26	0,2	0,1	0,2	26	0,3	0,2	0,4
Ovaire (C56.9)	998	6,4	5,9	6,8	998	12,0	11,3	12,8
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	400	2,5	2,3	2,8	400	4,7	4,3	5,2
Prostate (C61.9)	8 821	56,3	55,1	57,5	8 821	121,4	118,8	124,0
Testicule (C62.0-C62.9)	370	3,1	2,8	3,4	370	6,3	5,6	6,9
Verge (C60.0-C60.9)	42	0,3	0,2	0,3	42	0,6	0,4	0,8
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	33	0,2	0,1	0,3	33	0,5	0,3	0,6
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 834	11,3	10,8	11,8	1 403	19,7	18,6	20,7	431	4,7	4,3	5,2
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 736	11,0	10,5	11,5	1 059	14,3	13,4	15,1	677	8,1	7,5	8,7
Urètre (C66.9)	64	0,4	0,3	0,5	34	0,5	0,4	0,7	30	0,3	0,2	0,5
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	221	1,4	1,2	1,5	167	2,3	2,0	2,7	54	0,6	0,5	0,8
Oeil (C69.0-C69.9)	120	0,8	0,7	1,0	61	0,9	0,6	1,1	59	0,8	0,6	1,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	942	6,5	6,1	6,9	542	7,9	7,2	8,5	400	5,3	4,7	5,8
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	59	0,4	0,3	0,6	28	0,4	0,3	0,6	31	0,4	0,3	0,6
Thyroïde (C73.9)	2 301	16,1	15,4	16,8	473	6,6	6,0	7,2	1 828	25,3	24,1	26,5
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	120	0,8	0,7	1,0	60	0,9	0,6	1,1	60	0,8	0,6	1,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	386	3,0	2,7	3,3	204	3,2	2,7	3,6	182	2,9	2,5	3,4
Lymphomes non hodgkiniens	2 702	17,3	16,6	17,9	1 494	20,8	19,7	21,9	1 208	14,4	13,6	15,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	788	4,9	4,5	5,2	443	6,1	5,5	6,7	345	3,8	3,4	4,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	157	1,3	1,1	1,5	89	1,5	1,2	1,8	68	1,2	0,9	1,5
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	840	5,2	4,9	5,6	504	7,0	6,4	7,6	336	3,7	3,3	4,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	402	2,7	2,4	2,9	209	3,0	2,6	3,4	193	2,5	2,1	2,8
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	195	1,3	1,1	1,4	109	1,6	1,3	1,9	86	1,0	0,8	1,2
Autres leucémies	318	2,0	1,8	2,3	183	2,5	2,2	2,9	135	1,6	1,3	1,9
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 013	12,2	11,7	12,7	1 080	15,1	14,1	16,0	933	10,0	9,4	10,7
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	184	1,2	1,0	1,3	151	2,1	1,8	2,5	33	0,4	0,3	0,5
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer. Les cancers cutanés sans mélanome ne sont pas répertoriés en Ontario. Les sarcomes de Kaposi sont considérablement sous-estimés.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

**Tableau 2-8
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Manitoba**

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	6 021	400,6	390,2	411,0	3 010	439,0	423,1	454,9	3 011	375,8	361,8	389,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	42	2,5	1,9	3,4	31	4,3	3,1	6,0	11	1,1	0,6	2,2
Langue (C01.9-C02.9)	28	1,8	1,3	2,5	21	2,9	2,0	4,4	7	0,8	0,3	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	15	1,1	0,7	1,8	7	1,0	0,5	2,1	8	1,2	0,6	2,3
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	8	0,5	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	26	1,6	1,1	2,4	17	2,3	1,5	3,7	9	1,0	0,5	2,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	8	0,5	0,3	1,0	8	1,1	0,5	2,1	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	13	0,9	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	22	1,3	0,9	2,0	15	1,9	1,2	3,1	7	0,8	0,4	1,8
Oesophage (C15.0-C15.9)	59	3,8	2,8	4,8	40	5,8	4,4	7,7	19	1,9	1,2	3,1
Estomac (C16.0-C16.9)	114	7,8	6,3	9,3	77	11,5	8,9	14,1	37	4,6	3,4	6,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	37	2,4	1,8	3,3	22	3,2	2,1	4,7	15	1,8	1,1	3,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	858	54,9	51,1	58,7	478	69,0	62,7	75,3	380	43,2	38,6	47,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	547	34,6	31,6	37,6	282	41,0	36,2	45,9	265	29,5	25,8	33,2
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	311	20,3	18,0	22,6	196	28,0	24,0	31,9	115	13,7	11,1	16,3
Anus (C21.0-C21.8)	19	1,2	0,8	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	40	2,4	1,8	3,2	27	3,7	2,6	5,3	13	1,3	0,7	2,3
Vésicule biliaire (C23.9)	20	1,2	0,8	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	135	8,5	7,0	10,0	66	9,1	6,9	11,3	69	7,9	5,9	9,9
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	57	3,7	2,7	4,7	20	2,9	1,9	4,4	37	4,5	3,3	6,1
Larynx (C32.0-C32.9)	29	1,9	1,4	2,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	841	55,1	51,3	59,0	417	60,6	54,7	66,5	424	52,7	47,5	57,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	8	0,6	0,3	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	6	0,4	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	32	2,5	1,8	3,5	18	2,9	1,8	4,4	14	2,2	1,3	3,6
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	147	9,8	8,2	11,5	78	10,8	8,4	13,3	69	9,1	6,9	11,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	20	1,2	0,8	1,8	11	1,6	0,9	2,7	9	1,0	0,5	2,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	786	100,2	92,9	107,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	51	4,0	2,8	5,1	51	7,9	5,7	10,2
Corps utérin (C54.0-C54.9)	208	14,2	12,2	16,1	208	27,2	23,4	31,0
Utérus, sans autre indication (C55.9)	8	0,5	0,2	1,0	8	0,9	0,4	1,8
Ovaire (C56.9)	89	5,9	4,7	7,2	89	11,3	8,9	13,8
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	33	2,3	1,6	3,2	33	4,3	3,1	6,0
Prostate (C61.9)	718	48,7	45,1	52,3	718	104,9	97,1	112,6
Testicule (C62.0-C62.9)	34	3,2	2,3	4,3	34	6,2	4,6	8,4
Verge (C60.0-C60.9)	6	0,4	0,2	0,9	6	0,9	0,4	2,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	261	16,5	14,4	18,6	189	26,9	23,1	30,8	72	8,3	6,3	10,3
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	198	13,3	11,4	15,2	128	18,5	15,3	21,8	70	8,8	6,6	10,9
Urètre (C66.9)	9	0,5	0,3	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	6	0,4	0,1	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	7	0,4	0,2	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	70	5,2	4,0	6,5	34	5,2	3,8	7,1	36	5,4	4,0	7,3

Tableau 2-8 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Manitoba

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	113	8,6	6,9	10,2	29	4,6	3,2	6,4	84	12,5	9,7	15,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	6	0,5	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	34	3,1	2,2	4,1	22	4,0	2,7	5,9	12	2,1	1,2	3,6
Lymphomes non hodgkiniens	248	16,8	14,6	19,0	117	17,0	13,9	20,2	131	16,7	13,7	19,7
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	65	4,1	3,1	5,2	41	5,9	4,5	7,8	24	2,7	1,8	4,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	19	1,6	1,1	2,5	8	1,3	0,7	2,5	11	1,9	1,1	3,3
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	103	6,7	5,4	8,1	64	9,3	7,0	11,6	39	4,5	3,3	6,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	38	2,6	1,9	3,5	30	4,5	3,2	6,3	8	0,9	0,4	1,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	27	2,0	1,4	2,9	14	2,3	1,4	3,8	13	1,7	1,0	2,9
Autres leucémies	19	1,2	0,8	1,9	10	1,5	0,8	2,6	9	1,1	0,5	2,1
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	247	15,1	13,2	17,1	112	16,2	13,2	19,3	135	14,4	11,8	17,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	16	1,2	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 892	397,5	387,1	408,0	2 954	440,1	424,0	456,2	2 938	367,9	353,9	381,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	45	3,1	2,3	4,0	35	5,3	3,9	7,2	10	1,0	0,5	2,0
Langue (C01.9-C02.9)	21	1,5	1,0	2,3	15	2,1	1,3	3,4	6	1,0	0,4	2,1
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	10	0,8	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	12	0,9	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	21	1,4	1,0	2,2	12	1,7	1,0	2,9	9	1,2	0,6	2,3
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	8	0,6	0,3	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	12	0,8	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	14	1,0	0,6	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	50	3,3	2,3	4,2	36	5,1	3,8	6,9	14	1,8	1,0	3,0
Estomac (C16.0-C16.9)	115	7,3	6,0	8,7	85	12,4	9,7	15,0	30	3,1	2,2	4,5
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	34	2,3	1,7	3,1	15	2,2	1,3	3,5	19	2,4	1,6	3,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	828	53,9	50,1	57,6	459	67,7	61,4	74,0	369	42,6	38,0	47,2
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	524	33,7	30,8	36,7	277	40,7	35,8	45,5	247	28,4	24,7	32,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	304	20,1	17,8	22,5	182	27,0	23,0	31,0	122	14,2	11,6	16,9
Anus (C21.0-C21.8)	12	0,8	0,4	1,4	6	0,9	0,4	1,9	6	0,7	0,3	1,6
Foie (C22.0)	54	3,6	2,7	4,6	35	5,2	3,8	7,0	19	2,2	1,4	3,5
Vésicule biliaire (C23.9)	18	1,2	0,8	1,9	6	0,9	0,4	2,0	12	1,5	0,8	2,6
Pancréas (C25.0-C25.9)	150	9,3	7,8	10,8	60	8,6	6,4	10,8	90	9,7	7,6	11,8
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	54	3,4	2,5	4,4	33	4,8	3,5	6,6	21	2,3	1,5	3,6
Larynx (C32.0-C32.9)	31	2,2	1,6	3,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	859	57,5	53,6	61,4	445	66,7	60,4	73,0	414	50,6	45,5	55,6
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	11	0,7	0,4	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	9	0,7	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-8 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Manitoba

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	23	1,9	1,3	2,7	14	2,4	1,4	3,8	9	1,4	0,7	2,6
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	162	10,9	9,2	12,6	80	11,4	8,9	14,0	82	10,7	8,2	13,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	19	1,3	0,9	2,0	10	1,7	0,9	2,9	9	1,0	0,5	2,0
Sein (C50.0-C50.9)	778	52,0	48,3	55,8	6	0,9	0,4	2,0	772	98,6	91,3	105,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	51	4,3	3,1	5,6	51	8,6	6,1	11,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	190	12,5	10,7	14,4	190	24,1	20,6	27,6
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	0,5	0,2	1,1	7	1,0	0,5	2,1
Ovaire (C56.9)	88	6,1	4,8	7,4	88	11,6	9,1	14,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	32	2,0	1,4	2,7	32	3,6	2,6	5,1
Prostate (C61.9)	610	41,9	38,5	45,3	610	90,8	83,5	98,1
Testicule (C62.0-C62.9)	36	3,6	2,6	4,8	36	7,1	5,2	9,4
Verge (C60.0-C60.9)	12	0,9	0,5	1,5	12	1,8	1,1	3,1
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	264	17,0	14,9	19,1	202	29,9	25,7	34,0	62	6,9	5,1	8,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	199	13,5	11,6	15,4	124	18,1	14,9	21,3	75	9,3	7,1	11,5
Uretère (C66.9)	8	0,4	0,2	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	8	0,6	0,3	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	70	5,3	4,0	6,5	38	5,9	4,4	7,9	32	4,5	3,2	6,3
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	134	10,9	9,0	12,9	31	5,0	3,6	6,9	103	17,0	13,6	20,4
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	25	2,1	1,5	3,1	15	2,5	1,5	4,0	10	1,8	0,9	3,2
Lymphomes non hodgkiniens	255	17,2	15,1	19,4	139	20,3	16,9	23,8	116	14,7	11,8	17,5
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	55	3,5	2,6	4,5	32	4,8	3,5	6,5	23	2,6	1,7	3,9
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	13	1,1	0,6	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	100	6,7	5,3	8,0	62	9,1	6,8	11,4	38	4,5	3,3	6,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	44	3,1	2,3	4,1	22	3,2	2,2	4,8	22	3,1	2,0	4,6
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	20	1,5	1,0	2,2	11	1,7	1,0	3,0	9	1,2	0,6	2,4
Autres leucémies	25	1,7	1,2	2,4	15	2,2	1,4	3,6	10	1,3	0,7	2,4
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	263	16,5	14,4	18,5	137	20,1	16,7	23,5	126	13,7	11,2	16,3
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	16	1,1	0,7	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-9

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 101	391,6	380,5	402,7	2 670	438,6	421,6	455,5	2 431	354,1	339,3	368,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	14	0,9	0,5	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	30	2,4	1,7	3,4	21	3,5	2,3	5,3	9	1,4	0,7	2,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	13	1,1	0,6	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	6	0,4	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	14	1,0	0,6	1,7	7	1,1	0,5	2,3	7	1,0	0,4	2,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	6	0,5	0,2	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	23	1,8	1,2	2,7	16	2,6	1,6	4,1	7	1,1	0,5	2,3
Oesophage (C15.0-C15.9)	53	4,0	2,9	5,1	40	6,5	4,9	8,6	13	1,8	1,0	3,1
Estomac (C16.0-C16.9)	93	7,1	5,6	8,6	65	10,8	8,1	13,5	28	3,7	2,6	5,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	26	1,8	1,3	2,7	13	1,9	1,1	3,3	13	1,8	1,1	3,2
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	677	49,4	45,6	53,3	368	58,8	52,7	64,9	309	41,4	36,5	46,2
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	431	31,2	28,2	34,3	223	35,7	30,9	40,5	208	27,3	23,4	31,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	246	18,2	15,9	20,6	145	23,1	19,2	26,9	101	14,0	11,2	16,9
Anus (C21.0-C21.8)	8	0,7	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	38	2,8	2,1	3,8	28	4,5	3,2	6,3	10	1,3	0,7	2,5
Vésicule biliaire (C23.9)	12	0,9	0,5	1,6	0	0,0	0,0	0,0	12	1,7	1,0	3,1
Pancréas (C25.0-C25.9)	117	8,4	6,8	10,0	61	9,5	7,1	11,9	56	7,5	5,5	9,6
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	51	3,8	2,8	4,9	25	4,1	2,8	5,9	26	3,6	2,5	5,3
Larynx (C32.0-C32.9)	30	2,3	1,7	3,3	24	4,0	2,7	5,8	6	0,8	0,3	2,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	662	49,9	46,0	53,8	342	55,5	49,6	61,5	320	45,7	40,5	50,9
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	8	0,7	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	27	2,4	1,6	3,4	16	3,0	1,9	4,8	11	1,7	0,9	3,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	156	12,4	10,4	14,4	81	13,3	10,4	16,3	75	11,9	9,0	14,7
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	18	1,5	0,9	2,3	11	1,8	1,0	3,2	7	1,3	0,6	2,6
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	688	102,0	94,0	110,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	41	4,3	3,2	5,7	41	8,6	6,4	11,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	122	9,8	8,1	11,6	122	19,2	15,7	22,7
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	66	4,8	3,6	6,0	66	9,2	6,8	11,5
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	24	1,7	1,1	2,5	24	3,2	2,1	4,8
Prostate (C61.9)	723	56,3	52,1	60,4	723	118,9	110,1	127,6
Testicule (C62.0-C62.9)	35	4,1	3,0	5,5	35	8,1	5,9	10,9
Verge (C60.0-C60.9)	10	0,7	0,4	1,4	10	1,6	0,8	2,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	272	19,5	17,1	21,9	205	32,5	28,0	37,0	67	8,6	6,5	10,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	198	15,4	13,2	17,6	130	21,3	17,5	25,0	68	9,8	7,4	12,3
Urètre (C66.9)	9	0,6	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	12	1,0	0,6	1,7	6	1,0	0,4	2,2	6	1,0	0,4	2,2
Cerveau (C71.0-C71.9)	71	6,0	4,6	7,5	37	6,6	4,9	8,8	34	5,5	4,0	7,6

Tableau 2-9 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	6	0,6	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	74	6,7	5,1	8,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	7	0,7	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	32	3,0	2,2	4,2	18	3,5	2,3	5,4	14	2,5	1,5	4,1
Lymphomes non hodgkiniens	206	16,0	13,8	18,3	99	16,6	13,2	19,9	107	15,3	12,3	18,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	61	4,6	3,4	5,8	31	4,9	3,5	6,8	30	4,4	3,1	6,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	13	1,2	0,7	2,1	6	1,2	0,5	2,5	7	1,3	0,6	2,6
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	86	6,3	4,9	7,7	53	8,6	6,2	10,9	33	4,3	3,1	6,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	36	2,9	2,1	4,0	20	3,4	2,2	5,2	16	2,6	1,6	4,2
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	17	1,3	0,8	2,1	10	1,6	0,9	3,0	7	1,0	0,5	2,2
Autres leucémies	24	1,7	1,2	2,6	16	2,7	1,7	4,3	8	0,9	0,4	2,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	156	10,9	9,1	12,7	72	11,5	8,8	14,2	84	10,4	8,1	12,8
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	12	0,9	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 152	398,2	386,9	409,5	2 775	462,1	444,6	479,6	2 377	347,4	332,7	362,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	16	1,2	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	24	2,0	1,3	2,9	18	3,2	2,0	4,9	6	0,8	0,3	2,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	7	0,5	0,3	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	14	1,1	0,6	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	16	1,2	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	55	4,2	3,0	5,3	42	6,9	5,2	9,1	13	1,7	1,0	3,1
Estomac (C16.0-C16.9)	103	7,4	5,9	8,8	71	11,0	8,4	13,6	32	4,6	3,3	6,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	22	1,8	1,2	2,6	12	2,0	1,2	3,5	10	1,6	0,9	3,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	681	50,5	46,5	54,4	391	64,0	57,6	70,5	290	38,6	33,9	43,4
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	440	32,1	29,0	35,3	241	38,9	33,9	43,9	199	26,3	22,4	30,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	241	18,3	15,9	20,7	150	25,1	21,0	29,2	91	12,3	9,6	15,0
Anus (C21.0-C21.8)	12	0,9	0,5	1,6	6	1,0	0,4	2,3	6	0,8	0,3	1,9
Foie (C22.0)	30	2,3	1,6	3,2	20	3,3	2,2	5,1	10	1,3	0,7	2,6
Vésicule biliaire (C23.9)	25	1,8	1,2	2,6	9	1,5	0,7	2,8	16	2,1	1,3	3,5
Pancréas (C25.0-C25.9)	148	10,5	8,7	12,2	71	11,5	8,8	14,2	77	9,4	7,1	11,6
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	53	3,9	2,8	4,9	27	4,3	3,0	6,1	26	3,5	2,4	5,2
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	693	51,9	47,9	55,9	354	57,1	51,1	63,2	339	48,2	42,9	53,6
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	14	1,2	0,7	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	11	1,1	0,6	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-9 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	42	3,3	2,5	4,4	24	3,8	2,6	5,6	18	3,0	1,9	4,8
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	132	10,6	8,7	12,5	73	12,1	9,2	15,0	59	9,5	6,9	12,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	13	0,8	0,5	1,5	6	1,0	0,4	2,2	7	0,7	0,3	1,8
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	621	93,3	85,7	101,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	53	5,4	3,9	6,9	53	10,7	7,7	13,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	153	12,1	10,1	14,1	153	23,5	19,6	27,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	6	0,4	0,2	1,0	6	0,7	0,3	1,8
Ovaire (C56.9)	87	6,6	5,2	8,1	87	12,7	9,9	15,6
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	27	1,8	1,2	2,6	27	3,3	2,3	4,9
Prostate (C61.9)	778	61,4	57,0	65,8	778	130,6	121,3	139,9
Testicule (C62.0-C62.9)	27	3,1	2,2	4,4	27	6,2	4,3	8,7
Verge (C60.0-C60.9)	9	0,7	0,4	1,4	9	1,6	0,8	3,1
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	261	19,6	17,1	22,1	200	32,8	28,2	37,4	61	8,5	6,3	10,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	157	12,3	10,3	14,3	94	15,7	12,5	19,0	63	9,4	7,0	11,8
Utrère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	73	6,2	4,7	7,7	40	7,3	5,4	9,7	33	5,2	3,7	7,2
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	60	5,9	4,4	7,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	38	3,7	2,8	5,0	26	5,1	3,5	7,3	12	2,3	1,3	4,0
Lymphomes non hodgkiniens	212	16,7	14,3	19,0	120	20,3	16,5	24,0	92	13,4	10,5	16,3
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	58	4,3	3,1	5,4	30	4,9	3,5	6,8	28	3,7	2,6	5,4
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	17	1,7	1,1	2,6	9	1,9	1,0	3,4	8	1,4	0,7	2,8
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	94	6,9	5,5	8,4	61	9,7	7,2	12,1	33	4,5	3,3	6,4
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	38	3,1	2,3	4,1	18	3,1	2,0	4,8	20	3,1	2,0	4,8
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	15	1,3	0,8	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	19	1,4	0,9	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	170	12,0	10,1	13,9	86	14,0	11,0	17,0	84	10,4	8,0	12,7
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	11	0,9	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-10
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	14 674	384,9	378,6	391,3	7 818	438,1	428,2	448,1	6 856	342,7	334,4	351,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	20	0,6	0,4	0,8	10	0,6	0,3	1,1	10	0,5	0,3	0,9
Langue (C01.9-C02.9)	90	2,3	1,8	2,8	71	3,8	2,9	4,7	19	1,0	0,6	1,4
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	32	0,8	0,6	1,1	19	1,0	0,6	1,5	13	0,7	0,4	1,2
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	18	0,5	0,3	0,7	9	0,5	0,2	0,9	9	0,5	0,2	0,8
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	44	1,1	0,8	1,4	29	1,5	1,1	2,1	15	0,6	0,4	1,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	22	0,5	0,4	0,8	14	0,7	0,4	1,1	8	0,4	0,2	0,7
Oropharynx (C10.0-C10.9)	16	0,4	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	14	0,4	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	55	1,3	1,0	1,7	42	1,9	1,5	2,5	13	0,7	0,4	1,1
Oesophage (C15.0-C15.9)	167	4,3	3,6	5,0	126	6,9	5,7	8,2	41	1,9	1,4	2,5
Estomac (C16.0-C16.9)	242	6,3	5,5	7,1	162	9,0	7,6	10,4	80	3,9	3,0	4,7
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	60	1,5	1,1	1,9	31	1,6	1,2	2,2	29	1,4	1,0	2,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	1 728	45,4	43,2	47,6	995	56,1	52,5	59,7	733	35,8	33,2	38,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 088	28,8	27,0	30,5	596	34,0	31,3	36,8	492	24,1	21,9	26,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	640	16,6	15,3	17,9	399	22,0	19,8	24,3	241	11,7	10,2	13,3
Anus (C21.0-C21.8)	45	1,1	0,8	1,4	17	0,9	0,6	1,4	28	1,3	0,9	1,8
Foie (C22.0)	127	3,3	2,7	3,8	98	5,0	4,0	6,0	29	1,6	1,1	2,2
Vésicule biliaire (C23.9)	41	1,1	0,8	1,4	13	0,8	0,5	1,3	28	1,4	1,0	2,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	369	9,8	8,8	10,8	185	10,8	9,2	12,4	184	9,1	7,7	10,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	150	4,0	3,4	4,7	70	3,9	3,0	4,9	80	4,1	3,2	5,0
Larynx (C32.0-C32.9)	83	2,2	1,7	2,7	72	4,0	3,1	5,0	11	0,6	0,3	1,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	1 819	49,3	47,0	51,6	991	58,4	54,7	62,1	828	42,1	39,2	45,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	26	0,7	0,5	1,0	14	0,8	0,5	1,3	12	0,7	0,4	1,1
Os et articulations (C40.0-C41.9)	30	0,8	0,6	1,1	20	1,0	0,7	1,5	10	0,5	0,3	1,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	112	3,0	2,4	3,6	66	3,7	2,8	4,6	46	2,4	1,8	3,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	517	13,1	11,9	14,2	268	13,9	12,2	15,6	249	12,6	11,0	14,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	58	1,6	1,1	2,0	31	1,8	1,3	2,5	27	1,4	1,0	2,0
Sein (C50.0-C50.9)	1 984	49,8	47,6	52,1	15	0,9	0,5	1,4	1 969	96,7	92,3	101,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	163	4,3	3,6	5,0	163	8,9	7,5	10,3
Corps utérin (C54.0-C54.9)	441	11,3	10,2	12,4	441	22,2	20,1	24,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	180	4,7	4,0	5,4	180	9,2	7,8	10,5
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	64	1,6	1,2	2,1	64	3,1	2,3	3,9
Prostate (C61.9)	2 175	58,3	55,8	60,8	2 175	122,3	117,1	127,6
Testicule (C62.0-C62.9)	95	2,7	2,1	3,2	95	5,1	4,1	6,1
Verge (C60.0-C60.9)	16	0,5	0,3	0,7	16	1,0	0,6	1,5
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	6	0,2	0,1	0,4	6	0,3	0,2	0,7
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	624	16,8	15,4	18,1	452	26,1	23,7	28,6	172	8,8	7,4	10,1
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	446	11,2	10,1	12,2	288	15,1	13,3	16,9	158	7,6	6,4	8,8
Uretere (C66.9)	17	0,5	0,3	0,7	8	0,5	0,2	0,9	9	0,4	0,2	0,8
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	6	0,2	0,1	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	26	0,7	0,5	1,0	15	0,9	0,5	1,4	11	0,6	0,3	1,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	221	5,8	5,0	6,6	132	7,1	5,8	8,3	89	4,6	3,6	5,6

Tableau 2-10 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	15	0,4	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	356	9,3	8,3	10,3	91	4,8	3,8	5,8	265	14,1	12,4	15,9
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	19	0,5	0,3	0,8	10	0,5	0,3	0,9	9	0,5	0,3	1,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	96	2,6	2,1	3,1	61	3,1	2,3	3,9	35	2,1	1,5	2,7
Lymphomes non hodgkiniens	634	16,6	15,3	17,9	358	19,8	17,7	21,9	276	13,5	11,8	15,1
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	208	5,5	4,7	6,2	121	6,8	5,6	8,0	87	4,3	3,4	5,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	42	1,2	0,9	1,5	22	1,2	0,8	1,8	20	1,1	0,7	1,6
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	248	6,6	5,7	7,4	154	8,7	7,3	10,1	94	4,8	3,8	5,8
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	101	2,7	2,1	3,2	56	3,1	2,3	3,9	45	2,3	1,7	3,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	43	1,1	0,8	1,5	26	1,4	1,0	2,0	17	0,8	0,5	1,3
Autres leucémies	27	0,7	0,5	1,0	18	0,9	0,6	1,4	9	0,5	0,2	0,8
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	485	12,6	11,5	13,8	265	15,2	13,3	17,0	220	10,5	9,0	11,9
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	43	1,2	0,9	1,6	37	2,2	1,7	2,9	6	0,3	0,1	0,7
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	14 465	392,0	385,5	398,5	7 736	450,0	439,8	460,2	6 729	346,2	337,7	354,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	20	0,6	0,4	0,8	13	0,8	0,5	1,3	7	0,3	0,1	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	64	1,6	1,2	2,0	41	2,1	1,6	2,8	23	1,1	0,8	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	29	0,7	0,5	1,0	12	0,6	0,4	1,0	17	0,9	0,6	1,4
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	25	0,7	0,5	0,9	18	1,0	0,6	1,5	7	0,4	0,2	0,7
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	32	0,9	0,6	1,2	24	1,4	1,0	2,0	8	0,3	0,2	0,7
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	23	0,6	0,4	0,8	17	0,9	0,6	1,4	6	0,3	0,1	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	13	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	15	0,4	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	54	1,4	1,0	1,7	47	2,4	1,8	3,1	7	0,4	0,2	0,7
Oesophage (C15.0-C15.9)	166	4,6	3,9	5,3	125	7,2	5,9	8,5	41	2,2	1,6	2,9
Estomac (C16.0-C16.9)	253	6,8	5,9	7,6	171	9,9	8,4	11,5	82	4,1	3,2	5,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	64	1,7	1,3	2,2	38	2,1	1,5	2,8	26	1,4	0,9	1,9
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	1 670	45,3	43,0	47,5	968	56,6	53,0	60,3	702	35,0	32,4	37,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 023	27,9	26,2	29,7	556	33,0	30,2	35,8	467	23,3	21,1	25,4
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	647	17,3	16,0	18,7	412	23,6	21,3	25,9	235	11,8	10,2	13,3
Anus (C21.0-C21.8)	45	1,1	0,9	1,5	15	0,8	0,5	1,3	30	1,5	1,0	2,0
Foie (C22.0)	150	3,8	3,2	4,5	106	5,6	4,5	6,8	44	2,2	1,7	2,9
Vésicule biliaire (C23.9)	44	1,2	0,9	1,5	11	0,7	0,4	1,1	33	1,6	1,2	2,2
Pancréas (C25.0-C25.9)	341	9,2	8,2	10,2	174	10,2	8,7	11,7	167	8,4	7,1	9,8
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	164	4,5	3,8	5,2	72	4,2	3,2	5,2	92	4,9	3,9	5,9
Larynx (C32.0-C32.9)	63	1,7	1,3	2,2	50	3,0	2,2	3,8	13	0,6	0,4	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	1 806	50,6	48,2	53,0	921	56,2	52,5	59,9	885	46,6	43,5	49,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	43	1,2	0,9	1,6	30	1,6	1,2	2,3	13	0,7	0,4	1,2
Os et articulations (C40.0-C41.9)	31	0,9	0,6	1,2	20	1,1	0,7	1,7	11	0,6	0,3	1,0

Tableau 2-10 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	97	2,7	2,1	3,2	54	3,2	2,3	4,1	43	2,3	1,8	3,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	450	11,8	10,7	12,9	244	13,2	11,5	14,9	206	10,8	9,3	12,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	50	1,3	0,9	1,7	27	1,6	1,1	2,2	23	1,1	0,8	1,7
Sein (C50.0-C50.9)	1 831	47,7	45,5	49,9	9	0,6	0,3	1,1	1 822	92,5	88,2	96,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	147	3,9	3,3	4,5	147	8,0	6,7	9,3
Corps utérin (C54.0-C54.9)	397	10,2	9,2	11,3	397	20,0	18,0	22,0
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	195	5,1	4,3	5,8	195	9,9	8,4	11,3
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	52	1,4	1,0	1,7	52	2,6	1,9	3,3
Prostate (C61.9)	2 192	60,8	58,2	63,4	2 192	127,9	122,4	133,4
Testicule (C62.0-C62.9)	118	3,4	2,7	4,0	118	6,4	5,3	7,6
Verge (C60.0-C60.9)	10	0,2	0,1	0,4	10	0,5	0,3	0,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	644	17,6	16,2	19,0	500	30,0	27,4	32,7	144	7,2	6,0	8,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	419	11,0	10,0	12,1	249	13,7	12,0	15,5	170	8,8	7,4	10,2
Uretrère (C66.9)	18	0,5	0,3	0,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	7	0,2	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	33	0,9	0,7	1,2	15	0,9	0,5	1,4	18	1,0	0,7	1,5
Cerveau (C71.0-C71.9)	239	6,6	5,7	7,4	152	8,5	7,1	9,8	87	4,8	3,8	5,9
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	12	0,3	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	389	10,3	9,3	11,4	96	5,0	4,0	6,0	293	15,9	14,0	17,8
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	30	0,8	0,6	1,1	18	0,9	0,6	1,4	12	0,7	0,4	1,1
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	88	2,5	1,9	3,0	50	2,7	1,9	3,5	38	2,2	1,6	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	640	17,3	16,0	18,7	362	20,6	18,4	22,8	278	14,4	12,7	16,1
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	186	5,2	4,4	5,9	99	5,9	4,7	7,1	87	4,5	3,5	5,5
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	53	1,6	1,2	2,0	29	1,7	1,2	2,4	24	1,4	1,0	2,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	233	6,4	5,6	7,2	145	8,5	7,1	9,9	88	4,5	3,6	5,5
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	111	3,1	2,5	3,7	61	3,7	2,7	4,6	50	2,7	1,9	3,5
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	66	1,8	1,4	2,3	41	2,4	1,8	3,1	25	1,4	0,9	1,9
Autres leucémies	30	0,8	0,6	1,1	21	1,1	0,7	1,7	9	0,5	0,2	0,9
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	550	15,0	13,7	16,3	276	16,8	14,8	18,8	274	13,7	12,0	15,3
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	46	1,3	1,0	1,7	39	2,4	1,8	3,2	7	0,4	0,2	0,8
Sarcome de Kaposi (M-9140)	10	0,3	0,1	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-11

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	21 594	368,1	363,1	373,1	11 414	412,3	404,7	420,0	10 180	331,9	325,2	338,6
Lèvre (C00.0-C00.9)	29	0,4	0,3	0,6	19	0,6	0,4	1,0	10	0,3	0,2	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	148	2,4	2,0	2,8	105	3,5	2,9	4,2	43	1,4	1,0	1,8
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	36	0,6	0,5	0,9	22	0,8	0,5	1,2	14	0,5	0,3	0,9
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	31	0,5	0,4	0,7	18	0,6	0,4	1,0	13	0,4	0,2	0,7
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	73	1,3	1,0	1,5	37	1,3	1,0	1,8	36	1,2	0,9	1,6
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	40	0,8	0,6	1,0	30	1,2	0,9	1,7	10	0,3	0,2	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	16	0,3	0,2	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	23	0,4	0,3	0,6	17	0,6	0,4	0,9	6	0,2	0,1	0,5
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	105	1,7	1,4	2,0	78	2,6	2,0	3,2	27	0,8	0,6	1,2
Oesophage (C15.0-C15.9)	258	4,3	3,8	4,8	194	6,8	5,9	7,8	64	1,9	1,5	2,4
Estomac (C16.0-C16.9)	346	5,7	5,1	6,3	218	7,9	6,8	8,9	128	3,7	3,1	4,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	82	1,3	1,0	1,6	43	1,5	1,2	2,0	39	1,2	0,9	1,6
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	2 625	43,2	41,5	44,9	1 463	52,1	49,4	54,8	1 162	35,2	33,1	37,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 680	27,5	26,1	28,8	892	31,8	29,7	33,9	788	23,8	22,0	25,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	945	15,7	14,7	16,7	571	20,3	18,6	22,0	374	11,4	10,2	12,6
Anus (C21.0-C21.8)	88	1,4	1,1	1,7	33	1,2	0,8	1,6	55	1,7	1,3	2,2
Foie (C22.0)	276	4,6	4,0	5,1	212	7,3	6,3	8,3	64	2,1	1,6	2,6
Vésicule biliaire (C23.9)	56	0,9	0,7	1,2	17	0,6	0,4	1,0	39	1,2	0,9	1,6
Pancréas (C25.0-C25.9)	568	9,2	8,5	10,0	305	10,8	9,6	12,0	263	7,8	6,8	8,8
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	233	3,8	3,3	4,3	99	3,5	2,8	4,2	134	4,1	3,4	4,8
Larynx (C32.0-C32.9)	126	2,0	1,7	2,4	104	3,6	2,9	4,3	22	0,7	0,5	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	2 774	46,4	44,7	48,2	1 419	50,8	48,1	53,4	1 355	43,1	40,7	45,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	39	0,7	0,5	0,9	27	1,0	0,7	1,4	12	0,4	0,2	0,7
Os et articulations (C40.0-C41.9)	45	0,9	0,7	1,2	32	1,4	1,0	1,9	13	0,5	0,3	0,9
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	122	2,3	1,9	2,7	64	2,5	1,9	3,1	58	2,1	1,5	2,6
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	836	15,1	14,0	16,1	481	17,6	16,0	19,3	355	12,8	11,4	14,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	69	1,2	0,9	1,5	48	1,7	1,3	2,3	21	0,7	0,5	1,1
Sein (C50.0-C50.9)	2 912	50,2	48,3	52,0	26	0,9	0,6	1,3	2 886	96,4	92,8	100,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	172	3,6	3,0	4,2	172	7,1	6,0	8,2
Corps utérin (C54.0-C54.9)	660	11,0	10,2	11,9	660	21,4	19,7	23,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	257	4,3	3,7	4,8	257	8,2	7,2	9,2
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	128	2,1	1,7	2,5	128	4,0	3,3	4,7
Prostate (C61.9)	3 175	53,8	51,9	55,6	3 175	113,4	109,4	117,4
Testicule (C62.0-C62.9)	130	3,4	2,8	3,9	130	6,7	5,5	7,9
Verge (C60.0-C60.9)	16	0,3	0,2	0,4	16	0,6	0,4	0,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	10	0,2	0,1	0,3	10	0,4	0,2	0,7
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 038	17,1	16,1	18,2	769	27,6	25,6	29,5	269	8,1	7,1	9,1
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	480	8,2	7,4	8,9	304	10,8	9,6	12,1	176	5,7	4,8	6,6
Uretere (C66.9)	22	0,4	0,2	0,5	10	0,4	0,2	0,7	12	0,4	0,2	0,7
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	41	0,8	0,6	1,0	19	0,8	0,5	1,2	22	0,8	0,5	1,2
Cerveau (C71.0-C71.9)	269	5,1	4,5	5,7	147	5,7	4,7	6,6	122	4,6	3,8	5,5

Tableau 2-11 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	14	0,3	0,2	0,5	6	0,2	0,1	0,5	8	0,4	0,2	0,7
Thyroïde (C73.9)	346	6,9	6,1	7,6	88	3,5	2,7	4,3	258	10,2	8,9	11,5
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	31	0,7	0,5	0,9	17	0,7	0,4	1,1	14	0,6	0,4	1,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	112	2,5	2,0	3,0	64	2,8	2,1	3,5	48	2,2	1,7	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	913	15,7	14,6	16,7	522	19,0	17,4	20,7	391	12,7	11,4	14,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	271	4,5	4,0	5,1	142	5,1	4,2	5,9	129	4,1	3,4	4,8
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	40	1,0	0,8	1,3	27	1,4	1,0	2,0	13	0,6	0,4	1,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	297	4,8	4,3	5,4	184	6,4	5,5	7,4	113	3,4	2,7	4,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	165	2,9	2,5	3,4	97	3,6	2,9	4,3	68	2,3	1,8	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	71	1,3	1,0	1,6	42	1,6	1,2	2,2	29	1,0	0,7	1,4
Autres leucémies	76	1,3	1,0	1,6	41	1,6	1,2	2,1	35	1,0	0,7	1,5
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	814	12,9	12,0	13,8	415	14,6	13,1	16,0	399	11,4	10,2	12,6
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	67	1,1	0,8	1,4	54	1,9	1,4	2,4	13	0,4	0,2	0,7
Sarcome de Kaposi (M-9140)	11	0,2	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	20 988	366,0	360,9	371,0	11 250	418,2	410,4	426,0	9 738	323,4	316,7	330,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	25	0,4	0,3	0,6	19	0,7	0,4	1,0	6	0,2	0,1	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	161	2,8	2,3	3,2	113	4,0	3,3	4,8	48	1,6	1,2	2,1
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	43	0,7	0,5	0,9	20	0,7	0,5	1,1	23	0,7	0,5	1,1
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	33	0,6	0,4	0,8	24	0,8	0,6	1,2	9	0,3	0,2	0,6
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	72	1,3	1,0	1,6	33	1,2	0,9	1,7	39	1,3	1,0	1,8
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	45	0,9	0,7	1,1	30	1,2	0,8	1,6	15	0,6	0,4	1,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	20	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	22	0,4	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	97	1,6	1,3	1,9	79	2,7	2,1	3,3	18	0,6	0,4	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	236	4,0	3,5	4,5	179	6,5	5,5	7,5	57	1,8	1,3	2,2
Estomac (C16.0-C16.9)	389	6,6	5,9	7,2	267	9,8	8,6	11,0	122	3,7	3,0	4,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	74	1,3	1,0	1,5	42	1,5	1,2	2,0	32	1,0	0,7	1,4
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	2 615	44,4	42,6	46,1	1 438	53,1	50,3	55,8	1 177	36,7	34,5	38,9
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 724	29,3	27,9	30,7	888	33,0	30,8	35,2	836	26,1	24,3	27,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	891	15,1	14,1	16,1	550	20,0	18,4	21,7	341	10,6	9,5	11,8
Anus (C21.0-C21.8)	75	1,3	1,0	1,6	30	1,1	0,8	1,5	45	1,4	1,1	1,9
Foie (C22.0)	258	4,4	3,9	4,9	191	6,8	5,8	7,7	67	2,2	1,7	2,7
Vésicule biliaire (C23.9)	65	1,1	0,8	1,4	23	0,9	0,6	1,3	42	1,3	1,0	1,8
Pancréas (C25.0-C25.9)	490	8,2	7,5	9,0	250	9,2	8,1	10,4	240	7,4	6,4	8,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	187	3,2	2,7	3,7	87	3,2	2,5	3,9	100	3,3	2,6	3,9
Larynx (C32.0-C32.9)	130	2,3	1,9	2,7	108	3,9	3,2	4,7	22	0,7	0,5	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	2 763	47,3	45,5	49,1	1 456	53,6	50,9	56,4	1 307	42,2	39,9	44,5
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	37	0,7	0,5	0,9	25	1,0	0,7	1,5	12	0,4	0,2	0,7
Os et articulations (C40.0-C41.9)	44	0,9	0,7	1,2	25	1,1	0,7	1,5	19	0,8	0,5	1,2

Tableau 2-11 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	137	2,5	2,0	2,9	68	2,6	2,0	3,3	69	2,3	1,8	2,9
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	835	15,2	14,2	16,3	434	16,3	14,7	17,8	401	14,5	13,0	16,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	57	1,0	0,7	1,3	37	1,4	1,0	1,9	20	0,7	0,5	1,1
Sein (C50.0-C50.9)	2 757	48,2	46,4	50,0	20	0,7	0,5	1,1	2 737	92,5	88,9	96,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	167	3,4	2,9	4,0	167	6,7	5,6	7,8
Corps utérin (C54.0-C54.9)	576	9,9	9,0	10,7	576	19,1	17,5	20,7
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	284	4,9	4,3	5,5	284	9,3	8,2	10,4
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	94	1,6	1,3	2,0	94	3,1	2,4	3,7
Prostate (C61.9)	3 177	55,3	53,3	57,2	3 177	117,0	112,9	121,1
Testicule (C62.0-C62.9)	123	3,2	2,6	3,8	123	6,4	5,2	7,5
Verge (C60.0-C60.9)	23	0,4	0,3	0,6	23	0,9	0,6	1,3
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	10	0,2	0,1	0,3	10	0,4	0,2	0,7
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 037	17,4	16,3	18,5	789	28,9	26,9	30,9	248	7,8	6,8	8,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	428	7,5	6,7	8,2	276	10,2	9,0	11,5	152	4,9	4,1	5,7
Uretrère (C66.9)	22	0,4	0,3	0,6	11	0,4	0,2	0,8	11	0,3	0,2	0,6
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	46	0,9	0,7	1,1	22	0,9	0,6	1,3	24	0,8	0,6	1,3
Cerveau (C71.0-C71.9)	284	5,4	4,8	6,1	171	6,6	5,6	7,6	113	4,3	3,5	5,2
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	12	0,3	0,1	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	313	6,2	5,5	7,0	90	3,6	2,8	4,3	223	8,9	7,7	10,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	17	0,4	0,2	0,6	7	0,3	0,1	0,6	10	0,4	0,2	0,8
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	114	2,7	2,2	3,2	66	3,1	2,4	3,9	48	2,3	1,7	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	884	15,4	14,4	16,4	476	17,8	16,1	19,4	408	13,3	12,0	14,6
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	245	4,2	3,7	4,7	131	4,8	4,0	5,6	114	3,6	2,9	4,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	50	1,3	1,0	1,7	27	1,4	1,0	1,9	23	1,3	0,9	1,9
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	272	4,5	4,0	5,0	173	6,2	5,3	7,2	99	3,1	2,4	3,7
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	119	2,1	1,7	2,5	62	2,4	1,8	3,0	57	2,0	1,5	2,6
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	83	1,5	1,2	1,8	46	1,8	1,4	2,4	37	1,2	0,9	1,7
Autres leucémies	68	1,2	0,9	1,5	44	1,7	1,3	2,2	24	0,8	0,5	1,2
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	785	12,9	12,0	13,9	423	15,6	14,1	17,1	362	10,7	9,5	11,8
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	61	1,0	0,8	1,3	48	1,8	1,4	2,3	13	0,5	0,3	0,8
Sarcome de Kaposi (M-9140)	16	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-12
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	129	377,2	305,6	448,7	68	410,6	299,7	521,4	61	350,9	255,7	446,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colón à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	8	23,6	10,4	50,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	24	74,5	50,3	110,9	12	70,1	39,4	133,8	12	80,1	44,7	139,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Prostate (C61.9)	20	63,8	40,4	99,9	20	123,8	77,3	202,2
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urétre (C66.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-12 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	87	288,3	222,1	354,5	40	268,1	195,3	370,9	47	305,5	230,9	402,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	8	26,5	12,4	54,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	14	48,2	28,0	81,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-12 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-13
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	128	426,5	344,7	508,4	66	458,4	333,2	583,5	62	411,0	298,0	524,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	26	99,4	67,4	143,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	13	43,1	23,9	74,5	6	46,2	18,3	108,2	7	40,4	16,8	89,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	13	56,3	32,1	93,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	14	56,1	32,2	92,6	6	43,7	16,7	105,1	8	70,1	33,1	133,2
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	21	109,0	69,9	170,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-13 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	6	18,1	7,0	42,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	107	371,0	292,8	449,1	53	332,6	230,3	435,0	54	405,8	287,8	523,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	22	82,9	53,8	124,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	15	52,2	30,2	86,6	8	38,2	17,2	88,8	7	66,6	30,1	131,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	7	30,7	13,7	61,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	17	76,3	46,8	118,6	9	78,5	38,3	149,2	8	72,5	34,2	138,5
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-13 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	15	38,6	22,3	66,6	0	0,0	0,0	0,0	15	81,7	47,9	140,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	15	54,6	32,0	89,7	15	102,8	59,1	174,8
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Uretère (C66.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-14
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2009												
Total, tous les sièges primaires de cancer	54	400,3	266,8	533,8	31	444,7	289,2	704,7	23	351,8	219,3	566,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colón à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	6	21,7	9,4	92,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	16	168,0	95,2	289,8	7	180,1	68,6	416,6	9	167,5	78,3	346,6
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-14 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	44	283,3	204,9	407,4	21	290,0	174,8	513,2	23	282,0	179,5	476,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	15	117,7	67,4	219,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-14 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011) — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2011) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Notes explicatives pour les tableaux

Tableau 1 Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011)

Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3) et les règles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour déterminer les sièges primaires multiples.

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

Le tableau a été préparé en se servant des groupes du « Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) » pour les sièges primaires selon la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3). Tous les sièges invasifs et in situ pour la vessie sont compris.

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Le programme de suppression tau-Ardent, développé à Statistique Canada, est utilisé pour supprimer les cellules présentant de faibles dénombrements des données du cancer. Il supprime les cellules du tableau contenant un petit dénombrement (de 1 à 5) et supprime ensuite d'autres cellules itérativement pour empêcher le calcul des cellules supprimées à partir des données diffusées. Le programme choisit une cellule ayant le dénombrement minimal parmi les cellules dans la classe d'équivalence de position la plus prometteuse, mais il peut supprimer des cellules présentant n'importe quel dénombrement, y compris un dénombrement de zéro, mais il ne supprime pas de cellules non disponibles ou non applicables. Quand une cellule est supprimée, toutes les mesures de taux et nombre (nombre, taux, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance du taux) pour cette cellule sont supprimées ensemble.

Tableau 2 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2011)

Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3) et les règles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour déterminer les sièges primaires multiples.

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

Le tableau a été préparé en se servant des groupes du « Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) » pour les sièges primaires selon la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3). Tous les sièges invasifs et in situ pour la vessie sont compris.

Les taux d'incidence du cancer sont normalisés selon l'âge par la méthode directe en prenant pour référence la structure par âge de la population qui prévalait lors du Recensement de la population du Canada de 1991.

Les intervalles de confiance des taux d'incidence du cancer normalisés selon l'âge ont été produits par la méthode de référence suivante : « Fay M.P. and E.J. Feuer. 1997. « Confidence intervals for directly standardized rates : a method based on the gamma distribution. » *Statistics in Medicine*. Volume 16, pages 791 to 801 ».

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Le programme de suppression tau-Ardent, développé à Statistique Canada, est utilisé pour supprimer les cellules présentant de faibles dénombrements des données du cancer. Il supprime les cellules du tableau contenant un petit dénombrement (de 1 à 5) et supprime ensuite d'autres cellules itérativement pour empêcher le calcul des cellules supprimées à partir des données diffusées. Le programme choisit une cellule ayant le dénombrement minimal parmi les cellules dans la classe d'équivalence de position la plus prometteuse, mais il peut supprimer des cellules présentant n'importe quel dénombrement, y compris un dénombrement de zéro, mais il ne supprime pas de cellules non disponibles ou non applicables. Quand une cellule est supprimée, toutes les mesures de taux et nombre (nombre, taux, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance du taux) pour cette cellule sont supprimées ensemble.

L'utilisation d'estimations démographiques correspondant à une population type permet de calculer des taux d'incidence dont la comparaison est plus significative, car les taux ainsi obtenus sont corrigés pour la variation de la structure par âge de la population au fil du temps ainsi que d'une région à l'autre.

Appendice I

Sièges de cancer

Liste des sièges de cancer diagnostiqués au Canada, noms et codes de la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3)¹

Sièges primaires	Codes de la CIM-O-3
Lèvre	C00.0 à C00.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Langue	C01.9 à C02.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Glandes salivaires principales	C07.9 à C08.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Plancher de la bouche	C04.0 à C04.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Gencive et autres localisations de la bouche	C03.0 à C03.9, C05.0 à C05.9, C06.0 à C06.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Nasopharynx	C11.0 à C11.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oropharynx	C10.0 à C10.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Hypopharynx	C12.9, C13.0 à C13.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx	C09.0 à C09.9, C14.0, C14.2 à C14.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oesophage	C15.0 à C15.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Estomac	C16.0 à C16.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Intestin grêle	C17.0 à C17.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Colorectal	C18.0 to 18.9, C19.9, C20.9, C26.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Côlon à l'exclusion du rectum	C18.0 à C18.9, C26.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Rectum et recto-sigmoïde	C19.9, C20.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Anus	C21.0 à C21.2, C21.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Foie	C22.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Vésicule biliaire	C23.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)

1. **Source** : Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies pour l'oncologie, Troisième édition (CIM-O-3) et Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER).

Pancréas	C25.0 à C25.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil digestif	C22.1, C24.0 à C24.9, C26.8 à C26.9, C48.0, C48.1 à C48.2, C48.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Larynx	C32.0 à -C32.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Poumon et bronche	C34.0 à C34.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil respiratoire	C30.0 à C30.1, C31.0 à C31.9, C33.9, C38.1 à C38.3, C38.4, C38.8, C39.0, C39.8, C39.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Os et articulations	C40.0 à C41.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Tissus mous (y compris le coeur)	C38.0, C47.0 à C47.9, C49.0 à C49.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Mélanomes de la peau	C44.0 à C44.9, M-8720 à M-8790
Autres localisations de la peau	C44.0 à C44.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-8000 to M-8005, M-8010 to M-8046 (2007 et années suivantes) ; M-8050 à M-8084, M-8090 à M-8110, M-8720 à M-8790, M-9050 à M-9055, M-9140, M-9590 à M-9989 (1992 et années suivantes).)
Sein	C50.0 à C50.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Col utérin	C53.0 à C53.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Corps utérin	C54.0 à C54.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Utérus, sans autre indication	C55.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Ovaire	C56.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres organes génitaux féminins	C51.0 à C51.9, C52.9, C57.0 à -C58.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Prostate	C61.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Testicule	C62.0 à C62.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Verge	C60.0 à C60.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres organes génitaux masculins	C63.0 à C63.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Vessie (y compris in situ)	C67.0 à C67.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Rein et bassinnet du rein	C64.9, C65.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Urètre	C66.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil urinaire	C68.0 à C68.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oeil	C69.0 à C69.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Cerveau	C71.0 à C71.9 (Excluding morphology types M-9530 à M-9539, M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)

Autres localisations du système nerveux	C71.0 à C71.9, M-9530 à M-9539; C70.0 à C70.9, C72.0 à C72.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Thyroïde	C73.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autre endocrine	C37.9, C74.0 à C74.9, C75.0 à C75.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Maladie de Hodgkin	M-9650 à M-9667
Lymphomes non hodgkiniens	M-9590 à M-9596, M-9670 à M-9719, M-9727 à M-9729; M-9823, tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4; M-9827, tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4
Myélome multiple	M-9731, M-9732, M-9734
Leucémie lymphocytaire aiguë	M-9826, M-9835 à M-9837
Leucémie lymphocytaire chronique	C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823
Leucémie myéloïde aiguë	M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871 à M-9874, M-9895 à M-9897, M-9910, M-9920
Leucémie myéloïde chronique	M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946
Autres leucémies	M-9733, M-9742, M-9800, M-9801, M-9805, M-9820, M-9831, M-9832 à M-9834, M-9860, M-9870, M-9891, M-9930, M-9931, M-9940, M-9948, M-9963, M-9964; C42.0, M-9827; C42.1, M-9827; C42.4, M-9827
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	C42.0 à C42.4, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C76.0 à C76.8, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C77.0 à C77.9, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C80.9, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; M-9740, M-9741, M-9750 à M-9758, M-9760 à M-9769, M-9950 à M-9962, M-9970 à M-9989
Mésothéliome	M-9050 à M-9055
Sarcome de Kaposi	M-9140