

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Canada

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Les deux sexes						
Total, un an et plus						
Total	30 705 766	30 698 569	30 712 963	100,0	100,0	100,0
A consommé	12 369 147	12 056 067	12 682 228	40,3	39,3	41,3
N'a pas consommé	18 336 619	18 023 448	18 649 789	59,7	58,7	60,7
1 à 18 ans						
Total	6 907 635	6 901 086	6 914 184	100,0	100,0	100,0
A consommé	2 408 784	2 319 312	2 498 255	34,9	33,6	36,2
N'a pas consommé	4 498 852	4 409 465	4 588 238	65,1	63,8	66,4
1 à 3 ans						
Total	989 543	983 009	996 078	100,0	100,0	100,0
A consommé	381 790	350 437	413 142	38,6	35,4	41,7
N'a pas consommé	607 754	576 230	639 278	61,4	58,3	64,6
4 à 8 ans						
Total	1 817 942	1 817 942	1 817 942	100,0	100,0	100,0
A consommé	811 578	760 305	862 852	44,6	41,8	47,5
N'a pas consommé	1 006 364	955 090	1 057 637	55,4	52,5	58,2
9 à 13 ans						
Total	2 034 353	2 034 353	2 034 353	100,0	100,0	100,0
A consommé	670 490	619 337	721 643	33,0	30,4	35,5
N'a pas consommé	1 363 863	1 312 710	1 415 016	67,0	64,5	69,6
14 à 18 ans						
Total	2 066 069	2 066 069	2 066 069	100,0	100,0	100,0
A consommé	545 198	502 088	588 307	26,4	24,3	28,5
N'a pas consommé	1 520 871	1 477 762	1 563 981	73,6	71,5	75,7
19 ans et plus						
Total	23 797 859	23 794 963	23 800 754	100,0	100,0	100,0
A consommé	9 960 091	9 666 363	10 253 820	41,8	40,6	43,1
N'a pas consommé	13 837 767	13 543 937	14 131 597	58,1	56,9	59,4
19 à 30 ans						
Total	5 116 894	5 116 894	5 116 894	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 666 777	1 540 104	1 793 449	32,6	30,1	35,0
N'a pas consommé	3 450 117	3 323 445	3 576 790	67,4	65,0	69,9
31 à 50 ans						
Total	9 772 156	9 771 272	9 773 040	100,0	100,0	100,0
A consommé	3 717 542	3 501 134	3 933 951	38,0	35,8	40,3
N'a pas consommé	6 054 614	5 838 174	6 271 054	62,0	59,7	64,2
51 à 70 ans						
Total	6 418 105	6 416 571	6 419 640	100,0	100,0	100,0
A consommé	3 238 731	3 103 081	3 374 380	50,5	48,3	52,6
N'a pas consommé	3 179 375	3 043 747	3 315 003	49,5	47,4	51,6
71 ans et plus						
Total	2 490 703	2 488 440	2 492 966	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 337 042	1 271 454	1 402 630	53,7	51,0	56,3
N'a pas consommé	1 153 661	1 088 178	1 219 145	46,3	43,7	48,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Canada – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Hommes						
Total, un an et plus						
Total	15 194 458	15 132 611	15 256 305	100,0	100,0	100,0
A consommé	5 089 287	4 866 527	5 312 047	33,5	32,0	34,9
N'a pas consommé	10 105 171	9 882 188	10 328 154	66,5	65,0	68,0
1 à 18 ans						
Total	3 521 918	3 460 233	3 583 602	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 201 264	1 131 893	1 270 634	34,1	32,3	35,9
N'a pas consommé	2 320 654	2 249 141	2 392 167	65,9	64,1	67,7
1 à 3 ans						
Total	480 440	447 987	512 894	100,0	100,0	100,0
A consommé	183 613	158 838	208 388	38,2	33,9	42,5
N'a pas consommé	296 828	268 955	324 700	61,8	57,5	66,1
4 à 8 ans						
Total	941 182	889 895	992 468	100,0	100,0	100,0
A consommé	416 846	374 956	458 736	44,3	40,5	48,1
N'a pas consommé	524 336	478 135	570 536	55,7	51,9	59,5
9 à 13 ans						
Total	1 042 720	1 042 720	1 042 720	100,0	100,0	100,0
A consommé	353 127	317 410	388 844	33,9	30,4	37,3
N'a pas consommé	689 593	653 876	725 310	66,1	62,7	69,6
14 à 18 ans						
Total	1 057 576	1 057 576	1 057 576	100,0	100,0	100,0
A consommé	247 678	216 607	278 749	23,4	20,5	26,4
N'a pas consommé	809 898	778 827	840 969	76,6	73,6	79,5
19 ans et plus						
Total	11 672 540	11 670 085	11 674 995	100,0	100,0	100,0
A consommé	3 888 023	3 679 070	4 096 977	33,3	31,5	35,1
N'a pas consommé	7 784 517	7 575 456	7 993 577	66,7	64,9	68,5
19 à 30 ans						
Total	2 594 445	2 594 445	2 594 445	100,0	100,0	100,0
A consommé	723 702	636 057	811 346	27,9	24,5	31,3
N'a pas consommé	1 870 743	1 783 099	1 958 388	72,1	68,7	75,5
31 à 50 ans						
Total	4 876 366	4 875 482	4 877 250	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 424 744	1 272 672	1 576 816	29,2	26,1	32,3
N'a pas consommé	3 451 621	3 299 550	3 603 693	70,8	67,7	73,9
51 à 70 ans						
Total	3 147 013	3 146 905	3 147 121	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 265 786	1 173 556	1 358 015	40,2	37,3	43,2
N'a pas consommé	1 881 227	1 788 995	1 973 460	59,8	56,8	62,7
71 ans et plus						
Total	1 054 716	1 052 453	1 056 979	100,0	100,0	100,0
A consommé	473 792	427 352	520 232	44,9	40,5	49,3
N'a pas consommé	580 924	534 511	627 338	55,0	50,6	59,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Canada – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Femmes						
Total, un an et plus						
Total	15 511 308	15 449 344	15 573 271	100,0	100,0	100,0
A consommé	7 279 860	7 060 850	7 498 870	46,9	45,5	48,3
N'a pas consommé	8 231 448	8 008 405	8 454 491	53,1	51,7	54,5
1 à 18 ans						
Total	3 385 717	3 323 747	3 447 688	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 207 520	1 138 649	1 276 391	35,7	33,8	37,5
N'a pas consommé	2 178 197	2 105 777	2 250 617	64,3	62,5	66,2
1 à 3 ans						
Total	509 103	476 771	541 435	100,0	100,0	100,0
A consommé	198 177	172 772	223 582	38,9	34,5	43,3
N'a pas consommé	310 926	280 815	341 037	61,1	56,7	65,5
4 à 8 ans						
Total	876 760	825 474	928 047	100,0	100,0	100,0
A consommé	394 732	351 178	438 287	45,0	40,9	49,1
N'a pas consommé	482 028	437 016	527 040	55,0	50,9	59,1
9 à 13 ans						
Total	991 633	991 633	991 633	100,0	100,0	100,0
A consommé	317 363	282 657	352 069	32,0	28,5	35,5
N'a pas consommé	674 270	639 564	708 976	68,0	64,5	71,5
14 à 18 ans						
Total	1 008 493	1 008 493	1 008 493	100,0	100,0	100,0
A consommé	297 519	267 008	328 031	29,5	26,5	32,5
N'a pas consommé	710 974	680 462	741 485	70,5	67,5	73,5
19 ans et plus						
Total	12 125 318	12 123 783	12 126 854	100,0	100,0	100,0
A consommé	6 072 068	5 865 818	6 278 318	50,1	48,4	51,8
N'a pas consommé	6 053 250	5 847 006	6 259 494	49,9	48,2	51,6
19 à 30 ans						
Total	2 522 449	2 522 449	2 522 449	100,0	100,0	100,0
A consommé	943 075	856 649	1 029 501	37,4	34,0	40,8
N'a pas consommé	1 579 374	1 492 948	1 665 800	62,6	59,2	66,0
31 à 50 ans						
Total	4 895 790	4 895 790	4 895 790	100,0	100,0	100,0
A consommé	2 292 798	2 134 054	2 451 541	46,8	43,6	50,1
N'a pas consommé	2 602 992	2 444 249	2 761 736	53,2	49,9	56,4
51 à 70 ans						
Total	3 271 092	3 269 557	3 272 628	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 972 945	1 877 817	2 068 073	60,3	57,4	63,2
N'a pas consommé	1 298 147	1 203 039	1 393 255	39,7	36,8	42,6
71 ans et plus						
Total	1 435 987	1 435 987	1 435 987	100,0	100,0	100,0
A consommé	863 250	815 546	910 954	60,1	56,8	63,4
N'a pas consommé	572 737	525 033	620 441	39,9	36,6	43,2

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2011).