

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Terre-Neuve-et-Labrador

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Les deux sexes						
Total, un an et plus						
Total	507 770	507 770	507 770	100,0	100,0	100,0
A consommé	152 870	133 052	172 689	30,1	26,2	34,0
N'a pas consommé	354 900	335 081	374 718	69,9	66,0	73,8
1 à 18 ans						
Total	105 891	105 891	105 891	100,0	100,0	100,0
A consommé	29 095	23 544	34 647	27,5	22,2	32,7
N'a pas consommé	76 796	71 244	82 347	72,5	67,3	77,8
1 à 3 ans						
Total	14 491	14 491	14 491	100,0	100,0	100,0
A consommé	4 468 ^E	2 582 ^E	6 354 ^E	30,8 ^E	17,8 ^E	43,8 ^E
N'a pas consommé	10 023	8 137	11 909	69,2	56,2	82,2
4 à 8 ans						
Total	25 947	25 947	25 947	100,0	100,0	100,0
A consommé	9 227 ^E	6 000 ^E	12 454 ^E	35,6 ^E	23,1 ^E	48,0 ^E
N'a pas consommé	16 720	13 493	19 947	64,4	52,0	76,9
9 à 13 ans						
Total	30 392	30 392	30 392	100,0	100,0	100,0
A consommé	9 306	6 993	11 620	30,6	23,0	38,2
N'a pas consommé	21 086	18 772	23 399	69,4	61,8	77,0
14 à 18 ans						
Total	35 061	35 061	35 061	100,0	100,0	100,0
A consommé	6 095 ^E	3 590 ^E	8 599 ^E	17,4 ^E	10,2 ^E	24,5 ^E
N'a pas consommé	28 966	26 462	31 471	82,6	75,5	89,8
19 ans et plus						
Total	401 879	401 879	401 879	100,0	100,0	100,0
A consommé	123 775	105 567	141 983	30,8	26,3	35,3
N'a pas consommé	278 104	259 896	296 312	69,2	64,7	73,7
19 à 30 ans						
Total	80 970	80 970	80 970	100,0	100,0	100,0
A consommé	23 794 ^E	15 621 ^E	31 968 ^E	29,4 ^E	19,3 ^E	39,5 ^E
N'a pas consommé	57 176	49 002	65 349	70,6	60,5	80,7
31 à 50 ans						
Total	163 258	163 258	163 258	100,0	100,0	100,0
A consommé	45 918	33 114	58 722	28,1	20,3	36,0
N'a pas consommé	117 340	104 536	130 144	71,9	64,0	79,7
51 à 70 ans						
Total	118 650	118 650	118 650	100,0	100,0	100,0
A consommé	40 017	31 109	48 924	33,7	26,2	41,2
N'a pas consommé	78 633	69 726	87 541	66,3	58,8	73,8
71 ans et plus						
Total	39 001	39 001	39 001	100,0	100,0	100,0
A consommé	14 046	10 526	17 566	36,0	27,0	45,0
N'a pas consommé	24 955	21 435	28 475	64,0	55,0	73,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Terre-Neuve-et-Labrador – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Hommes						
Total, un an et plus						
Total	250 868	246 837	254 898	100,0	100,0	100,0
A consommé	54 889	43 289	66 488	21,9	17,3	26,5
N'a pas consommé	195 979	184 321	207 637	78,1	73,5	82,7
1 à 18 ans						
Total	55 301	51 270	59 331	100,0	100,0	100,0
A consommé	16 186	12 059	20 313	29,3	22,2	36,4
N'a pas consommé	39 115	34 401	43 828	70,7	63,6	77,8
1 à 3 ans						
Total	7 597	5 257	9 938	100,0	100,0	100,0
A consommé	2 453 ^E	925 ^E	3 982 ^E	32,3 ^E	15,3 ^E	49,2 ^E
N'a pas consommé	5 144 ^E	3 171 ^E	7 117 ^E	67,7	50,8	84,7
4 à 8 ans						
Total	14 085	10 856	17 314	100,0	100,0	100,0
A consommé	4 656 ^E	2 158 ^E	7 154 ^E	33,1 ^E	15,4 ^E	50,8 ^E
N'a pas consommé	9 429 ^E	6 050 ^E	12 808 ^E	66,9	49,2	84,6
9 à 13 ans						
Total	15 687	15 687	15 687	100,0	100,0	100,0
A consommé	6 821	4 778	8 864	43,5	30,5	56,5
N'a pas consommé	8 866	6 823	10 909	56,5	43,5	69,5
14 à 18 ans						
Total	17 931	17 931	17 931	100,0	100,0	100,0
A consommé	F	F	F	F	F	F
N'a pas consommé	15 675	14 030	17 320	87,4	78,2	96,6
19 ans et plus						
Total	195 567	195 567	195 567	100,0	100,0	100,0
A consommé	38 703	28 094	49 311	19,8	14,4	25,2
N'a pas consommé	156 864	146 256	167 473	80,2	74,8	85,6
19 à 30 ans						
Total	40 409	40 409	40 409	100,0	100,0	100,0
A consommé	F	F	F	F	F	F
N'a pas consommé	33 085	27 447	38 722	81,9	67,9	95,8
31 à 50 ans						
Total	79 673	79 673	79 673	100,0	100,0	100,0
A consommé	12 378 ^E	4 647 ^E	20 110 ^E	15,5 ^E	5,8 ^E	25,2 ^E
N'a pas consommé	67 295	59 563	75 026	84,5	74,8	94,2
51 à 70 ans						
Total	58 763	58 763	58 763	100,0	100,0	100,0
A consommé	14 993 ^E	10 099 ^E	19 888 ^E	25,5 ^E	17,2 ^E	33,8 ^E
N'a pas consommé	43 770	38 875	48 664	74,5	66,2	82,8
71 ans et plus						
Total	16 722	16 722	16 722	100,0	100,0	100,0
A consommé	4 007 ^E	2 041 ^E	5 972 ^E	24,0 ^E	12,2 ^E	35,7 ^E
N'a pas consommé	12 715	10 750	14 681	76,0	64,3	87,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Terre-Neuve-et-Labrador – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Femmes						
Total, un an et plus						
Total	256 902	252 872	260 933	100,0	100,0	100,0
A consommé	97 981	82 333	113 630	38,1	32,0	44,2
N'a pas consommé	158 921	142 824	175 018	61,9	55,8	68,0
1 à 18 ans						
Total	50 590	46 560	54 621	100,0	100,0	100,0
A consommé	12 909	9 427	16 391	25,5	18,9	32,2
N'a pas consommé	37 681	32 979	42 384	74,5	67,8	81,1
1 à 3 ans						
Total	6 894 ^E	4 553 ^E	9 234 ^E	100,0	100,0	100,0
A consommé	F	F	F	29,2 ^E	10,3 ^E	48,1 ^E
N'a pas consommé	4 879 ^E	2 750 ^E	7 008 ^E	70,8	51,9	89,7
4 à 8 ans						
Total	11 862	8 633	15 091	100,0	100,0	100,0
A consommé	4 571 ^E	2 347 ^E	6 795 ^E	38,5 ^E	22,0 ^E	55,0 ^E
N'a pas consommé	7 291 ^E	4 295 ^E	10 287 ^E	61,5	45,0	78,0
9 à 13 ans						
Total	14 705	14 705	14 705	100,0	100,0	100,0
A consommé	2 485 ^E	1 283 ^E	3 688 ^E	16,9 ^E	8,7 ^E	25,1 ^E
N'a pas consommé	12 220	11 017	13 422	83,1	74,9	91,3
14 à 18 ans						
Total	17 130	17 130	17 130	100,0	100,0	100,0
A consommé	3 839 ^E	1 857 ^E	5 820 ^E	22,4 ^E	10,8 ^E	34,0 ^E
N'a pas consommé	13 291	11 310	15 273	77,6	66,0	89,2
19 ans et plus						
Total	206 312	206 312	206 312	100,0	100,0	100,0
A consommé	85 072	70 137	100 008	41,2	34,0	48,5
N'a pas consommé	121 240	106 304	136 175	58,8	51,5	66,0
19 à 30 ans						
Total	40 561	40 561	40 561	100,0	100,0	100,0
A consommé	16 470 ^E	10 720 ^E	22 221 ^E	40,6 ^E	26,4 ^E	54,8 ^E
N'a pas consommé	24 091	18 340	29 841	59,4	45,2	73,6
31 à 50 ans						
Total	83 585	83 585	83 585	100,0	100,0	100,0
A consommé	33 540	23 864	43 216	40,1	28,6	51,7
N'a pas consommé	50 045	40 369	59 721	59,9	48,3	71,4
51 à 70 ans						
Total	59 887	59 887	59 887	100,0	100,0	100,0
A consommé	25 023	17 826	32 220	41,8	29,8	53,8
N'a pas consommé	34 864	27 667	42 061	58,2	46,2	70,2
71 ans et plus						
Total	22 279	22 279	22 279	100,0	100,0	100,0
A consommé	10 039	6 921	13 157	45,1	31,1	59,1
N'a pas consommé	12 240	9 122	15 358	54,9	40,9	68,9

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2011).