

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Ontario

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Les deux sexes						
Total, un an et plus						
Total	12 048 007	12 041 773	12 054 241	100,0	100,0	100,0
A consommé	5 061 458	4 863 438	5 259 478	42,0	40,4	43,6
N'a pas consommé	6 986 550	6 788 776	7 184 323	58,0	56,3	59,6
1 à 18 ans						
Total	2 797 136	2 790 993	2 803 280	100,0	100,0	100,0
A consommé	989 833	933 506	1 046 161	35,4	33,4	37,4
N'a pas consommé	1 807 303	1 750 981	1 863 625	64,6	62,6	66,6
1 à 3 ans						
Total	404 044	397 916	410 173	100,0	100,0	100,0
A consommé	160 422	140 018	180 826	39,7	34,7	44,7
N'a pas consommé	243 622	223 185	264 059	60,3	55,3	65,3
4 à 8 ans						
Total	754 746	754 746	754 746	100,0	100,0	100,0
A consommé	332 305	299 931	364 680	44,0	39,7	48,3
N'a pas consommé	422 441	390 066	454 815	56,0	51,7	60,3
9 à 13 ans						
Total	820 768	820 768	820 768	100,0	100,0	100,0
A consommé	285 781	253 292	318 269	34,8	30,9	38,8
N'a pas consommé	534 987	502 499	567 476	65,2	61,2	69,1
14 à 18 ans						
Total	817 850	817 850	817 850	100,0	100,0	100,0
A consommé	211 597	184 564	238 630	25,9	22,6	29,2
N'a pas consommé	606 253	579 220	633 286	74,1	70,8	77,4
19 ans et plus						
Total	9 250 599	9 249 344	9 251 854	100,0	100,0	100,0
A consommé	4 071 352	3 882 963	4 259 742	44,0	42,0	46,0
N'a pas consommé	5 179 247	4 990 857	5 367 636	56,0	53,9	58,0
19 à 30 ans						
Total	1 988 594	1 988 594	1 988 594	100,0	100,0	100,0
A consommé	692 477	600 738	784 217	34,8	30,2	39,4
N'a pas consommé	1 296 117	1 204 377	1 387 856	65,2	60,6	69,8
31 à 50 ans						
Total	3 877 089	3 876 205	3 877 973	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 529 509	1 384 404	1 674 615	39,4	35,7	43,2
N'a pas consommé	2 347 579	2 202 497	2 492 662	60,5	56,8	64,3
51 à 70 ans						
Total	2 424 604	2 424 604	2 424 604	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 289 717	1 201 564	1 377 870	53,2	49,6	56,8
N'a pas consommé	1 134 887	1 046 734	1 223 040	46,8	43,2	50,4
71 ans et plus						
Total	960 312	959 474	961 150	100,0	100,0	100,0
A consommé	559 648	527 807	591 490	58,3	54,9	61,6
N'a pas consommé	400 664	368 823	432 504	41,7	38,4	45,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Ontario – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Hommes						
Total, un an et plus						
Total	5 964 592	5 924 447	6 004 738	100,0	100,0	100,0
A consommé	2 100 475	1 972 515	2 228 436	35,2	33,1	37,4
N'a pas consommé	3 864 117	3 732 264	3 995 969	64,8	62,6	66,9
1 à 18 ans						
Total	1 440 554	1 400 341	1 480 768	100,0	100,0	100,0
A consommé	501 367	454 116	548 619	34,8	31,9	37,7
N'a pas consommé	939 187	894 178	984 196	65,2	62,3	68,1
1 à 3 ans						
Total	208 219	187 060	229 378	100,0	100,0	100,0
A consommé	80 224	63 020	97 428	38,5	31,6	45,5
N'a pas consommé	127 995	109 258	146 731	61,5	54,5	68,4
4 à 8 ans						
Total	393 236	361 202	425 269	100,0	100,0	100,0
A consommé	171 978	144 472	199 483	43,7	37,8	49,7
N'a pas consommé	221 258	192 195	250 321	56,3	50,3	62,2
9 à 13 ans						
Total	420 215	420 215	420 215	100,0	100,0	100,0
A consommé	157 123	134 218	180 029	37,4	31,9	42,8
N'a pas consommé	263 092	240 186	285 997	62,6	57,2	68,1
14 à 18 ans						
Total	418 885	418 885	418 885	100,0	100,0	100,0
A consommé	92 042	72 586	111 499	22,0	17,3	26,6
N'a pas consommé	326 843	307 386	346 299	78,0	73,4	82,7
19 ans et plus						
Total	4 524 038	4 522 783	4 525 293	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 599 108	1 476 435	1 721 781	35,3	32,6	38,1
N'a pas consommé	2 924 930	2 802 229	3 047 631	64,6	61,9	67,4
19 à 30 ans						
Total	1 002 030	1 002 030	1 002 030	100,0	100,0	100,0
A consommé	307 814	247 429	368 198	30,7	24,7	36,7
N'a pas consommé	694 216	633 832	754 601	69,3	63,3	75,3
31 à 50 ans						
Total	1 928 458	1 927 574	1 929 342	100,0	100,0	100,0
A consommé	563 747	470 315	657 179	29,2	24,4	34,1
N'a pas consommé	1 364 711	1 271 332	1 458 090	70,8	65,9	75,6
51 à 70 ans						
Total	1 182 907	1 182 907	1 182 907	100,0	100,0	100,0
A consommé	528 891	470 182	587 600	44,7	39,7	49,7
N'a pas consommé	654 016	595 307	712 725	55,3	50,3	60,3
71 ans et plus						
Total	410 643	409 805	411 481	100,0	100,0	100,0
A consommé	198 656	177 059	220 253	48,3	43,1	53,6
N'a pas consommé	211 987	190 393	233 581	51,6	46,3	56,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Ontario – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Femmes						
Total, un an et plus						
Total	6 083 415	6 043 096	6 123 734	100,0	100,0	100,0
A consommé	2 960 982	2 812 503	3 109 461	48,7	46,2	51,1
N'a pas consommé	3 122 433	2 971 511	3 273 355	51,3	48,9	53,8
1 à 18 ans						
Total	1 356 582	1 316 284	1 396 880	100,0	100,0	100,0
A consommé	488 466	445 011	531 921	36,0	33,1	38,9
N'a pas consommé	868 116	823 071	913 161	64,0	61,1	66,9
1 à 3 ans						
Total	195 826	175 051	216 600	100,0	100,0	100,0
A consommé	80 198	63 865	96 532	40,9	34,0	47,9
N'a pas consommé	115 627	97 762	133 493	59,0	52,1	66,0
4 à 8 ans						
Total	361 510	329 477	393 544	100,0	100,0	100,0
A consommé	160 328	132 743	187 912	44,3	37,9	50,8
N'a pas consommé	201 183	172 217	230 149	55,7	49,2	62,1
9 à 13 ans						
Total	400 553	400 553	400 553	100,0	100,0	100,0
A consommé	128 657	107 041	150 274	32,1	26,7	37,5
N'a pas consommé	271 896	250 279	293 512	67,9	62,5	73,3
14 à 18 ans						
Total	398 965	398 965	398 965	100,0	100,0	100,0
A consommé	119 555	100 084	139 026	30,0	25,1	34,8
N'a pas consommé	279 410	259 939	298 881	70,0	65,2	74,9
19 ans et plus						
Total	4 726 561	4 726 561	4 726 561	100,0	100,0	100,0
A consommé	2 472 244	2 331 343	2 613 145	52,3	49,3	55,3
N'a pas consommé	2 254 317	2 113 416	2 395 218	47,7	44,7	50,7
19 à 30 ans						
Total	986 564	986 564	986 564	100,0	100,0	100,0
A consommé	384 664	321 358	447 969	39,0	32,6	45,4
N'a pas consommé	601 900	538 595	665 206	61,0	54,6	67,4
31 à 50 ans						
Total	1 948 631	1 948 631	1 948 631	100,0	100,0	100,0
A consommé	965 762	861 170	1 070 355	49,6	44,2	54,9
N'a pas consommé	982 869	878 276	1 087 461	50,4	45,1	55,8
51 à 70 ans						
Total	1 241 697	1 241 697	1 241 697	100,0	100,0	100,0
A consommé	760 826	693 101	828 551	61,3	55,8	66,7
N'a pas consommé	480 871	413 146	548 596	38,7	33,3	44,2
71 ans et plus						
Total	549 669	549 669	549 669	100,0	100,0	100,0
A consommé	360 992	338 953	383 031	65,7	61,7	69,7
N'a pas consommé	188 677	166 638	210 716	34,3	30,3	38,3

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2011).