

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Manitoba

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Les deux sexes						
Total, un an et plus						
Total	1 080 869	1 078 458	1 083 280	100,0	100,0	100,0
A consommé	439 172	411 804	466 541	40,6	38,1	43,2
N'a pas consommé	641 697	614 206	669 187	59,4	56,8	61,9
1 à 18 ans						
Total	260 585	258 174	262 996	100,0	100,0	100,0
A consommé	77 738	70 410	85 066	29,8	27,0	32,7
N'a pas consommé	182 847	174 941	190 754	70,2	67,3	73,0
1 à 3 ans						
Total	37 733	35 322	40 144	100,0	100,0	100,0
A consommé	11 371	8 469	14 272	30,1	22,3	38,0
N'a pas consommé	26 362	22 530	30 194	69,9	62,0	77,7
4 à 8 ans						
Total	68 707	68 707	68 707	100,0	100,0	100,0
A consommé	27 700	23 771	31 629	40,3	34,6	46,0
N'a pas consommé	41 007	37 078	44 936	59,7	54,0	65,4
9 à 13 ans						
Total	76 582	76 582	76 582	100,0	100,0	100,0
A consommé	19 797	14 940	24 654	25,9	19,5	32,2
N'a pas consommé	56 785	51 928	61 642	74,1	67,8	80,5
14 à 18 ans						
Total	77 563	77 563	77 563	100,0	100,0	100,0
A consommé	18 870	13 977	23 764	24,3	18,0	30,6
N'a pas consommé	58 693	53 799	63 586	75,7	69,4	82,0
19 ans et plus						
Total	820 284	820 284	820 284	100,0	100,0	100,0
A consommé	361 435	334 309	388 561	44,1	40,8	47,4
N'a pas consommé	458 849	431 723	485 975	55,9	52,6	59,2
19 à 30 ans						
Total	179 931	179 931	179 931	100,0	100,0	100,0
A consommé	62 519	50 114	74 924	34,7	27,9	41,6
N'a pas consommé	117 412	105 007	129 817	65,3	58,4	72,1
31 à 50 ans						
Total	322 463	322 463	322 463	100,0	100,0	100,0
A consommé	129 509	109 585	149 434	40,2	34,0	46,3
N'a pas consommé	192 954	173 029	212 878	59,8	53,7	66,0
51 à 70 ans						
Total	218 311	218 203	218 419	100,0	100,0	100,0
A consommé	117 206	105 976	128 437	53,7	48,5	58,8
N'a pas consommé	101 105	89 873	112 336	46,3	41,2	51,5
71 ans et plus						
Total	99 579	99 471	99 687	100,0	100,0	100,0
A consommé	52 200	45 392	59 008	52,4	45,6	59,3
N'a pas consommé	47 379	40 568	54 189	47,6	40,7	54,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Manitoba – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Hommes						
Total, un an et plus						
Total	538 451	533 016	543 886	100,0	100,0	100,0
A consommé	174 384	155 673	193 096	32,4	28,9	35,8
N'a pas consommé	364 067	345 226	382 907	67,6	64,2	71,1
1 à 18 ans						
Total	136 871	131 436	142 306	100,0	100,0	100,0
A consommé	38 536	32 492	44 580	28,2	23,9	32,4
N'a pas consommé	98 335	91 407	105 263	71,8	67,6	76,1
1 à 3 ans						
Total	19 810	16 664	22 957	100,0	100,0	100,0
A consommé	6 350 ^E	3 628 ^E	9 071 ^E	32,1 ^E	18,2 ^E	45,9 ^E
N'a pas consommé	13 460	9 547	17 373	67,9	54,1	81,8
4 à 8 ans						
Total	38 267	33 868	42 665	100,0	100,0	100,0
A consommé	14 876	10 950	18 801	38,9	29,8	47,9
N'a pas consommé	23 391	19 156	27 626	61,1	52,1	70,2
9 à 13 ans						
Total	39 289	39 289	39 289	100,0	100,0	100,0
A consommé	9 036 ^E	6 036 ^E	12 035 ^E	23,0 ^E	15,4 ^E	30,6 ^E
N'a pas consommé	30 253	27 254	33 253	77,0	69,4	84,6
14 à 18 ans						
Total	39 505	39 505	39 505	100,0	100,0	100,0
A consommé	8 275 ^E	5 516 ^E	11 034 ^E	20,9 ^E	14,0 ^E	27,9 ^E
N'a pas consommé	31 230	28 471	33 989	79,1	72,1	86,0
19 ans et plus						
Total	401 580	401 580	401 580	100,0	100,0	100,0
A consommé	135 849	117 269	154 429	33,8	29,2	38,5
N'a pas consommé	265 731	247 151	284 311	66,2	61,5	70,8
19 à 30 ans						
Total	91 359	91 359	91 359	100,0	100,0	100,0
A consommé	27 436	19 157	35 715	30,0	21,0	39,1
N'a pas consommé	63 923	55 644	72 202	70,0	60,9	79,0
31 à 50 ans						
Total	162 213	162 213	162 213	100,0	100,0	100,0
A consommé	50 737	37 269	64 205	31,3	23,0	39,6
N'a pas consommé	111 476	98 008	124 944	68,7	60,4	77,0
51 à 70 ans						
Total	106 846	106 738	106 954	100,0	100,0	100,0
A consommé	40 125	32 268	47 983	37,6	30,2	44,9
N'a pas consommé	66 721	58 861	74 580	62,4	55,1	69,8
71 ans et plus						
Total	41 162	41 054	41 270	100,0	100,0	100,0
A consommé	17 550	12 725	22 376	42,6	30,9	54,4
N'a pas consommé	23 612	18 782	28 441	57,4	45,6	69,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Manitoba – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Femmes						
Total, un an et plus						
Total	542 418	537 231	547 605	100,0	100,0	100,0
A consommé	264 788	244 435	285 140	48,8	45,1	52,5
N'a pas consommé	277 630	257 680	297 581	51,2	47,5	54,9
1 à 18 ans						
Total	123 714	118 527	128 901	100,0	100,0	100,0
A consommé	39 202	31 370	47 034	31,7	25,9	37,5
N'a pas consommé	84 512	77 650	91 375	68,3	62,5	74,1
1 à 3 ans						
Total	17 923	15 052	20 794	100,0	100,0	100,0
A consommé	5 021 ^E	3 317 ^E	6 724 ^E	28,0	19,5	36,5
N'a pas consommé	12 902	10 230	15 574	72,0	63,5	80,5
4 à 8 ans						
Total	30 440	26 042	34 839	100,0	100,0	100,0
A consommé	12 824	9 667	15 981	42,1	34,2	50,0
N'a pas consommé	17 616	14 277	20 956	57,9	50,0	65,8
9 à 13 ans						
Total	37 293	37 293	37 293	100,0	100,0	100,0
A consommé	10 761	7 611	13 912	28,9	20,4	37,3
N'a pas consommé	26 532	23 381	29 682	71,1	62,7	79,6
14 à 18 ans						
Total	38 058	38 058	38 058	100,0	100,0	100,0
A consommé	10 596 ^E	6 825 ^E	14 366 ^E	27,8 ^E	17,9 ^E	37,7 ^E
N'a pas consommé	27 462	23 692	31 233	72,2	62,3	82,1
19 ans et plus						
Total	418 704	418 704	418 704	100,0	100,0	100,0
A consommé	225 586	206 575	244 597	53,9	49,3	58,4
N'a pas consommé	193 118	174 107	212 129	46,1	41,6	50,7
19 à 30 ans						
Total	88 572	88 572	88 572	100,0	100,0	100,0
A consommé	35 083	26 595	43 570	39,6	30,0	49,2
N'a pas consommé	53 489	45 002	61 977	60,4	50,8	70,0
31 à 50 ans						
Total	160 250	160 250	160 250	100,0	100,0	100,0
A consommé	78 773	63 187	94 358	49,2	39,4	58,9
N'a pas consommé	81 477	65 892	97 063	50,8	41,1	60,6
51 à 70 ans						
Total	111 465	111 465	111 465	100,0	100,0	100,0
A consommé	77 081	69 142	85 020	69,2	62,0	76,3
N'a pas consommé	34 384	26 445	42 323	30,8	23,7	38,0
71 ans et plus						
Total	58 417	58 417	58 417	100,0	100,0	100,0
A consommé	34 650	29 710	39 589	59,3	50,9	67,8
N'a pas consommé	23 767	18 828	28 707	40,7	32,2	49,1

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2011).