

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Colombie-Britannique

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Les deux sexes						
Total, un an et plus						
Total	4 031 224	4 029 689	4 032 760	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 847 713	1 735 574	1 959 852	45,8	43,0	48,6
N'a pas consommé	2 183 512	2 071 429	2 295 594	54,2	51,4	56,9
1 à 18 ans						
Total	856 483	856 483	856 483	100,0	100,0	100,0
A consommé	361 151	328 035	394 266	42,2	38,3	46,0
N'a pas consommé	495 332	462 217	528 448	57,8	54,0	61,7
1 à 3 ans						
Total	119 202	119 202	119 202	100,0	100,0	100,0
A consommé	48 595	36 764	60 427	40,8	30,8	50,7
N'a pas consommé	70 607	58 775	82 438	59,2	49,3	69,2
4 à 8 ans						
Total	221 248	221 248	221 248	100,0	100,0	100,0
A consommé	119 640	100 652	138 628	54,1	45,5	62,7
N'a pas consommé	101 608	82 620	120 596	45,9	37,3	54,5
9 à 13 ans						
Total	249 144	249 144	249 144	100,0	100,0	100,0
A consommé	101 988	83 754	120 223	40,9	33,6	48,3
N'a pas consommé	147 156	128 921	165 390	59,1	51,7	66,4
14 à 18 ans						
Total	266 889	266 889	266 889	100,0	100,0	100,0
A consommé	90 927	74 607	107 246	34,1	28,0	40,2
N'a pas consommé	175 962	159 643	192 282	65,9	59,8	72,0
19 ans et plus						
Total	3 174 741	3 173 206	3 176 277	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 486 562	1 378 627	1 594 498	46,8	43,4	50,2
N'a pas consommé	1 688 179	1 580 288	1 796 071	53,2	49,8	56,6
19 à 30 ans						
Total	661 364	661 364	661 364	100,0	100,0	100,0
A consommé	235 542	195 160	275 924	35,6	29,5	41,7
N'a pas consommé	425 822	385 440	466 204	64,4	58,3	70,5
31 à 50 ans						
Total	1 288 684	1 288 684	1 288 684	100,0	100,0	100,0
A consommé	538 737	453 566	623 909	41,8	35,2	48,4
N'a pas consommé	749 947	664 775	835 118	58,2	51,6	64,8
51 à 70 ans						
Total	871 606	870 071	873 142	100,0	100,0	100,0
A consommé	475 444	429 530	521 358	54,5	49,2	59,8
N'a pas consommé	396 163	350 263	442 063	45,4	40,2	50,7
71 ans et plus						
Total	353 087	353 087	353 087	100,0	100,0	100,0
A consommé	236 839	210 349	263 330	67,1	59,6	74,6
N'a pas consommé	116 248	89 757	142 738	32,9	25,4	40,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Colombie-Britannique – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Hommes						
Total, un an et plus						
Total	1 984 594	1 964 579	2 004 610	100,0	100,0	100,0
A consommé	771 857	699 012	844 701	38,9	35,3	42,5
N'a pas consommé	1 212 738	1 140 905	1 284 571	61,1	57,5	64,7
1 à 18 ans						
Total	427 610	407 595	447 626	100,0	100,0	100,0
A consommé	172 360	150 026	194 694	40,3	35,5	45,2
N'a pas consommé	255 251	231 495	279 006	59,7	54,8	64,5
1 à 3 ans						
Total	51 473	39 087	63 859	100,0	100,0	100,0
A consommé	22 640 ^E	12 874 ^E	32 406 ^E	44,0	29,9	58,0
N'a pas consommé	28 833	19 592	38 073	56,0	42,0	70,1
4 à 8 ans						
Total	110 972	94 528	127 417	100,0	100,0	100,0
A consommé	59 741	46 389	73 093	53,8	43,6	64,1
N'a pas consommé	51 231	36 715	65 748	46,2	35,9	56,4
9 à 13 ans						
Total	128 413	128 413	128 413	100,0	100,0	100,0
A consommé	48 157	35 665	60 650	37,5	27,8	47,2
N'a pas consommé	80 256	67 763	92 748	62,5	52,8	72,2
14 à 18 ans						
Total	136 752	136 752	136 752	100,0	100,0	100,0
A consommé	41 821	31 267	52 375	30,6	22,9	38,3
N'a pas consommé	94 931	84 377	105 485	69,4	61,7	77,1
19 ans et plus						
Total	1 556 984	1 556 984	1 556 984	100,0	100,0	100,0
A consommé	599 497	529 515	669 479	38,5	34,0	43,0
N'a pas consommé	957 487	887 505	1 027 469	61,5	57,0	66,0
19 à 30 ans						
Total	333 534	333 534	333 534	100,0	100,0	100,0
A consommé	90 894	68 289	113 498	27,3	20,5	34,0
N'a pas consommé	242 640	220 036	265 245	72,7	66,0	79,5
31 à 50 ans						
Total	634 494	634 494	634 494	100,0	100,0	100,0
A consommé	214 064	159 914	268 213	33,7	25,2	42,3
N'a pas consommé	420 430	366 281	474 580	66,3	57,7	74,8
51 à 70 ans						
Total	433 742	433 742	433 742	100,0	100,0	100,0
A consommé	199 269	165 963	232 575	45,9	38,3	53,6
N'a pas consommé	234 473	201 167	267 779	54,1	46,4	61,7
71 ans et plus						
Total	155 214	155 214	155 214	100,0	100,0	100,0
A consommé	95 270	74 460	116 081	61,4	48,0	74,8
N'a pas consommé	59 944 ^E	39 133 ^E	80 754 ^E	38,6 ^E	25,2 ^E	52,0 ^E

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Colombie-Britannique – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Femmes						
Total, un an et plus						
Total	2 046 630	2 026 446	2 066 814	100,0	100,0	100,0
A consommé	1 075 856	988 999	1 162 713	52,5	48,3	56,8
N'a pas consommé	970 774	882 434	1 059 113	47,4	43,2	51,7
1 à 18 ans						
Total	428 873	408 857	448 888	100,0	100,0	100,0
A consommé	188 791	163 640	213 941	44,0	38,4	49,6
N'a pas consommé	240 082	213 455	266 709	56,0	50,4	61,6
1 à 3 ans						
Total	67 729	55 343	80 115	100,0	100,0	100,0
A consommé	25 955 ^E	15 103 ^E	36 808 ^E	38,3 ^E	25,2 ^E	51,5 ^E
N'a pas consommé	41 774	31 371	52 177	61,7	48,5	74,8
4 à 8 ans						
Total	110 276	93 831	126 720	100,0	100,0	100,0
A consommé	59 899	42 414	77 384	54,3	40,1	68,5
N'a pas consommé	50 377 ^E	32 687 ^E	68 067 ^E	45,7	31,5	59,9
9 à 13 ans						
Total	120 731	120 731	120 731	100,0	100,0	100,0
A consommé	53 831	41 534	66 128	44,6	34,4	54,8
N'a pas consommé	66 900	54 603	79 197	55,4	45,2	65,6
14 à 18 ans						
Total	130 137	130 137	130 137	100,0	100,0	100,0
A consommé	49 105	37 517	60 694	37,7	28,8	46,6
N'a pas consommé	81 032	69 443	92 620	62,3	53,4	71,2
19 ans et plus						
Total	1 617 757	1 616 222	1 619 293	100,0	100,0	100,0
A consommé	887 065	803 162	970 969	54,8	49,6	60,0
N'a pas consommé	730 692	646 804	814 580	45,1	40,0	50,3
19 à 30 ans						
Total	327 830	327 830	327 830	100,0	100,0	100,0
A consommé	144 648	112 392	176 904	44,1	34,3	54,0
N'a pas consommé	183 182	150 926	215 438	55,9	46,0	65,7
31 à 50 ans						
Total	654 190	654 190	654 190	100,0	100,0	100,0
A consommé	324 674	259 607	389 740	49,6	39,7	59,6
N'a pas consommé	329 516	264 450	394 583	50,4	40,4	60,3
51 à 70 ans						
Total	437 864	436 329	439 400	100,0	100,0	100,0
A consommé	276 175	246 100	306 249	63,0	56,1	69,8
N'a pas consommé	161 690	131 547	191 833	36,9	30,0	43,7
71 ans et plus						
Total	197 873	197 873	197 873	100,0	100,0	100,0
A consommé	141 569	123 503	159 635	71,5	62,4	80,7
N'a pas consommé	56 304	38 238	74 370	28,5	19,3	37,6

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2011).