

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nouveau-Brunswick

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Les deux sexes						
Total, un an et plus						
Total	722 901	722 901	722 901	100,0	100,0	100,0
A consommé	246 139	220 012	272 267	34,0	30,4	37,7
N'a pas consommé	476 762	450 634	502 889	66,0	62,3	69,6
1 à 18 ans						
Total	153 535	153 535	153 535	100,0	100,0	100,0
A consommé	44 177	36 127	52 228	28,8	23,5	34,0
N'a pas consommé	109 358	101 307	117 408	71,2	66,0	76,5
1 à 3 ans						
Total	21 212	21 212	21 212	100,0	100,0	100,0
A consommé	8 819	5 982	11 656	41,6	28,2	55,0
N'a pas consommé	12 393	9 556	15 230	58,4	45,0	71,8
4 à 8 ans						
Total	39 316	39 316	39 316	100,0	100,0	100,0
A consommé	14 510	10 276	18 743	36,9	26,1	47,7
N'a pas consommé	24 806	20 573	29 040	63,1	52,3	73,9
9 à 13 ans						
Total	45 177	45 177	45 177	100,0	100,0	100,0
A consommé	9 825 ^E	5 929 ^E	13 721 ^E	21,7 ^E	13,1 ^E	30,4 ^E
N'a pas consommé	35 352	31 456	39 248	78,3	69,6	86,9
14 à 18 ans						
Total	47 830	47 830	47 830	100,0	100,0	100,0
A consommé	11 023 ^E	6 814 ^E	15 232 ^E	23,0 ^E	14,2 ^E	31,8 ^E
N'a pas consommé	36 807	32 598	41 016	77,0	68,2	85,8
19 ans et plus						
Total	569 366	569 366	569 366	100,0	100,0	100,0
A consommé	201 962	177 912	226 013	35,5	31,2	39,7
N'a pas consommé	367 404	343 353	391 454	64,5	60,3	68,8
19 à 30 ans						
Total	115 377	115 377	115 377	100,0	100,0	100,0
A consommé	30 121	20 371	39 870	26,1	17,7	34,6
N'a pas consommé	85 256	75 507	95 006	73,9	65,4	82,3
31 à 50 ans						
Total	228 014	228 014	228 014	100,0	100,0	100,0
A consommé	70 199	53 871	86 527	30,8	23,6	37,9
N'a pas consommé	157 815	141 487	174 143	69,2	62,1	76,4
51 à 70 ans						
Total	162 877	162 877	162 877	100,0	100,0	100,0
A consommé	71 892	61 300	82 484	44,1	37,6	50,6
N'a pas consommé	90 985	80 393	101 577	55,9	49,4	62,4
71 ans et plus						
Total	63 098	63 098	63 098	100,0	100,0	100,0
A consommé	29 751	23 719	35 784	47,2	37,6	56,7
N'a pas consommé	33 347	27 314	39 379	52,8	43,3	62,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nouveau-Brunswick – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Hommes						
Total, un an et plus						
Total	354 155	348 624	359 687	100,0	100,0	100,0
A consommé	92 888	75 266	110 511	26,2	21,3	31,1
N'a pas consommé	261 267	243 729	278 805	73,8	68,9	78,7
1 à 18 ans						
Total	77 433	71 902	82 965	100,0	100,0	100,0
A consommé	20 031	14 098	25 964	25,9	18,7	33,0
N'a pas consommé	57 402	51 022	63 782	74,1	67,0	81,3
1 à 3 ans						
Total	9 645 ^E	6 457 ^E	12 833 ^E	100,0	100,0	100,0
A consommé	4 468 ^E	1 688 ^E	7 249 ^E	46,3 ^E	25,2 ^E	67,5 ^E
N'a pas consommé	5 176 ^E	2 743 ^E	7 610 ^E	53,7 ^E	32,5 ^E	74,8 ^E
4 à 8 ans						
Total	19 932	15 423	24 442	100,0	100,0	100,0
A consommé	5 794 ^E	2 738 ^E	8 851 ^E	29,1 ^E	14,7 ^E	43,5 ^E
N'a pas consommé	14 138	9 685	18 592	70,9	56,5	85,3
9 à 13 ans						
Total	23 180	23 180	23 180	100,0	100,0	100,0
A consommé	3 787 ^E	1 375 ^E	6 199 ^E	16,3 ^E	5,9 ^E	26,7 ^E
N'a pas consommé	19 393	16 981	21 805	83,7	73,3	94,1
14 à 18 ans						
Total	24 676	24 676	24 676	100,0	100,0	100,0
A consommé	5 981 ^E	2 910 ^E	9 053 ^E	24,2 ^E	11,8 ^E	36,7 ^E
N'a pas consommé	18 695	15 623	21 766	75,8	63,3	88,2
19 ans et plus						
Total	276 722	276 722	276 722	100,0	100,0	100,0
A consommé	72 857	56 567	89 147	26,3	20,4	32,2
N'a pas consommé	203 865	187 575	220 155	73,7	67,8	79,6
19 à 30 ans						
Total	57 887	57 887	57 887	100,0	100,0	100,0
A consommé	9 621 ^E	3 643 ^E	15 598 ^E	16,6 ^E	6,3 ^E	26,9 ^E
N'a pas consommé	48 266	42 289	54 244	83,4	73,1	93,7
31 à 50 ans						
Total	112 819	112 819	112 819	100,0	100,0	100,0
A consommé	28 447 ^E	16 668 ^E	40 227 ^E	25,2 ^E	14,8 ^E	35,7 ^E
N'a pas consommé	84 372	72 592	96 151	74,8	64,3	85,2
51 à 70 ans						
Total	80 056	80 056	80 056	100,0	100,0	100,0
A consommé	25 092	17 172	33 011	31,3	21,5	41,2
N'a pas consommé	54 964	47 045	62 884	68,7	58,8	78,5
71 ans et plus						
Total	25 960	25 960	25 960	100,0	100,0	100,0
A consommé	9 698 ^E	5 110 ^E	14 285 ^E	37,4 ^E	19,7 ^E	55,0 ^E
N'a pas consommé	16 262	11 675	20 850	62,6	45,0	80,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Consommation de suppléments de vitamines et de minéraux au cours du dernier mois, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile d'un an et plus, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nouveau-Brunswick – suite

	Nombre de personnes	Intervalle de confiance de 95 %		Pourcentage	Intervalle de confiance de 95 %	
		Limite inférieure	Limite supérieure		Limite inférieure	Limite supérieure
Femmes						
Total, un an et plus						
Total	368 746	363 214	374 277	100,0	100,0	100,0
A consommé	153 251	133 873	172 629	41,6	36,3	46,8
N'a pas consommé	215 495	195 936	235 054	58,4	53,2	63,7
1 à 18 ans						
Total	76 102	70 570	81 633	100,0	100,0	100,0
A consommé	24 146	18 334	29 958	31,7	24,4	39,0
N'a pas consommé	51 956	45 264	58 648	68,3	61,0	75,6
1 à 3 ans						
Total	11 567	8 379	14 755	100,0	100,0	100,0
A consommé	4 351 ^E	2 261 ^E	6 441 ^E	37,6 ^E	20,6 ^E	54,6 ^E
N'a pas consommé	7 216 ^E	4 229 ^E	10 204 ^E	62,4	45,4	79,4
4 à 8 ans						
Total	19 384	14 874	23 893	100,0	100,0	100,0
A consommé	8 715 ^E	5 020 ^E	12 411 ^E	45,0 ^E	29,1 ^E	60,8 ^E
N'a pas consommé	10 668 ^E	6 769 ^E	14 567 ^E	55,0	39,2	70,9
9 à 13 ans						
Total	21 997	21 997	21 997	100,0	100,0	100,0
A consommé	6 038 ^E	2 988 ^E	9 088 ^E	27,4 ^E	13,6 ^E	41,3 ^E
N'a pas consommé	15 959	12 909	19 009	72,6	58,7	86,4
14 à 18 ans						
Total	23 154	23 154	23 154	100,0	100,0	100,0
A consommé	5 042 ^E	2 309 ^E	7 774 ^E	21,8 ^E	10,0 ^E	33,6 ^E
N'a pas consommé	18 112	15 380	20 845	78,2	66,4	90,0
19 ans et plus						
Total	292 644	292 644	292 644	100,0	100,0	100,0
A consommé	129 105	110 919	147 291	44,1	37,9	50,3
N'a pas consommé	163 539	145 353	181 725	55,9	49,7	62,1
19 à 30 ans						
Total	57 490	57 490	57 490	100,0	100,0	100,0
A consommé	20 500 ^E	12 500 ^E	28 500 ^E	35,7 ^E	21,7 ^E	49,6 ^E
N'a pas consommé	36 990	28 990	44 990	64,3	50,4	78,3
31 à 50 ans						
Total	115 195	115 195	115 195	100,0	100,0	100,0
A consommé	41 751	29 268	54 235	36,2	25,4	47,1
N'a pas consommé	73 444	60 960	85 927	63,8	52,9	74,6
51 à 70 ans						
Total	82 821	82 821	82 821	100,0	100,0	100,0
A consommé	46 800	39 296	54 304	56,5	47,4	65,6
N'a pas consommé	36 021	28 517	43 525	43,5	34,4	52,6
71 ans et plus						
Total	37 138	37 138	37 138	100,0	100,0	100,0
A consommé	20 054	15 642	24 465	54,0	42,1	65,9
N'a pas consommé	17 084	12 673	21 496	46,0	34,1	57,9

1. La population cible de l'enquête n'inclut pas les personnes qui vivent dans les trois territoires, les personnes vivant dans les réserves indiennes ou sur des terres de la Couronne, les résidents des établissements, les membres à plein temps des Forces armées canadiennes et les résidents de certaines régions éloignées.
2. Il est important d'utiliser les intervalles de confiance dans les comparaisons des estimations pour déterminer si la différence entre les valeurs est statistiquement significative. Les intervalles de confiance décrivent la variabilité d'échantillonnage et donnent une indication de la précision de l'estimation en question.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont identifiées comme suit : (E) à utiliser avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et sont identifiées comme suit : (F) trop peu fiables pour être publiées.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC 2.2), Nutrition, 2004 (Tableau CANSIM 105-2011).