

Tableau 18
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané du biceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure moyenne du pli cutané du biceps											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	6,4	6,2	6,7	3,0	2,8	3,2	3,4	3,2	3,6	4,2	4,0	4,4
12 à 19 ans	6,7	6,4	7,0	3,0	2,9	3,1	3,3	3,2	3,4	4,1	3,9	4,3
20 à 39 ans	6,4	6,1	6,7	3,0	2,8	3,2	3,2	3,1	3,3	3,8	3,6	4,0
40 à 59 ans	7,6	7,2	8,0	3,0	2,7	3,3	3,5	3,2	3,8	4,6	4,3	4,9
60 à 79 ans	8,0	7,6	8,4	3,2	3,0	3,4	3,7	3,5	3,9	5,0	4,6	5,4
6 à 79 ans	7,1	6,9	7,3	3,0	2,9	3,1	3,3	3,2	3,4	4,3	4,2	4,4
Hommes												
6 à 11 ans	6,2	5,8	6,5	2,9	2,8	3,0	3,2	3,0	3,4	3,7	3,4	4,0
12 à 19 ans	5,6	5,4	5,8	2,8	2,7	2,9	3,1	3,0	3,2	3,4	3,2	3,6
20 à 39 ans	4,9	4,6	5,1	2,7	2,5	2,9	3,0	2,9	3,1	3,4	3,2	3,6
40 à 59 ans	5,4	5,1	5,8	2,7	2,5	2,9	3,1	2,8	3,4	3,9	3,6	4,2
60 à 79 ans	5,5	5,2	5,8	2,8	2,6	3,0	3,2	3,0	3,4	4,0	3,8	4,2
6 à 79 ans	5,4	5,2	5,5	2,8	2,7	2,9	3,1	3,0	3,2	3,7	3,6	3,8
Femmes												
6 à 11 ans	6,7	6,5	6,9	3,4	3,1	3,7	3,8	3,5	4,1	4,6	4,4	4,8
12 à 19 ans	7,8	7,4	8,3	4,1	3,9	4,3	4,4	4,0	4,8	5,5	5,1	5,9
20 à 39 ans	8,1	7,5	8,7	3,5	3,2	3,8	4,0	3,4	4,6	5,1	4,5	5,7
40 à 59 ans	9,7	9,2	10,2	3,8	3,2	4,4	4,7	4,0	5,4	6,3	5,5	7,1
60 à 79 ans	10,3	9,7	10,8	4,7	4,0	5,4	5,9	5,2	6,6	7,3	6,9	7,7
6 à 79 ans	8,8	8,5	9,1	3,6	3,4	3,8	4,4	4,2	4,6	5,6	5,3	5,9

	Mesure moyenne du pli cutané du biceps											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	5,5	5,2	5,8	8,0	7,5	8,5	10,9	10,2	11,6	12,7	12,1	13,3
12 à 19 ans	5,9	5,5	6,3	8,1	7,7	8,5	11,1	10,1	12,1	13,8	12,4	15,2
20 à 39 ans	5,4	5,1	5,7	8,0	7,4	8,6	11,1	10,3	11,9	13,7	12,6	14,8
40 à 59 ans	6,6	6,0	7,2	9,8	8,9	10,7	13,6	13,1	14,1	15,2	14,5	15,9
60 à 79 ans	7,0	6,7	7,3	10,0	9,4	10,6	13,6	12,1	15,1	16,5	14,8	18,2
6 à 79 ans	6,1	5,8	6,4	8,7	8,3	9,1	12,4	12,0	12,8	14,9	14,3	15,5
Hommes												
6 à 11 ans	5,0	4,5	5,5	7,6	6,9	8,3	10,7	10,1	11,3	13,7	12,1	15,3
12 à 19 ans	4,5	4,1	4,9	6,6	5,9	7,3	10,0	9,1	10,9	11,4	10,4	12,4
20 à 39 ans	4,3	4,0	4,6	5,8	5,4	6,2	7,3	6,3	8,3	9,1	7,6	10,6
40 à 59 ans	4,9	4,6	5,2	6,6	6,0	7,2	8,2	7,3	9,1	9,8	8,7	10,9
60 à 79 ans	5,2	4,8	5,6	6,8	6,3	7,3	8,1	7,4	8,8	9,1	8,5	9,7
6 à 79 ans	4,7	4,5	4,9	6,5	6,2	6,8	8,4	7,9	8,9	10,0	9,7	10,3
Femmes												
6 à 11 ans	5,9	5,5	6,3	8,3	7,8	8,8	11,3	10,4	12,2	12,3	11,7	12,9
12 à 19 ans	7,2	6,8	7,6	8,9	8,3	9,5	12,4	10,2	14,6	15,2	13,9	16,5
20 à 39 ans	7,6	6,6	8,6	10,3	9,4	11,2	13,7	12,6	14,8	16,6	15,3	17,9
40 à 59 ans	8,8	8,0	9,6	13,0	12,2	13,8	15,2	14,5	15,9	16,6	15,9	17,3
60 à 79 ans	9,8	9,2	10,4	12,1	10,8	13,4	16,1	14,4	17,8	17,6	16,0	19,2
6 à 79 ans	8,0	7,7	8,3	11,2	10,7	11,7	14,6	13,9	15,3	16,4	15,7	17,1

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.