

**Tableau 22**

**Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m<sup>2</sup>, selon la mesure moyenne du pli cutané du mollet, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009**

	Mesure moyenne du pli cutané du mollet											
	Moyenne			5 <sup>e</sup> percentile			10 <sup>e</sup> percentile			25 <sup>e</sup> percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
<b>Les deux sexes</b>												
6 à 11 ans	11,9	11,3	12,4	5,2	4,7	5,7	6,0	5,7	6,3	7,7	7,3	8,1
12 à 19 ans	14,0	13,3	14,7	5,2	4,7	5,7	6,1	5,7	6,5	8,7	7,9	9,5
20 à 39 ans	13,1	12,5	13,6	4,6	4,2	5,0	5,5	5,2	5,8	7,5	7,2	7,8
40 à 59 ans	14,2	13,6	14,9	4,8	4,3	5,3	6,0	5,3	6,7	8,2	7,4	9,0
60 à 79 ans	15,4	14,7	16,1	4,5	4,0	5,0	5,7	5,3	6,1	8,0	7,5	8,5
<b>6 à 79 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>13,4</b>	<b>14,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	11,4	10,6	12,1	4,8	4,2	5,4	5,6	5,2	6,0	7,2	6,6	7,8
12 à 19 ans	11,3	10,6	11,9	4,5	4,1	4,9	5,2	4,7	5,7	6,7	6,3	7,1
20 à 39 ans	9,5	8,9	10,0	4,1	3,7	4,5	4,7	4,3	5,1	6,0	5,5	6,5
40 à 59 ans	9,8	9,1	10,6	4,3	4,0	4,6	4,9	4,4	5,4	6,7	6,0	7,4
60 à 79 ans	8,8	8,4	9,2	3,5	3,0	4,0	4,5	4,1	4,9	6,0	5,6	6,4
<b>6 à 79 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,9</b>	<b>6,7</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	12,4	11,7	13,1	5,8	5,3	6,3	6,7	6,0	7,4	8,3	8,0	8,6
12 à 19 ans	16,8	15,8	17,8	7,8	7,0	8,6	9,0	8,4	9,6	12,0	11,0	13,0
20 à 39 ans	17,0	15,9	18,0	7,4	7,1	7,7	8,4	7,4	9,4	11,5	10,3	12,7
40 à 59 ans	18,4	17,6	19,2	7,6	6,8	8,4	9,4	7,9	10,9	12,6	11,9	13,3
60 à 79 ans	21,6	20,4	22,8	10,6	9,4	11,8	12,5	11,7	13,3	15,7	14,6	16,8
<b>6 à 79 ans</b>	<b>17,7</b>	<b>17,2</b>	<b>18,2</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,0</b>	<b>9,2</b>	<b>12,0</b>	<b>11,4</b>	<b>12,6</b>

	Mesure moyenne du pli cutané du mollet											
	50 <sup>e</sup> percentile			75 <sup>e</sup> percentile			90 <sup>e</sup> percentile			95 <sup>e</sup> percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
<b>Les deux sexes</b>												
6 à 11 ans	10,2	9,3	11,1	15,0	14,1	15,9	19,8	19,0	20,6	22,9	21,5	24,3
12 à 19 ans	12,7	11,9	13,5	18,2	16,8	19,6	23,3	22,3	24,3	27,4	25,8	29,0
20 à 39 ans	11,6	10,7	12,5	17,1	15,9	18,3	22,3	20,5	24,1	27,0	24,5	29,5
40 à 59 ans	12,8	11,8	13,8	18,8	17,6	20,0	25,6	24,0	27,2	28,7	27,3	30,1
60 à 79 ans	13,7	12,7	14,7	22,0	19,9	24,1	27,1	25,4	28,8	31,9	29,5	34,3
<b>6 à 79 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>11,7</b>	<b>12,7</b>	<b>18,2</b>	<b>17,6</b>	<b>18,8</b>	<b>24,4</b>	<b>23,4</b>	<b>25,4</b>	<b>28,5</b>	<b>27,4</b>	<b>29,6</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	9,3	8,2	10,4	14,4	13,1	15,7	19,9	18,9	20,9	22,8	21,5	24,1
12 à 19 ans	9,6	9,0	10,2	13,8	12,7	14,9	20,2	17,9	22,5	24,3	19,9	28,7
20 à 39 ans	8,3	7,6	9,0	12,1	10,8	13,4	16,0	14,5	17,5	18,3	16,6	20,0
40 à 59 ans	8,7	7,9	9,5	12,6	10,9	14,3	15,7	13,5	17,9	18,5	14,6	22,4
60 à 79 ans	8,0	7,6	8,4	10,8	10,2	11,4	14,4	13,3	15,5	16,6	14,6	18,6
<b>6 à 79 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>8,3</b>	<b>9,1</b>	<b>12,4</b>	<b>11,7</b>	<b>13,1</b>	<b>16,6</b>	<b>15,7</b>	<b>17,5</b>	<b>19,7</b>	<b>18,3</b>	<b>21,1</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	10,9	10,2	11,6	15,4	14,4	16,4	19,4	17,9	20,9	23,1	19,8	26,4
12 à 19 ans	16,2	15,2	17,2	20,4	19,0	21,8	25,3	22,7	27,9	29,5	26,8	32,2
20 à 39 ans	16,2	14,5	17,9	20,7	19,1	22,3	27,4	24,9	29,9	31,0	29,1	32,9
40 à 59 ans	17,5	16,3	18,7	23,3	22,0	24,6	28,7	27,4	30,0	31,3	29,7	32,9
60 à 79 ans	21,3	19,2	23,4	26,1	24,6	27,6	31,4	28,9	33,9	34,9	31,1	38,7
<b>6 à 79 ans</b>	<b>16,6</b>	<b>15,8</b>	<b>17,4</b>	<b>22,4</b>	<b>21,7</b>	<b>23,1</b>	<b>28,1</b>	<b>27,0</b>	<b>29,2</b>	<b>31,3</b>	<b>30,4</b>	<b>32,2</b>

**Note(s)** : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m<sup>2</sup>, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

**Source(s)** : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.