

Tableau 4
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la tension artérielle, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives à la tension artérielle								
	Dans les limites souhaitables			Dans les limites souhaitables, mais dans les valeurs supérieures de la normale			Au-dessus des limites souhaitables		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	95,4	93,8	96,9	3,9 ^E	2,6	5,1	F
40 à 59 ans	82,4	78,8	85,9	11,3	8,7	13,9	5,3	4,0	6,6
60 à 79 ans	66,7	64,2	69,1	15,7	12,8	18,6	13,8	11,6	15,9
18 à 79 ans	84,4	82,8	86,0	9,2	8,0	10,4	5,1	4,5	5,8
Hommes									
18 à 39 ans	93,9	91,3	96,5	4,9 ^E	2,9	7,0	F
40 à 59 ans	78,0	72,6	83,3	14,7	10,5	18,9	6,5	4,7	8,4
60 à 79 ans	69,7	65,3	74,0	15,2	10,5	19,9	13,8	10,7	16,9
18 à 79 ans	82,8	80,7	84,9	10,8	9,1	12,6	5,7	4,7	6,7
Femmes									
18 à 39 ans	96,8	94,6	99,1	F	F
40 à 59 ans	86,7	82,5	90,8	7,9 ^E	5,2	10,7	4,0 ^E	2,2	5,9
60 à 79 ans	63,9	60,7	67,1	16,1	13,9	18,3	13,8	10,3	17,3
18 à 79 ans	86,0	83,9	88,1	7,6	6,2	9,0	4,6	3,5	5,6

	Normes relatives à la tension artérielle								
	Modérément élevée			Élevée			Très élevée		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	0,7 ^E	0,3	1,1	F	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	2,4 ^E	1,4	3,4	F	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	0,8^E	0,5	1,1	F	0,0	0,0	0,0
Hommes									
18 à 39 ans	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	F	F	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	1,0 ^E	0,4	1,6	F	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	0,5^E	0,2	0,9	F	0,0	0,0	0,0
Femmes									
18 à 39 ans	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	F	F	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	3,6 ^E	1,9	5,3	F	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	1,0^E	0,5	1,6	F	0,0	0,0	0,0

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de D. Abbott, N. Campbell, P. Carruthers-Czyzewski, A. Chockalingam, M. David, G. Dunkley, E. Ellis, J.G. Fodor, D. McKay, V.R. Ramsden, 1994, « Guidelines for measurement of blood pressure, follow-up, and lifestyle counselling », *Canadian Journal of Public Health*, Vol. 85 (suppl 2), p. S29 à S35. Population à domicile âgée de 18 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.