

**Tableau 9**  
**Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux redressements assis partiels, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009**

|                       | Normes relatives aux redressements assis partiels |                         |             |                        |                         |            |                  |                         |             |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                       | À améliorer                                       |                         |             | Acceptable             |                         |            | Bien             |                         |             |
|                       | Estimation  | Intervalle de confiance |             | Estimation             | Intervalle de confiance |            | Estimation       | Intervalle de confiance |             |
|                       |   | de                      | à           |                        | de                      | à          |                  | de                      | à           |
| pourcentage           |   |                         |             |                        |                         |            |                  |                         |             |
| <b>Les deux sexes</b> |   |                         |             |                        |                         |            |                  |                         |             |
| 15 à 19 ans           | 20,9  | 16,7                    | 25,0        | 8,6 <sup>E</sup>       | 4,9                     | 12,3       | 7,6 <sup>E</sup> | 4,9                     | 10,3        |
| 20 à 39 ans           | 26,8  | 22,8                    | 30,7        | 5,5 <sup>E</sup>       | 3,5                     | 7,5        | 8,1              | 6,3                     | 9,8         |
| 40 à 59 ans           | 47,8  | 43,3                    | 52,4        | 6,5 <sup>E</sup>       | 4,2                     | 8,8        | 7,2              | 5,0                     | 9,4         |
| 60 à 69 ans           | 79,4  | 73,5                    | 85,2        | 1,6 <sup>E</sup>       | 0,8                     | 2,4        | 2,9 <sup>E</sup> | 1,4                     | 4,4         |
| <b>15 à 69 ans</b>    | <b>41,0</b>                                       | <b>37,7</b>             | <b>44,2</b> | <b>5,7</b>             | <b>4,7</b>              | <b>6,8</b> | <b>7,1</b>       | <b>5,8</b>              | <b>8,3</b>  |
| <b>Hommes</b>         |   |                         |             |                        |                         |            |                  |                         |             |
| 15 à 19 ans           | 12,2 <sup>E</sup>                                 | 7,9                     | 16,6        | 8,0 <sup>E</sup>       | 4,6                     | 11,4       | F                | ...                     | ...         |
| 20 à 39 ans           | 14,7  | 10,2                    | 19,2        | 3,9 <sup>E</sup>       | 2,0                     | 5,8        | 6,5 <sup>E</sup> | 4,1                     | 8,9         |
| 40 à 59 ans           | 34,2  | 28,5                    | 39,8        | F                      | ...                     | ...        | 5,0 <sup>E</sup> | 2,8                     | 7,2         |
| 60 à 69 ans           | 73,9  | 67,8                    | 79,9        | F                      | ...                     | ...        | 2,8 <sup>E</sup> | 1,1                     | 4,5         |
| <b>15 à 69 ans</b>    | <b>29,5</b>                                       | <b>25,6</b>             | <b>33,4</b> | <b>4,3<sup>E</sup></b> | <b>2,6</b>              | <b>6,1</b> | <b>5,4</b>       | <b>3,9</b>              | <b>6,9</b>  |
| <b>Femmes</b>         |   |                         |             |                        |                         |            |                  |                         |             |
| 15 à 19 ans           | 28,7  | 21,4                    | 36,0        | 9,2 <sup>E</sup>       | 4,5                     | 13,9       | 9,1              | 6,6                     | 11,6        |
| 20 à 39 ans           | 39,0  | 33,5                    | 44,5        | 7,2 <sup>E</sup>       | 3,6                     | 10,7       | 9,6              | 6,6                     | 12,7        |
| 40 à 59 ans           | 61,8  | 54,6                    | 69,1        | 8,1                    | 5,6                     | 10,6       | 9,5              | 6,5                     | 12,5        |
| 60 à 69 ans           | 85,1  | 77,8                    | 92,4        | 2,0 <sup>E</sup>       | 0,8                     | 3,3        | F                | ...                     | ...         |
| <b>15 à 69 ans</b>    | <b>52,5</b>                                       | <b>48,5</b>             | <b>56,6</b> | <b>7,1</b>             | <b>5,8</b>              | <b>8,4</b> | <b>8,7</b>       | <b>7,0</b>              | <b>10,4</b> |

  

|                       | Normes relatives aux redressements assis partiels |                         |             |                   |                         |             |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
|                       | Très bien   |                         |             | Excellent         |                         |             |
|                       | Estimation  | Intervalle de confiance |             | Estimation        | Intervalle de confiance |             |
|                       |   | de                      | à           |                   | de                      | à           |
| pourcentage           |   |                         |             |                   |                         |             |
| <b>Les deux sexes</b> |   |                         |             |                   |                         |             |
| 15 à 19 ans           | 12,6  | 9,9                     | 15,3        | 50,3              | 43,5                    | 57,1        |
| 20 à 39 ans           | 16,5  | 14,6                    | 18,3        | 43,2              | 39,0                    | 47,4        |
| 40 à 59 ans           | 13,5  | 10,1                    | 16,9        | 24,9              | 22,7                    | 27,1        |
| 60 à 69 ans           | 8,3 <sup>E</sup>                                  | 5,2                     | 11,4        | 7,8 <sup>E</sup>  | 5,1                     | 10,5        |
| <b>15 à 69 ans</b>    | <b>14,0</b>                                       | <b>12,0</b>             | <b>16,0</b> | <b>32,3</b>       | <b>29,6</b>             | <b>34,9</b> |
| <b>Hommes</b>         |   |                         |             |                   |                         |             |
| 15 à 19 ans           | 9,8 <sup>E</sup>                                  | 6,4                     | 13,3        | 63,9              | 57,9                    | 69,9        |
| 20 à 39 ans           | 19,5  | 14,5                    | 24,5        | 55,5              | 49,2                    | 61,7        |
| 40 à 59 ans           | 19,8  | 14,5                    | 25,1        | 36,0              | 33,2                    | 38,8        |
| 60 à 69 ans           | 10,4  | 7,4                     | 13,4        | 11,7 <sup>E</sup> | 7,7                     | 15,7        |
| <b>15 à 69 ans</b>    | <b>17,7</b>                                       | <b>14,2</b>             | <b>21,2</b> | <b>43,0</b>       | <b>39,9</b>             | <b>46,2</b> |
| <b>Femmes</b>         |   |                         |             |                   |                         |             |
| 15 à 19 ans           | 15,0  | 11,0                    | 19,0        | 38,0              | 26,0                    | 50,0        |
| 20 à 39 ans           | 13,5  | 10,7                    | 16,2        | 30,8              | 26,1                    | 35,4        |
| 40 à 59 ans           | 7,1 <sup>E</sup>                                  | 3,9                     | 10,3        | 13,5              | 10,3                    | 16,7        |
| 60 à 69 ans           | F   | ...                     | ...         | 3,7 <sup>E</sup>  | 1,7                     | 5,8         |
| <b>15 à 69 ans</b>    | <b>10,2</b>                                       | <b>8,5</b>              | <b>12,0</b> | <b>21,4</b>       | <b>18,6</b>             | <b>24,1</b> |

<sup>E</sup> à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

<sup>F</sup> trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

**Note(s)** : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

**Source(s)** : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.