

Tableau 10
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la santé du dos, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives à la santé du dos									
	À améliorer			Acceptable			Bien			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à	
pourcentage										
Les deux sexes										
15 à 19 ans	6,2 ^E	3,7	8,7	11,4	7,9	15,0	21,1	17,4	24,7	
20 à 39 ans	11,9	8,8	15,0	13,9	11,0	16,8	18,8	14,6	23,0	
40 à 59 ans	18,3	13,9	22,8	19,8	16,8	22,9	22,2	18,7	25,8	
60 à 69 ans	29,4	26,3	32,5	32,1	26,9	37,2	19,0	15,5	22,5	
15 à 69 ans	16,3	13,8	18,9	18,5	16,7	20,4	20,4	18,3	22,6	
Hommes										
15 à 19 ans	F	9,7 ^E	6,2	13,2	28,7	22,5	34,9	
20 à 39 ans	6,6 ^E	3,0	10,1	14,9	11,9	18,0	20,8	14,8	26,8	
40 à 59 ans	13,8	10,5	17,1	20,0	15,0	25,0	23,5	18,2	28,7	
60 à 69 ans	28,0	23,2	32,8	32,4	25,7	39,1	20,7	15,4	25,9	
15 à 69 ans	12,0	9,9	14,1	18,8	16,7	21,0	22,5	19,4	25,6	
Femmes										
15 à 19 ans	8,8 ^E	5,2	12,4	12,9 ^E	5,4	20,5	14,3 ^E	8,5	20,2	
20 à 39 ans	17,4	13,5	21,4	12,8	8,9	16,8	16,7	11,8	21,5	
40 à 59 ans	22,8 ^E	15,0	30,5	19,7	14,2	25,1	21,0	17,2	24,8	
60 à 69 ans	30,7	24,6	36,8	31,7	25,7	37,8	17,5	13,0	21,9	
15 à 69 ans	20,6	16,2	25,0	18,2	14,6	21,8	18,3	15,5	21,2	

	Normes relatives à la santé du dos					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	47,4	43,0	51,9	13,9	9,5	18,3
20 à 39 ans	38,8	35,7	41,9	16,6	13,9	19,3
40 à 59 ans	27,0	22,3	31,6	12,7	10,7	14,6
60 à 69 ans	14,4	10,6	18,2	5,1 ^E	3,3	6,8
15 à 69 ans	31,5	29,0	34,0	13,2	12,0	14,5
Hommes						
15 à 19 ans	51,1	44,9	57,3	7,3 ^E	3,3	11,3
20 à 39 ans	41,0	36,2	45,8	16,7	13,6	19,8
40 à 59 ans	25,5	19,8	31,3	17,2	14,0	20,4
60 à 69 ans	13,8	9,8	17,8	5,1 ^E	3,3	6,8
15 à 69 ans	32,0	29,4	34,6	14,6	13,3	16,0
Femmes						
15 à 19 ans	44,2	37,3	51,2	19,7 ^E	13,2	26,2
20 à 39 ans	36,5	32,2	40,9	16,5	13,3	19,7
40 à 59 ans	28,4	22,3	34,5	8,2 ^E	5,4	10,9
60 à 69 ans	15,0 ^E	9,9	20,1	5,1 ^E	2,2	8,0
15 à 69 ans	31,0	26,4	35,5	11,8	10,1	13,6

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.