

Tableau 13

Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques									
	À améliorer			Acceptable			Bien			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à	
pourcentage										
<b>Les deux sexes</b>										
15 à 19 ans	14,4 <sup>E</sup>	9,3	19,5	31,8	28,1	35,6	29,4	22,9	35,8	
20 à 39 ans	10,6	8,3	13,0	30,0	26,3	33,8	30,1	26,6	33,5	
40 à 59 ans	11,0	8,8	13,2	25,1	20,7	29,4	33,0	29,0	37,1	
60 à 69 ans	17,3	13,5	21,0	31,6	27,7	35,6	31,7	27,3	36,1	
<b>15 à 69 ans</b>	<b>12,0</b>	<b>10,0</b>	<b>14,0</b>	<b>28,4</b>	<b>25,8</b>	<b>31,0</b>	<b>31,4</b>	<b>29,2</b>	<b>33,7</b>	
<b>Hommes</b>										
15 à 19 ans	9,8 <sup>E</sup>	4,5	15,1	35,9	28,9	43,0	29,7	20,8	38,7	
20 à 39 ans	4,2 <sup>E</sup>	2,5	5,8	26,2	21,3	31,1	32,1	26,1	38,1	
40 à 59 ans	5,3 <sup>E</sup>	3,0	7,6	23,9	18,8	28,9	29,6	23,6	35,6	
60 à 69 ans	16,3	11,9	20,7	44,3	36,7	51,8	25,0	18,7	31,2	
<b>15 à 69 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>5,1</b>	<b>8,2</b>	<b>28,4</b>	<b>25,0</b>	<b>31,7</b>	<b>30,0</b>	<b>27,4</b>	<b>32,5</b>	
<b>Femmes</b>										
15 à 19 ans	18,5 <sup>E</sup>	12,5	24,5	28,2	20,1	36,2	29,0	20,1	38,0	
20 à 39 ans	17,2	12,7	21,6	33,9	29,0	38,9	28,0	23,1	32,9	
40 à 59 ans	16,7	11,7	21,6	26,2	21,5	30,9	36,4	31,7	41,2	
60 à 69 ans	18,1	13,2	23,1	19,8	14,5	25,0	38,0	33,1	42,9	
<b>15 à 69 ans</b>	<b>17,2</b>	<b>13,3</b>	<b>21,1</b>	<b>28,4</b>	<b>25,7</b>	<b>31,1</b>	<b>32,9</b>	<b>29,9</b>	<b>35,8</b>	

  

	Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
<b>Les deux sexes</b>						
15 à 19 ans	19,1	15,0	23,2	5,3 <sup>E</sup>	2,7	7,9
20 à 39 ans	23,3	20,8	25,7	6,0	4,2	7,8
40 à 59 ans	22,7	20,0	25,4	8,2	6,5	9,9
60 à 69 ans	15,8	12,6	18,9	3,7	2,9	4,4
<b>15 à 69 ans</b>	<b>21,7</b>	<b>20,2</b>	<b>23,2</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>7,3</b>
<b>Hommes</b>						
15 à 19 ans	20,0	15,0	25,1	4,5 <sup>E</sup>	1,8	7,2
20 à 39 ans	30,5	25,2	35,8	7,0 <sup>E</sup>	3,9	10,2
40 à 59 ans	28,6	24,1	33,2	12,6	9,1	16,2
60 à 69 ans	11,1 <sup>E</sup>	6,2	16,0	3,3 <sup>E</sup>	1,4	5,2
<b>15 à 69 ans</b>	<b>26,4</b>	<b>23,5</b>	<b>29,3</b>	<b>8,6</b>	<b>7,3</b>	<b>9,9</b>
<b>Femmes</b>						
15 à 19 ans	18,3	12,8	23,8	6,0 <sup>E</sup>	2,6	9,4
20 à 39 ans	15,9	13,1	18,7	4,9 <sup>E</sup>	2,5	7,3
40 à 59 ans	16,8	12,7	21,0	3,9 <sup>E</sup>	1,8	6,0
60 à 69 ans	20,2 <sup>E</sup>	13,6	26,7	4,0 <sup>E</sup>	2,0	6,0
<b>15 à 69 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>14,9</b>	<b>19,3</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>

<sup>E</sup> à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)**Note(s)** : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).**Source(s)** : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.