

Tableau 27

Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole								
	Ni embonpoint ni obèse			Embonpoint			Obèse		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
	pourcentage								
<b>Les deux sexes</b>									
6 à 11 ans	69,1	63,9	74,3	19,3	14,7	23,9	11,6	8,2	15,1
12 à 17 ans	76,2	68,1	84,3	15,5	10,7	20,3	8,3 <sup>E</sup>	3,4	13,1
<b>6 à 17 ans</b>	<b>73,2</b>	<b>67,6</b>	<b>78,7</b>	<b>17,1</b>	<b>12,9</b>	<b>21,3</b>	<b>9,7</b>	<b>7,1</b>	<b>12,4</b>
<b>Hommes</b>									
6 à 11 ans	64,1	56,5	71,7	22,7	17,9	27,5	13,2 <sup>E</sup>	7,8	18,6
12 à 17 ans	71,6	63,1	80,2	16,8	13,5	20,1	11,6 <sup>E</sup>	4,8	18,3
<b>6 à 17 ans</b>	<b>68,5</b>	<b>62,5</b>	<b>74,5</b>	<b>19,3</b>	<b>15,8</b>	<b>22,8</b>	<b>12,2</b>	<b>8,3</b>	<b>16,2</b>
<b>Femmes</b>									
6 à 11 ans	74,4	69,0	79,7	15,6 <sup>E</sup>	10,2	21,1	10,0	7,3	12,7
12 à 17 ans	81,7	72,5	90,8	14,0 <sup>E</sup>	6,9	21,0	F	...	...
<b>6 à 17 ans</b>	<b>78,4</b>	<b>72,2</b>	<b>84,6</b>	<b>14,7<sup>E</sup></b>	<b>9,1</b>	<b>20,3</b>	<b>6,9</b>	<b>5,2</b>	<b>8,5</b>

<sup>E</sup> à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

<sup>F</sup> trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

**Note(s)** : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de T.J. Cole, M.C. Bellizzi, K.M. Flegal & W.H. Diets, 2000, "Establishing a Standard Definition for Child Overweight and Obesity Worldwide : International survey," *The BMJ*, Vol. 320, p. 1240-1243. Population à domicile âgée de 6 à 17 ans.

**Source(s)** : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.