

Tableau 28

Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées								
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	3,3 ^E	1,6	4,9	53,2	48,9	57,5	28,5	24,9	32,0
40 à 59 ans	1,0 ^E	0,6	1,3	37,3	33,0	41,6	38,2	33,6	42,8
60 à 79 ans	F	33,8	28,4	39,3	41,7	37,3	46,1
18 à 79 ans	1,8^E	1,2	2,5	42,9	39,2	46,5	35,1	32,4	37,7
Hommes									
18 à 39 ans	F	49,0	44,7	53,3	35,1	31,8	38,3
40 à 59 ans	F	25,0	19,6	30,3	49,9	42,8	56,9
60 à 79 ans	F	31,3	25,1	37,4	43,4	37,6	49,2
18 à 79 ans	0,7^E	0,3	1,1	35,9	32,0	39,7	42,7	39,3	46,0
Femmes									
18 à 39 ans	5,6 ^E	2,4	8,7	57,7	52,2	63,1	21,5	15,6	27,4
40 à 59 ans	1,4	1,0	1,7	49,7	44,8	54,6	26,3	22,2	30,5
60 à 79 ans	F	36,2	29,8	42,6	40,2	34,8	45,6
18 à 79 ans	2,9^E	1,8	4,1	50,0	45,6	54,3	27,4	24,6	30,2
	Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées								
	Obésité, classe I			Obésité, classe II			Obésité, classe III		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
	pourcentage								
Les deux sexes									
18 à 39 ans	9,5	7,2	11,8	4,1 ^E	1,8	6,4	1,4 ^E	0,6	2,3
40 à 59 ans	17,0	12,7	21,3	4,3	3,2	5,4	2,3 ^E	1,4	3,3
60 à 79 ans	17,7	14,9	20,5	4,4 ^E	2,9	5,8	1,6 ^E	1,1	2,2
18 à 79 ans	14,2	12,2	16,2	4,2	3,1	5,4	1,8^E	1,2	2,5
Hommes									
18 à 39 ans	9,9 ^E	6,2	13,6	F	0,8 ^E	0,4	1,3
40 à 59 ans	18,8	13,1	24,5	3,9 ^E	2,5	5,2	1,9 ^E	0,7	3,2
60 à 79 ans	19,4	15,9	22,9	4,4 ^E	3,0	5,8	F
18 à 79 ans	15,3	12,5	18,2	4,1^E	2,6	5,6	1,3^E	0,7	2,0
Femmes									
18 à 39 ans	9,1	6,8	11,3	F	F
40 à 59 ans	15,1	11,1	19,1	4,8 ^E	3,0	6,5	F
60 à 79 ans	16,1	12,6	19,5	4,3 ^E	1,6	7,0	2,1 ^E	1,3	2,9
18 à 79 ans	13,0	11,2	14,8	4,4^E	2,8	6,0	2,3^E	1,0	3,7

E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Santé Canada. 2003. « Description des "Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes" », *Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, produit no H49-179/2003F au catalogue de Santé Canada, p. 9 à 13, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/weight_book_tc-livres_des_poids_tm-fra.php (site consulté le 19 décembre 2006). Population à domicile âgée de 18 à 79 ans.*

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.