

Tableau 34

Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode Cole								
	Ni embonpoint ni obèse			Embonpoint			Obèse		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
	pourcentage								
Les deux sexes									
6 à 11 ans	76,8	74,1	79,5	16,8	13,8	19,7	6,4	4,7	8,2
12 à 17 ans	72,1	65,6	78,7	17,4	13,8	21,0	10,5 ^E	5,2	15,8
6 à 17 ans	74,3	69,9	78,7	17,1	14,2	20,0	8,6	5,9	11,3
Hommes									
6 à 11 ans	75,8	72,7	78,8	17,2	13,7	20,6	7,1	5,0	9,1
12 à 17 ans	70,7	64,3	77,1	16,9	13,5	20,3	12,4 ^E	5,4	19,4
6 à 17 ans	73,0	69,0	77,0	17,0	14,3	19,7	10,0^E	6,3	13,7
Femmes									
6 à 11 ans	77,9	73,8	82,0	16,3	11,6	21,1	5,8 ^E	2,9	8,6
12 à 17 ans	73,8	65,2	82,4	18,0	12,4	23,5	8,3 ^E	3,8	12,7
6 à 17 ans	75,7	70,3	81,2	17,2	13,3	21,1	7,1	4,8	9,3

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de T.J. Cole, M.C. Bellizzi, K.M. Flegal & W.H. Diets, 2000, "Establishing a Standard Definition for Child Overweight and Obesity Worldwide : International survey," *The BMJ*, Vol. 320, p. 1240-1243. Population à domicile âgée de 6 à 17 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.