

Tableau 35

Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées									
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à	
pourcentage										
Les deux sexes										
18 à 39 ans	3,0 ^E	1,6	4,4	48,2	42,8	53,7	29,7	25,4	33,9	
40 à 59 ans	F	32,7	28,0	37,4	41,4	38,0	44,8	
60 à 79 ans	F	27,9	22,5	33,3	41,2	37,2	45,3	
18 à 79 ans	1,5^E	0,9	2,1	37,9	33,3	42,4	36,7	33,7	39,7	
Hommes										
18 à 39 ans	F	44,2	39,1	49,4	36,2	29,4	43,0	
40 à 59 ans	F	20,6	15,2	26,0	51,9	47,1	56,7	
60 à 79 ans	F	24,7	19,4	30,1	44,3	39,7	48,8	
18 à 79 ans	0,8^E	0,3	1,2	31,0	26,6	35,4	44,1	39,6	48,5	
Femmes										
18 à 39 ans	5,0 ^E	2,4	7,6	52,4	44,5	60,4	22,9	17,3	28,5	
40 à 59 ans	F	44,6	39,7	49,5	31,0	27,1	35,0	
60 à 79 ans	F	30,8	24,6	37,1	38,4	33,8	43,1	
18 à 79 ans	2,2^E	1,2	3,2	44,7	39,0	50,4	29,5	26,6	32,3	
	Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées									
	Obésité, classe I			Obésité, classe II			Obésité, classe III			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à	
pourcentage										
Les deux sexes										
18 à 39 ans	11,3	9,8	12,7	5,0	3,4	6,5	2,8 ^E	1,6	4,0	
40 à 59 ans	15,9	12,8	19,0	6,3 ^E	4,2	8,5	3,2	2,2	4,2	
60 à 79 ans	21,0	16,1	25,8	6,5	4,5	8,5	3,0 ^E	1,9	4,1	
18 à 79 ans	15,1	13,3	16,9	5,8	4,7	7,0	3,0	2,3	3,7	
Hommes										
18 à 39 ans	12,4	9,3	15,6	4,6 ^E	2,9	6,3	1,4 ^E	0,8	2,0	
40 à 59 ans	19,9	15,0	24,9	3,7 ^E	2,0	5,4	3,3 ^E	1,8	4,8	
60 à 79 ans	22,8	16,5	29,1	6,3	4,3	8,4	F	
18 à 79 ans	17,4	14,7	20,2	4,6	3,6	5,6	2,2	1,5	2,8	
Femmes										
18 à 39 ans	10,1	7,4	12,8	5,3 ^E	2,6	8,0	4,3 ^E	2,1	6,5	
40 à 59 ans	11,9	9,3	14,5	8,9 ^E	5,8	12,0	3,1 ^E	1,1	5,1	
60 à 79 ans	19,2	14,3	24,2	6,7 ^E	3,6	9,8	4,4 ^E	2,7	6,0	
18 à 79 ans	12,7	10,6	14,9	7,1	5,4	8,8	3,8^E	2,4	5,3	

E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Santé Canada. 2003. « Description des "Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes" », Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, produit no H49-179/2003F au catalogue de Santé Canada, p. 9 à 13, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/weight_book_tc-livres_des_poids_tm-fra.php (site consulté le 19 décembre 2006). Population à domicile âgée de 18 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.