

Tableau 43
Distribution de la population à domicile selon la concentration d'homocystéine dans le plasma, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration d'homocystéine dans le plasma											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	micromoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,0	3,6	4,4	2,0	1,7	2,3	2,3	2,0	2,6	3,0	2,7	3,3
12 à 19 ans	5,8	5,5	6,0	3,2	2,8	3,6	3,7	3,5	3,9	4,5	4,3	4,7
20 à 39 ans	7,1	6,7	7,4	3,7	3,3	4,1	4,2	3,8	4,6	5,4	5,0	5,8
40 à 59 ans	8,1	7,7	8,4	4,6	4,3	4,9	5,2	4,9	5,5	6,2	5,9	6,5
60 à 79 ans	9,8	9,4	10,2	5,6	5,0	6,2	6,4	6,0	6,8	7,6	7,1	8,1
6 à 19 ans	5,1	4,9	5,4	2,3	2,0	2,6	2,8	2,5	3,1	3,8	3,6	4,0
20 à 79 ans	8,1	7,7	8,4	4,2	3,8	4,6	4,9	4,5	5,3	6,1	5,7	6,5
6 à 79 ans	7,5	7,2	7,9	3,5	3,2	3,8	4,2	3,9	4,5	5,5	5,2	5,8
Hommes												
6 à 11 ans	4,1	3,7	4,4	2,1	1,9	2,3	2,4	2,0	2,8	3,0	2,7	3,3
12 à 19 ans	6,1	5,8	6,4	3,5	3,3	3,7	3,8	3,6	4,0	4,5	4,2	4,8
20 à 39 ans	8,1	7,7	8,5	5,2	4,5	5,9	5,6	5,3	5,9	6,5	6,1	6,9
40 à 59 ans	8,9	8,5	9,2	5,5	5,2	5,8	6,1	5,8	6,4	7,0	6,6	7,4
60 à 79 ans	10,4	9,8	11,0	5,8	4,9	6,7	6,6	6,0	7,2	8,0	7,4	8,6
6 à 19 ans	5,3	5,1	5,6	2,5	2,1	2,9	3,0	2,7	3,3	3,9	3,7	4,1
20 à 79 ans	8,9	8,5	9,2	5,4	5,0	5,8	5,8	5,4	6,2	6,9	6,6	7,2
6 à 79 ans	8,2	7,9	8,6	3,9	3,6	4,2	4,8	4,4	5,2	6,2	5,9	6,5
Femmes												
6 à 11 ans	3,9	3,5	4,3	1,9	1,5	2,3	2,2	1,8	2,6	2,9	2,5	3,3
12 à 19 ans	5,5	5,1	5,9	2,9	2,4	3,4	3,5	3,1	3,9	4,4	4,0	4,8
20 à 39 ans	6,0	5,6	6,4	3,2	2,8	3,6	3,7	3,4	4,0	4,6	4,2	5,0
40 à 59 ans	7,3	6,9	7,7	4,1	3,7	4,5	4,7	4,4	5,0	5,6	5,3	5,9
60 à 79 ans	9,3	8,9	9,7	5,5	5,0	6,0	6,2	5,8	6,6	7,3	6,9	7,7
6 à 19 ans	4,9	4,5	5,3	2,2	1,8	2,6	2,7	2,3	3,1	3,7	3,3	4,1
20 à 79 ans	7,2	6,9	7,6	3,7	3,4	4,0	4,3	4,0	4,6	5,4	5,0	5,8
6 à 79 ans	6,8	6,5	7,2	3,2	2,8	3,6	3,8	3,5	4,1	4,9	4,5	5,3

	Concentration d'homocystéine dans le plasma											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	micromoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	3,9	3,5	4,3	4,8	4,4	5,2	5,9	5,2	6,6	6,7	6,1	7,3
12 à 19 ans	5,5	5,3	5,7	6,7	6,3	7,1	8,1	7,7	8,5	8,9	8,4	9,4
20 à 39 ans	6,8	6,5	7,1	8,3	8,0	8,6	10,1	9,4	10,8	11,8	11,1	12,5
40 à 59 ans	7,6	7,2	8,0	9,3	8,9	9,7	11,4	10,7	12,1	13,3	12,2	14,4
60 à 79 ans	9,2	8,8	9,6	11,2	10,8	11,6	13,7	13,1	14,3	16,5	15,4	17,6
6 à 19 ans	4,8	4,5	5,1	6,2	5,8	6,6	7,6	7,1	8,1	8,4	8,1	8,7
20 à 79 ans	7,6	7,2	8,0	9,4	9,0	9,8	11,7	11,3	12,1	13,5	12,9	14,1
6 à 79 ans	7,1	6,7	7,5	8,9	8,5	9,3	11,2	10,8	11,6	13,1	12,5	13,7
Hommes												
6 à 11 ans	3,9	3,6	4,2	4,9	4,4	5,4	6,1	5,2	7,0	6,9	6,3	7,5
12 à 19 ans	5,6	5,4	5,8	7,0	6,6	7,4	8,5	8,2	8,8	9,3	8,7	9,9
20 à 39 ans	7,7	7,4	8,0	9,2	8,5	9,9	11,3	10,3	12,3	12,7	11,5	13,9
40 à 59 ans	8,4	7,9	8,9	10,1	9,6	10,6	12,2	11,5	12,9	14,0	12,9	15,1
60 à 79 ans	9,8	9,4	10,2	11,8	10,9	12,7	14,7	13,4	16,0	17,7	16,6	18,8
6 à 19 ans	5,0	4,6	5,4	6,5	6,1	6,9	8,0	7,4	8,6	8,6	8,3	8,9
20 à 79 ans	8,3	7,9	8,7	10,2	9,7	10,7	12,5	11,9	13,1	14,3	13,6	15,0
6 à 79 ans	7,9	7,5	8,3	9,7	9,3	10,1	12,0	11,6	12,4	14,0	13,4	14,6
Femmes												
6 à 11 ans	3,8	3,3	4,3	4,8	4,4	5,2	5,8	5,2	6,4	6,5	5,9	7,1
12 à 19 ans	5,3	4,9	5,7	6,6	6,1	7,1	7,7	7,0	8,4	8,2	7,1	9,3
20 à 39 ans	5,8	5,2	6,4	7,1	6,7	7,5	8,4	7,8	9,0	9,4	8,5	10,3
40 à 59 ans	7,0	6,4	7,6	8,3	7,9	8,7	10,0	9,2	10,8	11,6	10,3	12,9
60 à 79 ans	8,6	8,2	9,0	10,7	10,4	11,0	12,9	12,5	13,3	14,9	13,6	16,2
6 à 19 ans	4,7	4,5	4,9	6,0	5,5	6,5	7,3	6,7	7,9	8,0	7,3	8,7
20 à 79 ans	6,8	6,4	7,2	8,4	8,0	8,8	10,6	10,1	11,1	12,3	11,6	13,0
6 à 79 ans	6,5	6,2	6,8	8,1	7,7	8,5	10,1	9,6	10,6	11,8	11,2	12,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection d'homocystéine dans le plasma, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.