

Tableau 45

Distribution de la population à domicile (échantillon total) selon la concentration de cholestérol total dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de cholestérol total dans le sérum - échantillon total											
	Moyenne		5 <sup>e</sup> percentile		10 <sup>e</sup> percentile		25 <sup>e</sup> percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
<b>Les deux sexes</b>												
6 à 11 ans	4,2	4,2	4,3	3,3	3,2	3,4	3,5	3,4	3,6	3,8	3,7	3,9
12 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	3,0	2,8	3,2	3,2	3,1	3,3	3,6	3,5	3,7
20 à 39 ans	4,8	4,7	4,8	3,4	3,2	3,6	3,7	3,6	3,8	4,1	4,0	4,2
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	3,7	3,4	4,0	4,0	3,8	4,2	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,2	5,1	5,3	3,5	3,3	3,7	3,8	3,7	3,9	4,4	4,2	4,6
6 à 19 ans	4,1	4,1	4,2	3,0	2,9	3,1	3,3	3,2	3,4	3,7	3,6	3,8
20 à 79 ans	5,0	5,0	5,1	3,5	3,3	3,7	3,8	3,7	3,9	4,3	4,2	4,4
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	4,3	4,2	4,3	3,4	3,3	3,5	3,5	3,4	3,6	3,8	3,7	3,9
12 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	3,0	2,8	3,2	3,2	3,1	3,3	3,5	3,4	3,6
20 à 39 ans	4,8	4,7	5,0	3,5	3,3	3,7	3,7	3,6	3,8	4,2	4,1	4,3
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	3,6	3,2	4,0	4,0	3,7	4,3	4,5	4,3	4,7
60 à 79 ans	5,1	4,9	5,2	3,2	3,0	3,4	3,6	3,4	3,8	4,2	4,0	4,4
6 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	3,1	3,0	3,2	3,3	3,2	3,4	3,6	3,5	3,7
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,2	3,4	3,2	3,6	3,8	3,6	4,0	4,3	4,1	4,5
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	3,2	3,0	3,4	3,3	3,2	3,4	3,8	3,7	3,9
12 à 19 ans	4,2	4,0	4,3	2,9	2,6	3,2	3,2	3,0	3,4	3,7	3,5	3,9
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,8	3,4	3,1	3,7	3,6	3,4	3,8	4,1	4,0	4,2
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,4	3,7	3,5	3,9	4,0	3,8	4,2	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,4	5,3	5,5	3,6	3,3	3,9	3,9	3,7	4,1	4,7	4,5	4,9
6 à 19 ans	4,2	4,1	4,3	3,0	2,8	3,2	3,3	3,2	3,4	3,7	3,6	3,8
20 à 79 ans	5,1	5,0	5,1	3,5	3,3	3,7	3,8	3,7	3,9	4,4	4,3	4,5
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>	<b>5,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>

  

	Concentration de cholestérol total dans le sérum - échantillon total											
	50 <sup>e</sup> percentile		75 <sup>e</sup> percentile		90 <sup>e</sup> percentile		95 <sup>e</sup> percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
<b>Les deux sexes</b>												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	4,6	4,5	4,7	5,0	4,9	5,1	5,3	5,2	5,4
12 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	4,5	4,3	4,7	5,2	5,0	5,4	5,5	5,3	5,7
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,8	5,3	5,2	5,4	6,0	5,8	6,2	6,4	6,2	6,6
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	5,9	5,7	6,1	6,5	6,4	6,6	6,9	6,7	7,1
60 à 79 ans	5,3	5,2	5,4	6,1	6,0	6,2	6,7	6,6	6,8	7,1	6,9	7,3
6 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	4,6	4,5	4,7	5,1	4,9	5,3	5,4	5,3	5,5
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,7	5,6	5,8	6,4	6,3	6,5	6,8	6,7	6,9
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>
<b>Hommes</b>												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	4,6	4,5	4,7	5,0	4,9	5,1	5,3	5,2	5,4
12 à 19 ans	3,9	3,8	4,0	4,4	4,2	4,6	5,0	4,7	5,3	5,4	5,0	5,8
20 à 39 ans	4,8	4,6	5,0	5,5	5,4	5,6	6,1	5,9	6,3	6,3	6,1	6,5
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	5,8	5,6	6,0	6,5	6,4	6,6	6,9	6,5	7,3
60 à 79 ans	5,1	4,9	5,3	5,8	5,6	6,0	6,6	6,3	6,9	7,0	6,8	7,2
6 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	4,5	4,4	4,6	5,0	4,8	5,2	5,4	5,2	5,6
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,7	5,5	5,9	6,3	6,2	6,4	6,7	6,5	6,9
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>
<b>Femmes</b>												
6 à 11 ans	4,3	4,2	4,4	4,7	4,6	4,8	5,1	4,9	5,3	5,4	5,3	5,5
12 à 19 ans	4,1	3,9	4,3	4,6	4,4	4,8	5,2	5,0	5,4	5,6	5,4	5,8
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	5,1	5,0	5,2	5,9	5,6	6,2	6,4	6,3	6,5
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,4	5,9	5,7	6,1	6,5	6,3	6,7	7,0	6,5	7,5
60 à 79 ans	5,4	5,3	5,5	6,1	6,0	6,2	6,7	6,5	6,9	7,1	6,9	7,3
6 à 19 ans	4,2	4,1	4,3	4,6	4,5	4,7	5,2	5,1	5,3	5,4	5,2	5,6
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,7	5,5	5,9	6,4	6,3	6,5	6,9	6,7	7,1
<b>6 à 79 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur l' échantillon total, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.