

Tableau 46

Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de cholestérol total dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de cholestérol total dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,2	4,0	4,3	3,1	2,8	3,4	3,3	3,1	3,5	3,7	3,5	3,9
12 à 19 ans	3,9	3,8	4,1	2,8	2,5	3,1	3,0	2,9	3,1	3,4	3,3	3,5
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	3,1	2,8	3,4	3,6	3,3	3,9	3,9	3,7	4,1
40 à 59 ans	5,1	4,9	5,2	3,5	3,2	3,8	3,8	3,5	4,1	4,3	4,2	4,4
60 à 79 ans	5,2	5,0	5,3	3,2	3,0	3,4	3,7	3,5	3,9	4,3	4,1	4,5
6 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	2,9	2,7	3,1	3,1	2,9	3,3	3,5	3,4	3,6
20 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	3,3	3,0	3,6	3,7	3,5	3,9	4,1	4,0	4,2
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,9	3,1	2,9	3,3	3,5	3,3	3,7	4,0	3,8	4,2
Hommes												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	3,3	3,1	3,5	3,4	3,2	3,6	3,8	3,6	4,0
12 à 19 ans	3,9	3,7	4,0	2,8	2,4	3,2	3,1	2,9	3,3	3,4	3,3	3,5
20 à 39 ans	4,7	4,5	4,8	3,3	3,0	3,6	3,6	3,4	3,8	3,9	3,7	4,1
40 à 59 ans	5,0	4,8	5,1	3,4	3,0	3,8	3,7	3,4	4,0	4,3	4,1	4,5
60 à 79 ans	5,0	4,7	5,2	3,1	2,8	3,4	3,5	3,1	3,9	4,1	3,8	4,4
6 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	3,0	2,8	3,2	3,2	3,1	3,3	3,5	3,4	3,6
20 à 79 ans	4,9	4,7	5,0	3,3	3,1	3,5	3,7	3,5	3,9	4,1	3,9	4,3
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,8	3,2	3,0	3,4	3,5	3,3	3,7	3,9	3,7	4,1
Femmes												
6 à 11 ans	4,1	3,9	4,3	3,0	2,5	3,5	3,2	2,8	3,6	3,6	3,3	3,9
12 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	2,8	2,4	3,2	3,0	2,7	3,3	3,5	3,3	3,7
20 à 39 ans	4,5	4,3	4,7	3,1	2,6	3,6	3,4	3,0	3,8	3,9	3,7	4,1
40 à 59 ans	5,2	4,9	5,4	3,6	3,1	4,1	3,9	3,6	4,2	4,4	4,2	4,6
60 à 79 ans	5,4	5,2	5,5	3,7	3,3	4,1	3,9	3,6	4,2	4,6	4,3	4,9
6 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	2,8	2,5	3,1	3,0	2,8	3,2	3,5	3,3	3,7
20 à 79 ans	5,0	4,8	5,1	3,4	3,1	3,7	3,7	3,5	3,9	4,2	4,1	4,3
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	3,1	2,8	3,4	3,5	3,3	3,7	4,0	3,9	4,1

	Concentration de cholestérol total dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,2	4,0	4,4	4,5	4,4	4,6	5,0	4,8	5,2	5,4	5,2	5,6
12 à 19 ans	3,8	3,6	4,0	4,4	4,2	4,6	4,9	4,6	5,2	5,2	4,9	5,5
20 à 39 ans	4,5	4,3	4,7	5,2	5,0	5,4	5,8	5,6	6,0	6,1	5,9	6,3
40 à 59 ans	5,1	4,9	5,3	5,7	5,4	6,0	6,5	6,2	6,8	6,7	6,3	7,1
60 à 79 ans	5,3	5,1	5,5	6,0	5,8	6,2	6,6	6,5	6,7	7,0	6,8	7,2
6 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	4,5	4,4	4,6	5,0	4,8	5,2	5,3	5,1	5,5
20 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	5,5	5,3	5,7	6,3	6,1	6,5	6,6	6,4	6,8
6 à 79 ans	4,6	4,5	4,7	5,4	5,3	5,5	6,1	6,0	6,2	6,6	6,5	6,7
Hommes												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	4,5	4,4	4,6	5,1	4,9	5,3	5,4	5,2	5,6
12 à 19 ans	3,8	3,7	3,9	4,3	4,0	4,6	4,9	4,6	5,2	5,2	4,9	5,5
20 à 39 ans	4,6	4,3	4,9	5,4	5,2	5,6	5,8	5,6	6,0	6,0	5,7	6,3
40 à 59 ans	5,0	4,8	5,2	5,6	5,4	5,8	6,3	6,1	6,5	6,6	6,2	7,0
60 à 79 ans	5,1	4,8	5,4	5,8	5,5	6,1	6,3	6,1	6,5	6,7	6,4	7,0
6 à 19 ans	3,9	3,7	4,1	4,4	4,2	4,6	5,0	4,8	5,2	5,2	5,0	5,4
20 à 79 ans	4,9	4,7	5,1	5,5	5,4	5,6	6,1	5,9	6,3	6,5	6,3	6,7
6 à 79 ans	4,6	4,4	4,8	5,4	5,3	5,5	6,1	5,9	6,3	6,4	6,2	6,6
Femmes												
6 à 11 ans	4,1	3,8	4,4	4,6	4,5	4,7	4,9	4,7	5,1	5,3	5,0	5,6
12 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	4,4	4,2	4,6	5,0	4,6	5,4	5,5	5,0	6,0
20 à 39 ans	4,5	4,3	4,7	5,0	4,8	5,2	5,8	5,4	6,2	6,1	5,7	6,5
40 à 59 ans	5,1	4,8	5,4	5,9	5,6	6,2	6,5	6,2	6,8	6,9	6,5	7,3
60 à 79 ans	5,4	5,3	5,5	6,1	5,9	6,3	6,7	6,5	6,9	7,1	6,9	7,3
6 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	4,5	4,4	4,6	4,9	4,7	5,1	5,3	4,9	5,7
20 à 79 ans	4,9	4,7	5,1	5,6	5,3	5,9	6,4	6,1	6,7	6,8	6,5	7,1
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,8	5,5	5,3	5,7	6,2	6,0	6,4	6,6	6,4	6,8

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.