

Tableau 57

Prévalence de l'anticorps de surface de l'hépatite B dans la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Prévalence de l'anticorps de surface de l'hépatite B		
	Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à
	pourcentage		
Les deux sexes			
14 à 19 ans	69,7	66,1	73,2
20 à 39 ans	40,6	35,0	46,2
40 à 59 ans	18,1	12,9	23,2
60 à 79 ans	12,5	9,2	15,8
14 à 79 ans	29,4	25,7	33,1
Hommes			
14 à 19 ans	72,7	68,1	77,3
20 à 39 ans	36,1	28,8	43,3
40 à 59 ans	14,7 ^E	9,0	20,4
60 à 79 ans	10,9 ^E	5,9	16,0
14 à 79 ans	26,8	22,3	31,3
Femmes			
14 à 19 ans	66,7	61,1	72,2
20 à 39 ans	45,3	38,3	52,4
40 à 59 ans	21,4	15,1	27,8
60 à 79 ans	13,9	10,1	17,7
14 à 79 ans	32,0	27,7	36,4

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Population à domicile âgée de 14 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.