

## Feuillets d'information de la santé

### Arthritis, 2014



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

Canada

---

## Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca).

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

**Courriel** à [STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca](mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca)

**Téléphone** entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- |   |                |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques                                    | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur   | 1-514-283-9350 |

**Programme des services de dépôt**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| • Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| • Télécopieur               | 1-800-565-7757 |

## Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site [www.statcan.gc.ca](http://www.statcan.gc.ca) sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

## Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

## Signes conventionnels dans les tableaux

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0<sup>s</sup> valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- <sup>p</sup> provisoire
- <sup>r</sup> révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- <sup>E</sup> à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- \* valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ( $p < 0,05$ )

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2015

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

*This publication is also available in English.*

---




# Arthrite, 2014

Le terme « arthrite » sert à décrire de nombreuses affections qui touchent les articulations, les tissus entourant les articulations et d'autres tissus conjonctifs. Les types d'arthrite les plus courants sont l'arthrose et l'arthrite rhumatoïde. Les douleurs, les raideurs, les enflures ou les difformités des articulations qui s'ensuivent peuvent réduire considérablement la qualité de vie<sup>1</sup>.

Les données sur l'arthrite sont basées sur une question de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes où l'on demandait aux répondants de 15 ans et plus s'ils avaient de l'arthrite<sup>2</sup>, à l'exception de la fibromyalgie.

En 2014, 16,5 % des Canadiens de 15 ans et plus (environ 4,8 millions) ont déclaré avoir reçu un diagnostic d'arthrite d'un professionnel de la santé (graphique 1). Le taux d'arthrite est relativement stable depuis 2007, s'établissant à environ 12 % chez les hommes et à environ 19 % chez les femmes<sup>3</sup>.


**Graphique 1**  
Pourcentage de personnes déclarant avoir reçu un diagnostic d'arthrite, selon le sexe, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, 2007 à 2014



Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2007 à 2014.

Tant chez les hommes que chez les femmes, le pourcentage de personnes déclarant faire de l'arthrite augmente avec l'âge, les personnes de 75 ans et plus ayant affiché le taux le plus élevé. En 2014, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d'être atteintes d'arthrite dans tous les groupes d'âge à partir de 45 ans. Dans le cas des 15 à 44 ans, il n'y avait pas de différence entre les sexes (graphique 2).

**Graphique 2**  
Pourcentage de personnes déclarant avoir reçu un diagnostic d'arthrite, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, 2014



Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2014.

Un des symptômes de l'arthrite est la raideur ou la douleur dans les articulations. En 2014, de la douleur et des malaises étaient plus de quatre fois plus susceptibles de se produire chez les personnes atteintes d'arthrite. Parmi les Canadiens de 15 ans et plus atteints d'arthrite, 43,8 % ont déclaré avoir habituellement de la douleur ou des malaises les empêchant de faire certaines ou la plupart de leurs activités<sup>4</sup>, comparativement à seulement 9,7 % de ceux qui n'avaient pas d'arthrite.

La proportion de répondants de 15 ans et plus ayant déclaré faire de l'arthrite était **inférieure** à la moyenne nationale (16,5 %) au :

- Québec<sup>3</sup> (11,0 %)
- Nunavut<sup>5</sup> (11,7 %)

La proportion de répondants de 15 ans et plus ayant déclaré faire de l'arthrite était **supérieure** à la moyenne nationale au :

- Terre-Neuve-et-Labrador (25,4 %)
- L'Île-du-Prince-Édouard (21,2 %)
- Nouvelle-Écosse (25,0 %)
- Nouveau-Brunswick (25,0 %)
- Ontario (18,5 %)
- Manitoba (19,3 %)

Les répondants des autres provinces et territoires ont déclaré des taux comparables à la moyenne nationale.

Étant donné le lien étroit qui existe entre l'âge et l'arthrite, une province ou un territoire avec une population disproportionnellement élevée de jeunes pourrait s'attendre à avoir un taux d'arthrite inférieur à la moyenne nationale. Inversement, une province ou un territoire avec une population ayant un taux plus élevé de personnes âgées devrait avoir un taux d'arthrite supérieur à la moyenne nationale. Pour annuler l'effet des différences entre les répartitions selon l'âge dans les comparaisons interprovinciales, reportez-vous au tableau CANSIM [n<sup>o</sup> \(numéro\) 105-0503](#) pour connaître les taux normalisés selon l'âge.

## Notes

- 
- <sup>1</sup> [La Société de l'arthrite](http://www.arthrite.ca), <http://www.arthrite.ca> (site consulté le 10 mai 2010).
  - <sup>2</sup> À noter qu'un répondant est considéré comme atteint d'arthrite uniquement s'il a déclaré avoir reçu un diagnostic d'arthrite d'un professionnel de la santé.
  - <sup>3</sup> Dans le questionnaire français de 2011, le mot « arthrose » a été ajouté dans la question sur l'arthrite car les patients tendent à associer le mot « arthrite » avec arthrite rhumatoïde et « arthrose » avec ostéoarthrite. Cependant, le mot « arthrose » a été omis en 2012. Par conséquent, les estimations de l'arthrite en 2011 pour la province de Québec et par ricochet celles du Canada ont été affectées par ces changements.  
L'ajout du mot « arthrose » à la question concernant l'arthrite en 2011 a entraîné une augmentation des taux d'arthrite au Québec. L'exclusion du mot « arthrose » après 2011 a ensuite entraîné une baisse du taux d'arthrite au Québec, et il se peut que cela soit la raison pour laquelle la province affiche un taux plus faible que la moyenne nationale.  
Les données relatives à l'indicateur de l'arthrite en 2011 devraient être utilisées avec prudence.
  - <sup>4</sup> On a demandé aux répondants s'ils étaient habituellement sans douleurs ou malaises. Dans la négative, on leur a aussi demandé à quelle fréquence environ leurs douleurs ou malaises les empêchaient de faire leurs activités. Les questions sont tirées du Health Utilities Index (HUI) Mark 3, élaboré à l'Université McMaster par Health Utilities Inc.
  - <sup>5</sup> Notez que le proportion de l'arthrite du Nunavut a un coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % ; il faut donc interpréter les données en question avec prudence.
- 

## Références

Wilkins, Kathryn. 2004. « [Incidence de l'arthrite par rapport au surpoids](#) », *Rapports sur la santé*, vol. (volume) 15, n<sup>o</sup> (numéro) 1, produit n<sup>o</sup> (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 43 à 54, <http://www.statcan.gc.ca/studies-etudes/82-003/archive/2004/6764-fra.pdf>.

Wilkins, Kathryn. 1999. « [L'hormonothérapie substitutive et l'incidence de l'arthrite](#) », *Rapports sur la santé*, vol. (volume) 11, n<sup>o</sup> (numéro) 2, produit n<sup>o</sup> (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 57 à 66, <http://www.statcan.gc.ca/studies-etudes/82-003/archive/1999/4735-fra.pdf>.

## Données

D'autres données sur l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont disponibles dans les tableaux CANSIM [105-0501](#) et [105-0503](#).