

Feuillets d'information de la santé

Les 10 principales causes de décès, 2012



Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
- Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
- Télécopieur 1-514-283-9350

Programme des services de dépôt

- Service de renseignements 1-800-635-7943
- Télécopieur 1-800-565-7757

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Signes conventionnels dans les tableaux

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- ^p provisoire
- ^r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2015

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.



Feuillets d'information de la santé

Les 10 principales causes de décès, 2012



Le nombre de décès est utilisé comme critère de classement de la mortalité par principale cause de décès. Le classement des causes de décès est une façon informative de présenter les statistiques de la mortalité, de manière à compléter d'autres mesures sur la mortalité comme les taux de mortalité et la table de mortalité. La méthode de sélection des principales causes de décès a été établie par le National Center for Health Statistics du U.S Department of Health and Human Services (Heron).

Les statistiques présentées dans ce feuillet d'information proviennent des statistiques de l'état civil de la Base canadienne de données sur les décès. Ces données sont recueillies auprès de tous les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil et contiennent des renseignements démographiques et médicaux (cause de décès) sur tous les décès survenus au Canada.

La proportion de décès des 10 principales causes de décès tend à diminuer

Depuis l'an 2000, le fardeau relatif associé aux 10 principales causes de décès tend à diminuer, tandis que la proportion de toutes les autres causes de décès a augmenté. En 2012, les 10 principales causes de décès étaient à l'origine de 184 869 décès, ce qui représentait 75 % de l'ensemble des décès au Canada par rapport à 80 % en 2000 (tableau 1).

Le classement des 10 principales causes de décès est resté relativement stable de 2000 à 2012, sauf en 2010 et en 2012, où les accidents (les blessures involontaires) ont passé au quatrième rang, en avant des maladies chroniques des voies respiratoires inférieures.

Tableau 1

Classement, nombre et pourcentage de décès pour les 10 principales causes, Canada, 2000, 2011 et 2012

Causes de décès	2012			2011			2000		
	rang	nombre	%	rang	nombre	%	rang	nombre	%
Toutes les causes de décès	...	246 596	100,0	...	243 511	100,0	...	218 062	100,0
Total, 10 principales causes de décès	...	184 869	75,0	...	182 795	75,1	...	175 149	80,3
Tumeurs malignes (cancer)	1	74 361	30,2	1	72 736	29,9	1	62 672	28,7
Maladies du cœur	2	48 681	19,7	2	47 911	19,7	2	55 070	25,3
Maladies cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral)	3	13 174	5,3	3	13 332	5,5	3	15 576	7,1
Accidents (blessures involontaires)	4	11 290	4,6	5	10 961	4,5	5	8 589	3,9
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	5	11 130	4,5	4	11 243	4,6	4	9 813	4,5
Diabète sucré (diabète)	6	6 993	2,8	6	7 255	3	6	6 714	3,1
Maladie d'Alzheimer	7	6 293	2,6	7	6 377	2,6	7	5 007	2,3

Grippe et pneumopathie	8	5 694	2,3	8	5 787	2,4	8	4 966	2,3
Lésions auto-infligées (suicide)	9	3 926	1,6	9	3 896	1,6	9	3 606	1,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladie du rein)	10	3 327	1,3	10	3 297	1,4	10	3 136	1,4
Toutes les autres causes	...	61 727	25,0	...	60 716	24,9	...	42 913	19,7

... n'ayant pas lieu de figurer
Note : L'ordre des causes de décès dans ce tableau est fondé d'après le classement des 10 principales causes de 2012.
Source : Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès, tableau CANSIM 102-0561.

Le cancer, la principale cause de décès, était à l'origine de 74 361 décès en 2012, soit 30 % de l'ensemble des décès, représentant une proportion à peu près stable depuis 2000 (29 %). Venaient ensuite au deuxième rang, les maladies du cœur avec 20 % de l'ensemble des décès, suivies au troisième rang des accidents vasculaires cérébraux (maladies cérébrovasculaires) avec 5 %.

Quatre des dix principales causes de décès avaient le même classement chez les hommes et chez les femmes

En 2012, les hommes et les femmes avaient en commun huit des dix principales causes de décès. Cependant, seules quatre principales causes de décès avaient le même classement : le cancer (premier), les maladies du cœur (deuxième), les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (quatrième) et la grippe et pneumopathie (huitième).

Tableau 2
Classement et nombre de décès pour les 10 principales causes de décès selon le sexe, Canada, 2012

Causes de décès	Hommes			Femmes			Rapport de masculinité ¹
	rang	nombre	%	rang	nombre	%	
Toutes les causes de décès	...	124 235	100,0	...	122 361	100,0	102
Tumeurs malignes (cancer)	1	39 080	31,5	1	35 281	28,8	111
Maladies du cœur	2	25 816	20,8	2	22 865	18,7	113
Accidents (blessures involontaires)	3	6 465	5,2	5	4 825	3,9	134
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	4	5 683	4,6	4	5 447	4,5	104
Maladies cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral)	5	5 581	4,5	3	7 593	6,2	74
Diabète sucré (diabète)	6	3 702	3,0	7	3 291	2,7	112
Lésions auto-infligées (suicide)	7	2 972	2,4	13	954	0,8	312
Grippe et pneumopathie	8	2 586	2,1	8	3 108	2,5	83
Maladie d'Alzheimer	9	1 900	1,5	6	4 393	3,6	43
Maladie chronique et cirrhose du foie	10	1 888	1,5	12	994	0,8	190
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladie du rein)	11	1 612	1,3	9	1 715	1,4	94
Sepsie	13	1 173	0,9	10	1 438	1,2	82
Toutes les autres causes	...	25 777	20,7	...	30 457	24,9	85

... n'ayant pas lieu de figurer

1 Nombre de décès d'hommes pour 100 décès de femmes.

Note : L'ordre des causes de décès dans ce tableau est fondé d'après le classement en rang des 10 principales causes chez les hommes.
Source : Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès, tableau CANSIM 102-0561.

La troisième principale cause de décès chez les hommes était les accidents (blessures involontaires) alors que cette cause se situait au cinquième rang chez les femmes. En 2000, les accidents se trouvaient au cinquième rang chez les hommes et au septième rang chez les femmes.

Le suicide était la septième principale cause de décès chez les hommes en 2012, le même rang comparé à 2000. Chez les femmes, le suicide se classait au treizième en 2012, mais au dixième rang en 2000. Dans le tableau 2, le rapport de masculinité (décès d'hommes pour 100 décès de femmes) en 2012, indique que le suicide chez les hommes est plus de trois

fois plus élevé que celui chez les femmes. Une étude sur les taux de suicide au Canada confirme cette situation (Navaneelan).

La maladie d'Alzheimer se classait au sixième rang chez les femmes alors qu'elle occupait le neuvième rang chez les hommes. Le rapport de masculinité indique qu'en 2012, il y avait au-delà de deux fois plus de femmes qui sont décédées de cette cause de décès que d'hommes. En 2000, la maladie d'Alzheimer était au cinquième rang chez les femmes alors qu'elle était au dixième rang chez les hommes.

Bien que chez les femmes, l'accident vasculaire cérébral (AVC) se retrouvait au troisième rang depuis 2000, chez les hommes l'AVC a reculé du troisième rang en 2000 au cinquième rang en 2012.

Chez les femmes, le diabète a reculé du sixième rang en 2000 au septième rang en 2012. La sepsie se retrouvait au dixième rang en 2012 chez les femmes, tandis qu'elle était au quinzième rang en 2000.

Disparités selon l'âge

Le graphique 1 montre clairement qu'il existait des différences dans les répartitions par groupe d'âge des décès selon la principale cause de décès en 2012. Dans le groupe d'âge des 1 à 24 ans, plus de la moitié des décès de ce groupe d'âge était attribuable à des causes externes de décès, c'est-à-dire aux accidents (blessures involontaires) avec 38 %, et au suicide avec 20 %. Les décès par cancer venaient au troisième rang avec 9 %, suivis de l'homicide avec 5 %.


Dans le groupe des personnes âgées de 25 à 44 ans, les accidents (blessures involontaires) constituaient la principale cause de décès avec 23 %, suivis de près des décès par cancer avec 21 % et ensuite des décès par suicide avec 16 %. Dans ce groupe d'âge, les maladies du cœur (quatrième rang) ont commencé à faire partie des cinq principales causes de décès.

Dans le groupe d'âge des 45 à 64 ans, 44 % des décès sont attribuables aux décès par cancer, suivis des maladies du cœur avec 16 %.


Dans le groupe d'âge des personnes âgées de 65 ans et plus, là où le nombre de décès était le plus important, les décès attribuables à des maladies chroniques faisaient parties des cinq principales causes de décès. Les décès par cancer et les maladies du cœur constituaient près de la moitié des causes de décès de ce groupe d'âge. Venaient ensuite, les décès attribuables aux AVC avec 6%, les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures avec 5 % et la maladie d'Alzheimer avec 3 %. On peut souligner que chez les 85 ans et plus, les maladies du cœur devançaient les décès par cancer et, la maladie d'Alzheimer surpassait les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures.

Graphique 1 Distribution en pourcentage des cinq principales causes de décès au Canada 2012


Groupe d'âge : 1 à 24 ans
Nombre de décès = 2 695




Groupe d'âge : 25 à 44 ans
Nombre de décès = 7 488



Groupe d'âge : 45 à 64 ans
Nombre de décès = 40 858



Groupe d'âge : 65 ans et plus
Nombre de décès = 193 737



Source : Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès, tableau CANSIM 102-0561.

Références

HERON, M. 2007. « Deaths: Leading causes for 2004 », *National Vital Statistics Reports*. 56 (5).

NAVANEELAN, Tanya. 2012. « Les taux de suicide : un aperçu », *Coup d'œil sur la Santé*, produit n° 82-624-X au catalogue de Statistique Canada.

Données

D'autres données sur les principales causes de décès sont disponibles dans les tableaux CANSIM 102-0561, 102-0562 et 102-0563.