

Feuillets d'information de la santé

Tabagisme, 2015



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- | | |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur | 1-514-283-9350 |

Programme des services de dépôt

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| • Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Signes conventionnels dans les tableaux

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- ^p provisoire
- ^r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2017

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.



Feuillets d'information de la santé Tabagisme, 2015




En 2015, 17,7 % des Canadiens âgés de 12 ans et plus, soit environ 5,3 millions de personnes, fumaient tous les jours ou à l'occasion¹. La proportion de personnes qui fumaient tous les jours ou à l'occasion était plus élevée chez les hommes (20,4 %) que chez les femmes (15,0 %)². (Graphique 1)

Le tabagisme est un facteur de risque de cancer du poumon, de maladies du cœur, d'accident vasculaire cérébral, de maladies respiratoires chroniques et d'autres problèmes de santé³. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'usage du tabac est une cause de mortalité importante et évitable⁴.

Parmi tous les groupes d'âge, c'est celui des jeunes âgés de 12 à 17 ans qui comptait le moins de fumeurs (4,1 %), suivi par le groupe des adultes de 65 ans et plus (9,8 %). Le groupe comptant la plus forte proportion de fumeurs était celui des hommes âgés de 20 à 34 ans, environ un homme sur quatre (27,7 %) fumait dans ce groupe d'âge (graphique 1)⁵.

Graphique 1
Fumeurs quotidiens ou occasionnels, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2015

pourcentage




⊕ à utiliser avec prudence (coefficient de variation compris entre 15,1 % et 35,0 %)

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2015.

La majorité des fumeurs, soit environ 3,8 millions de personnes, fumaient tous les jours, tandis que la majorité des non-fumeurs (44,7 %) s'étaient toujours abstenus de fumer. À peine plus d'un Canadien sur cinq (21,9 %) était un ancien fumeur quotidien (graphique 2).

Chart 2
Statut des fumeurs, population à domicile de 12 ans et plus,
Canada, 2015



Note : Les fumeurs expérimentaux sont des non-fumeurs (actuellement) qui ont fumé au moins une cigarette complète dans leur vie.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2015.

Habituellement, les gens commencent à fumer à l'adolescence⁵, de sorte que le pourcentage de Canadiens qui ne fument toujours pas à l'âge de 20 ans constitue un bon indicateur des taux futurs de tabagisme. En 2015, 57,9 % des Canadiens âgés de 20 à 24 ans n'avaient jamais fumé. Dans le groupe des adultes âgés de 20 à 24 ans, la proportion de personnes n'ayant jamais fumé était plus élevée chez les femmes (64,9 %) que chez les hommes (51,8 %)⁵.

Le pourcentage de résidents qui fumaient tous les jours ou à l'occasion était **inférieur** à la moyenne nationale (17,7 %) dans les provinces suivantes :

- Île-du-Prince-Édouard (14,9 %)
- Colombie-Britannique (13,8 %)

Le pourcentage de résidents qui fumaient tous les jours ou à l'occasion était **supérieur** à la moyenne nationale dans les provinces suivantes :

- Terre-Neuve-et-Labrador (24,4 %)
- Québec (18,6 %)
- Saskatchewan (21,8 %)

Les résidents des autres provinces ont déclaré des taux avoisinant la moyenne nationale.

Références

Shields, M. 2007. « Interdictions de fumer : leur incidence sur la prévalence de l'usage de la cigarette (www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2006008/article/10306-fra.htm) » *Rapports sur la santé*. vol. 18, no 3, produit no 82-003 du catalogue de Statistique Canada. (site consulté le 17 Janvier 2017)

Shields, M. 2005. « Cheminement vers l'abandon du tabac (www.statcan.gc.ca/access_acces/alternative_alternatif.action?loc=http://www.statcan.gc.ca/studies-etudes/82-003/archive/2005/7839-fra.pdf&l=fra) » *Rapports sur la santé*. vol. 16, no 3, produit no 82-003 du catalogue de Statistique Canada. (site consulté le 17 Janvier 2017)

Shields, M. 2005. « Usage du tabac chez les jeune (www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2004003/article/7840-fra.pdf) » *Rapports sur la santé*. vol. 16, no 3, produit no 82-003 du catalogue de Statistique Canada. (site consulté le 17 Janvier 2017)

Organisation mondiale de la santé. 2008. Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2008 : Le programme MPOWER, Genève. (site consulté le 17 Janvier 2017)

Jiajian, C., et W.J. Millar. 1998. « Cesser de fumer : est-ce plus difficile si l'on a commencé jeune? (www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/1997004/article/3685-fra.pdf) » Rapports sur la santé. vol. 9, no 4, produit no 82-003 du catalogue de Statistique Canada. (site consulté le 17 Janvier 2017)

Données

D'autres données sur l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont disponibles dans les tableaux CANSIM 105-0508 (www.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=1050508).

Also available in English (www.statcan.gc.ca/cgi-bin/change.cgi)

Notes

- 1 Dans le présent article, les estimations qui renvoient à la moyenne nationale ou au taux canadien excluent les territoires. Il en est ainsi parce qu'une partie de la population des territoires était exclue de la couverture de l'ESCC en 2015. Seule la moitié des collectivités des territoires ont été visitées en 2015, l'autre moitié l'ayant été en 2016; les analyses fondées sur les données recueillies dans les territoires sont donc disponibles uniquement pour les cycles de deux ans de l'ESCC (p. ex., 2015-2016).
- 2 Dans le présent article, si deux estimations sont présentées comme étant différentes, cela signifie que la différence était statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 % (valeur de p inférieure à 5 %).
- 3 Shields, M. 2005. «Cheminement vers l'abandon du tabac (www.statcan.gc.ca/access_acces/alternative_alternatif.action?loc=http://www.statcan.gc.ca/studies-etudes/82-003/archive/2005/7839-fra.pdf&l=fra) » *Rapports sur la santé*. vol. 16, n° 3, produit n° 82-003 du catalogue de Statistique Canada. (site consulté le 17 Janvier 2017).
- 4 Organisation mondiale de la santé. 2008. Rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme, 2008 : Le programme MPOWER, Genève. (site consulté le 17 Janvier 2017).
- 5 Jiajian, C., et W.J. Millar. 1998. «Cesser de fumer : est-ce plus difficile si l'on a commencé jeune?» (www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/1997004/article/3685-fra.pdf) *Rapports sur la santé*. vol. 9, n° 4, produit n° 82-003 du catalogue de Statistique Canada. (site consulté le 17 Janvier 2017).