

Tendances dans l'évolution des taux de mortalité, 2000 à 2013



Date de diffusion : le 7 février 2017



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- | | |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur | 1-514-283-9350 |

Programme des services de dépôt

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| • Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « [Normes de service à la clientèle](#) ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2017

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Feuillets d'information de la santé

Statistique Canada – N° 82-625-X au catalogue

Tendances dans l'évolution des taux de mortalité, 2000 à 2013

Les taux de mortalité normalisés selon l'âge montrent le nombre de décès pour 100 000 personnes qui seraient survenus dans une région géographique donnée si la structure par âge de la population de cette région géographique était la même que celle d'une population type. Les taux de mortalité sont calculés afin d'éliminer l'effet des variations dans la structure de la population sur les taux de décès. La comparaison de ces taux de mortalité reflète donc les variations réelles de la mortalité. La population canadienne de 2011 est utilisée comme population type dans ce feuillet d'information.


Au cours de la période 2000 à 2013, les taux de mortalité normalisés selon l'âge pour toutes les causes de décès réunies ont diminué de 20,4 %, de 862,5 décès pour 100 000 personnes à 686,2 (graphique 1).

Les taux de mortalité normalisés selon l'âge pour toutes les causes de décès ont diminué pour les hommes de 23,4 % (de 1 083,1 à 829,6) de 2000 à 2013, tandis que les taux chez les femmes ont diminué de 18,2 % (de 703,7 à 575,6).

Graphique 1

Taux de mortalité normalisés selon l'âge¹, selon le sexe, Canada, 2000 à 2013

pour une population type de 100 000 personnes



1. Taux normalisés selon l'âge pour une population type de 100 000 personnes.

Source : Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès, tableau CANSIM 102-0564.


Les taux de mortalité normalisés selon l'âge ont baissé pour les principales causes de décès

Au cours de la période 2000 à 2013, les taux de mortalité normalisés ont affiché un déclin général pour 8 des 10 principales causes de décès. Les plus fortes baisses ont été enregistrées pour les accidents vasculaires cérébraux et les maladies du cœur, dont les taux normalisés ont reculé de 43,3 % (de 63,7 à 36,1) et de 39,5 % (de 222,7 à 134,8) respectivement. Les taux de mortalité due à un accident (blessures involontaires) et au suicide (lésions auto-infligées) sont demeurés relativement stables au cours de la période observée. Le taux de mortalité normalisé selon l'âge due à un cancer, la première principale cause de décès, a reculé de 15,5 %, passant de 243,2 pour 100 000 personnes de la population type en 2000 à 205,5 en 2013 (graphique 2).

Entre 2000 et 2013, la baisse des taux de mortalité normalisés selon l'âge due à un cancer était plus accentuée chez les hommes (19,7 %), dont le taux est passé de 306,5 à 246,2, que chez les femmes (11,9 %), dont le taux est passé de 201,3 à 177,3. Par ailleurs, les taux normalisés pour les maladies du cœur ont baissé de 39,9 % chez les hommes (de 293,1 à 176,2) et de 40,3 % chez les femmes (de 170,9 à 102,0).

Graphique 2

Taux de mortalité normalisés selon l'âge¹ pour les 10 principales causes de décès, Canada, 2000 et 2013



1. Taux de mortalité normalisés selon l'âge pour une population type de 100 000 personnes.

Note : L'ordre des causes de décès dans ce tableau est fondé d'après le classement des 10 principales causes de 2013.


Source : Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès, tableau CANSIM 102-0564.

Les tendances des taux de mortalité normalisés selon l'âge variaient selon la province ou le territoire

De 2000 à 2013, les taux de mortalité normalisés selon l'âge ont été plus faibles en Ontario et en Colombie-Britannique que dans l'ensemble du Canada. En 2013, le nombre de décès pour 100 000 personnes de la population type atteignait 659,8 en Ontario et 649,6 en Colombie-Britannique comparé à 686,2 dans l'ensemble du Canada. Les taux du Québec et de l'Alberta fluctuaient autour du niveau national, tandis que ceux des autres provinces et des trois territoires étaient plus élevés que le taux à l'échelle nationale (graphique 3).

Graphique 3

Taux de mortalité normalisés selon l'âge¹ pour toutes les causes de décès, Canada, provinces et territoires, 2000 et 2013



1. Taux de mortalité normalisés selon l'âge pour une population type de 100 000 personnes.

Source : Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès, tableau CANSIM 102-0564.

À partir de 2008, le cancer était la principale cause de décès dans l'ensemble des provinces et des territoires, sauf au Nunavut, où en 2013, le suicide surpassa le cancer pour atteindre le premier rang. Dans les provinces, les taux de mortalité normalisés selon l'âge pour les trois principales causes de décès (le cancer, les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux), ont diminué au cours de la période observée, les taux ayant baissé plus rapidement pour les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux que pour le cancer.

Données

D'autres données sur les principales causes de décès sont disponibles dans les tableaux CANSIM [102-0561](#), [102-0562](#), [102-0563](#) et [102-0564](#).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, veuillez communiquer avec le Service de renseignements statistiques de Statistique Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).