

Tableau 10
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la santé du dos, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives à la santé du dos								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	6,0 ^E	3,9	9,3	12,7	9,3	17,1	19,9	16,1	24,3
20 à 39 ans	12,5	9,1	17,0	16,9	12,4	22,6	23,4	17,7	30,2
40 à 59 ans	23,7	18,4	30,0	23,2	18,2	29,2	20,0	16,1	24,6
60 à 69 ans	32,1	25,2	40,0	33,3	28,2	38,8	12,6	9,9	15,8
15 à 69 ans	19,4	16,2	23,0	21,5	18,3	25,1	20,1	17,2	23,3
Hommes									
15 à 19 ans	F	.	.	12,7 ^E	6,7	22,6	25,2	19,0	32,6
20 à 39 ans	9,0 ^E	5,1	15,1	15,5 ^E	8,9	25,5	30,0	20,6	41,5
40 à 59 ans	18,2 ^E	11,6	27,4	20,0	15,6	25,2	22,2	17,2	28,1
60 à 69 ans	31,1	22,9	40,7	30,9	25,3	37,2	17,3	13,2	22,3
15 à 69 ans	15,5	11,6	20,4	19,2	15,9	23,0	24,6	19,7	30,4
Femmes									
15 à 19 ans	7,6 ^E	3,9	14,5	12,7 ^E	7,5	20,7	14,4 ^E	9,5	21,2
20 à 39 ans	16,2	11,7	22,0	18,4 ^E	12,6	25,9	16,5 ^E	11,1	23,9
40 à 59 ans	29,2	22,7	36,7	26,5	19,0	35,7	17,8	12,8	24,1
60 à 69 ans	33,1	23,3	44,6	35,4	28,2	43,4	8,2 ^E	5,5	12,0
15 à 69 ans	23,3	19,3	27,9	23,8	19,2	29,0	15,6	12,9	18,7

	Normes relatives à la santé du dos					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	46,8	40,5	53,3	14,5	11,3	18,5
20 à 39 ans	34,8	29,5	40,4	12,5	10,2	15,1
40 à 59 ans	22,7	18,0	28,1	10,4	7,7	13,9
60 à 69 ans	16,9	12,5	22,3	5,2 ^E	3,4	7,8
15 à 69 ans	28,3	25,3	31,5	10,7	9,4	12,3
Hommes						
15 à 19 ans	46,8	37,9	55,8	10,8 ^E	7,2	16,0
20 à 39 ans	33,5	26,4	41,4	12,1 ^E	6,9	20,2
40 à 59 ans	24,9	20,5	30,0	14,7 ^E	9,9	21,1
60 à 69 ans	14,6	10,4	20,1	6,1 ^E	3,8	9,4
15 à 69 ans	28,5	24,4	33,0	12,2	9,3	15,8
Femmes						
15 à 19 ans	46,9	36,5	57,5	18,4	14,1	23,7
20 à 39 ans	36,1	28,9	44,0	12,9	9,6	16,9
40 à 59 ans	20,4 ^E	13,9	29,0	6,1 ^E	3,4	10,8
60 à 69 ans	19,0	13,7	25,7	F	.	.
15 à 69 ans	28,0	24,8	31,6	9,3	7,7	11,2

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.