

Tableau 16
Circonférence du cou mesurée chez la population à domicile âgée de 3 à 19 ans, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Circonférence du cou mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	24,6	24,4	24,9	21,9	21,4	22,4	22,5	22,2	22,7	23,4	23,2	23,6
6 à 11 ans	27,5	27,3	27,8	24,2	24,0	24,5	24,8	24,5	25,1	25,8	25,5	26,1
12 à 19 ans	32,8	32,4	33,3	27,9	27,2	28,6	28,5	28,0	28,9	30,2	29,8	30,5
3 à 19 ans	29,8	29,6	30,0	23,5	23,4	23,6	24,3	24,2	24,5	26,3	26,0	26,5
6 à 19 ans	30,8	30,5	31,1	25,1	24,9	25,3	25,9	25,6	26,2	27,7	27,4	28,0
Hommes												
6 à 11 ans	28,1	27,7	28,5	24,8	24,1	25,5	25,3	24,8	25,7	26,1	25,4	26,8
12 à 19 ans	34,7	34,0	35,3	28,1	26,1	30,1	29,8	28,1	31,4	32,6	31,6	33,6
3 à 19 ans	31,0	30,6	31,3	24,2	23,9	24,5	25,0	24,6	25,4	26,6	26,1	27,1
6 à 19 ans	32,1	31,7	32,5	25,5	25,0	26,0	26,1	25,7	26,5	28,1	27,6	28,5
Femmes												
6 à 11 ans	27,0	26,8	27,1	23,9	23,6	24,3	24,4	24,1	24,7	25,4	25,2	25,6
12 à 19 ans	31,0	30,5	31,4	27,9	27,4	28,4	28,2	27,8	28,5	29,3	28,9	29,7
3 à 19 ans	28,5	28,3	28,8	23,1	22,9	23,4	23,9	23,6	24,2	25,8	25,5	26,0
6 à 19 ans	29,4	29,1	29,7	24,6	24,3	24,9	25,4	25,2	25,6	27,4	27,3	27,6

	Circonférence du cou mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	24,4	24,2	24,6	25,7	25,2	26,2	27,0	26,1	27,8	27,6	27,0	28,2
6 à 11 ans	27,3	26,9	27,6	28,8	28,5	29,1	30,6	29,7	31,4	31,8	31,4	32,1
12 à 19 ans	32,5	31,8	33,1	35,2	34,7	35,7	37,5	36,9	38,0	39,1	38,0	40,3
3 à 19 ans	29,1	28,8	29,5	32,6	32,1	33,0	35,7	35,2	36,2	37,5	37,0	38,1
6 à 19 ans	30,2	29,8	30,5	33,5	32,8	34,1	36,2	35,6	36,8	38,1	37,4	38,7
Hommes												
6 à 11 ans	27,8	27,5	28,1	29,4	28,8	30,1	31,6	30,6	32,5	32,2	30,7	33,7
12 à 19 ans	34,9	34,2	35,5	36,7	36,0	37,5	38,8	37,7	39,8	40,9	39,4	42,3
3 à 19 ans	30,2	29,5	30,8	35,0	34,4	35,5	37,4	36,8	38,0	38,8	37,7	39,9
6 à 19 ans	32,2	31,3	33,1	35,5	35,0	35,9	37,7	37,1	38,4	39,2	37,7	40,7
Femmes												
6 à 11 ans	26,8	26,6	27,1	28,2	28,0	28,4	29,3	28,8	29,9	30,6	29,3	31,8
12 à 19 ans	30,6	30,1	31,0	32,0	31,3	32,7	33,8	33,1	34,5	34,8	34,1	35,5
3 à 19 ans	28,5	28,1	28,9	30,9	30,4	31,4	32,6	31,8	33,3	33,9	33,1	34,6
6 à 19 ans	29,3	28,9	29,7	31,2	30,7	31,7	33,0	32,2	33,8	34,2	33,3	35,1

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 19 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.