

Tableau 32

**Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez la population à domicile âgée de 35 à 79 ans , selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011**

	Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)					
	Obstruction des voies respiratoires mesurée représentative de la MPOC			Absence de la MPOC basée sur le débit d'air mesuré		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
	pourcentage					
<b>Les deux sexes</b>						
35 à 59 ans	9,9	7,3	13,5	90,1	86,5	92,7
60 à 79 ans	18,7	15,9	21,9	81,3	78,1	84,1
<b>35 à 79 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>10,5</b>	<b>14,9</b>	<b>87,5</b>	<b>85,1</b>	<b>89,5</b>
<b>Hommes</b>						
35 à 59 ans	11,5 <sup>E</sup>	7,5	17,2	88,5	82,8	92,5
60 à 79 ans	20,6	16,4	25,7	79,4	74,3	83,6
<b>35 à 79 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>11,0</b>	<b>17,8</b>	<b>85,9</b>	<b>82,2</b>	<b>89,0</b>
<b>Femmes</b>						
35 à 59 ans	8,5 <sup>E</sup>	5,6	12,7	91,5	87,3	94,4
60 à 79 ans	17,0	14,1	20,4	83,0	79,6	85,9
<b>35 à 79 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>8,6</b>	<b>14,1</b>	<b>88,9</b>	<b>85,9</b>	<b>91,4</b>

**Note(s)** : Une obstruction des voies respiratoires représentative de la MPOC se caractérise par un ratio du volume expiratoire maximale en une seconde (VEMS) sur la capacité vitale forcée (CVF) de moins de 70% de la valeur prédite en fonction de l'âge, le sexe, la taille et l'origine raciale. Population à domicile âgée de 35 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

**Source(s)** : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.