

Tableau 37
Distribution des triglycérides mesurés dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Triglycérides											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
mmol/L												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,80	0,75	0,85	0,44	0,41	0,47	0,49	0,44	0,53	0,60	0,57	0,63
12 à 19 ans	0,92	0,85	1,00	0,53	0,47	0,58	0,59	0,55	0,64	0,69	0,65	0,73
20 à 39 ans	1,06	0,98	1,16	0,53	0,50	0,55	0,59	0,55	0,62	0,74	0,69	0,80
40 à 59 ans	1,32	1,24	1,41	0,65	0,59	0,71	0,71	0,66	0,76	0,96	0,89	1,03
60 à 79 ans	1,34	1,26	1,43	0,65	0,60	0,70	0,75	0,67	0,83	0,96	0,89	1,02
6 à 79 ans	1,15	1,10	1,20	0,55	0,53	0,57	0,62	0,60	0,64	0,78	0,75	0,82
Hommes												
6 à 11 ans	0,77	0,70	0,86	0,42	0,38	0,45	0,45	0,41	0,49	0,55	0,49	0,62
12 à 19 ans	0,91	0,83	1,00	0,53	0,46	0,60	0,60	0,55	0,64	0,68	0,63	0,72
20 à 39 ans	1,20	1,07	1,34	0,56	0,51	0,61	0,60	0,56	0,65	0,77	0,67	0,86
40 à 59 ans	1,51	1,36	1,69	0,70	0,54	0,87	0,88	0,75	1,02	1,04	0,91	1,16
60 à 79 ans	1,35	1,25	1,46	0,61	0,52	0,71	0,71	0,63	0,78	0,96	0,83	1,08
6 à 79 ans	1,24	1,16	1,33	0,56	0,54	0,58	0,62	0,59	0,64	0,82	0,76	0,87
Femmes												
6 à 11 ans	0,83	0,76	0,91	0,50	0,43	0,57	0,55	0,49	0,61	0,62	0,57	0,67
12 à 19 ans	0,93	0,84	1,04	0,53	0,41	0,64	0,59	0,51	0,68	0,70	0,63	0,76
20 à 39 ans	0,94	0,85	1,05	0,51	0,39	0,64	0,54	0,49	0,59	0,71	0,64	0,78
40 à 59 ans	1,15	1,07	1,24	0,64	0,57	0,70	0,69	0,66	0,72	0,86	0,76	0,97
60 à 79 ans	1,33	1,23	1,44	0,67	0,55	0,78	0,79	0,67	0,92	0,96	0,89	1,02
6 à 79 ans	1,06	1,01	1,12	0,53	0,50	0,57	0,62	0,60	0,65	0,76	0,72	0,80

	Triglycérides											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
mmol/L												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,78	0,68	0,87	1,03	0,91	1,15	1,36	1,18	1,53	1,56	1,11	2,01
12 à 19 ans	0,86	0,80	0,93	1,16	1,03	1,29	1,72	1,31	2,12	2,06	1,62	2,50
20 à 39 ans	0,99	0,87	1,11	1,51	1,21	1,81	2,03	1,78	2,29	2,94	1,94	3,94
40 à 59 ans	1,28	1,14	1,43	1,83	1,61	2,04	2,39	2,12	2,66	2,97	2,27	3,67
60 à 79 ans	1,27	1,13	1,42	1,87	1,67	2,07	2,42	2,19	2,66	2,94	2,38	3,50
6 à 79 ans	1,08	1,01	1,14	1,61	1,46	1,75	2,25	2,07	2,43	2,81	2,50	3,13
Hommes												
6 à 11 ans	0,71	0,62	0,81	0,97	0,82	1,12	1,51	1,13	1,88	2,04 ^E	1,19	2,88
12 à 19 ans	0,81	0,74	0,88	1,07	0,83	1,31	1,75	1,17	2,33	2,29	1,68	2,90
20 à 39 ans	1,13	0,93	1,33	1,73	1,43	2,03	2,76 ^E	1,60	3,91	3,22	2,32	4,13
40 à 59 ans	1,48	1,24	1,72	2,17	1,75	2,60	2,89	2,05	3,73	4,15	2,89	5,41
60 à 79 ans	1,35	1,16	1,54	1,88	1,72	2,03	2,43	2,18	2,69	2,89	2,45	3,33
6 à 79 ans	1,19	1,05	1,34	1,81	1,60	2,02	2,47	2,16	2,78	3,25	2,74	3,76
Femmes												
6 à 11 ans	0,83	0,70	0,95	1,07	0,92	1,22	1,23	1,07	1,39	1,40	1,05	1,75
12 à 19 ans	0,93	0,82	1,04	1,18	1,03	1,33	1,45	1,07	1,83	1,83	1,37	2,30
20 à 39 ans	0,86	0,74	0,97	1,24	0,87	1,61	1,92	1,52	2,31	2,03	1,71	2,35
40 à 59 ans	1,09	0,99	1,18	1,60	1,37	1,83	1,97	1,80	2,14	2,26	1,89	2,64
60 à 79 ans	1,21	1,06	1,36	1,77	1,43	2,11	2,41	2,07	2,75	2,98	2,03	3,93
6 à 79 ans	1,02	0,98	1,06	1,41	1,23	1,58	1,99	1,88	2,11	2,29	2,11	2,48

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans - sous-échantillon à jeun, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.