

Tableau 41
Distribution de la gamma-glutamyl-transférase mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Gamma-glutamyl-transférase											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	U/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	14	13	15	7 ^E	3	11	10	9	12	12	11	12
6 à 11 ans	15	14	16	10	9	12	11	11	12	13	12	13
12 à 19 ans	17	16	18	10	10	11	11	11	12	13	12	14
20 à 39 ans	22	20	24	11	10	13	13	12	14	15	14	16
40 à 59 ans	28	26	30	12	12	13	14	13	15	18	16	19
60 à 79 ans	30	28	31	14	13	15	16	15	17	20	19	21
3 à 79 ans	24	22	25	11	11	12	13	12	13	15	14	16
6 à 79 ans	24	23	25	12	11	12	13	12	14	16	15	17
Hommes												
6 à 11 ans	16	15	17	11	10	12	12	11	12	13	12	14
12 à 19 ans	19	17	20	11	10	13	13	12	14	14	14	15
20 à 39 ans	28	25	30	14	13	15	15	14	16	19	17	21
40 à 59 ans	35	32	38	16	15	18	17	15	19	24	20	28
60 à 79 ans	32	30	35	17	15	18	19	17	20	22	20	24
3 à 79 ans	28	26	29	13	12	14	14	14	15	18	17	19
6 à 79 ans	28	27	30	13	13	14	15	14	15	18	17	19
Femmes												
6 à 11 ans	15	14	16	10	7	13	11	10	12	13	12	13
12 à 19 ans	15	14	17	10	7	13	11	10	11	12	12	13
20 à 39 ans	17	16	19	.	.	.	12	10	13	14	12	15
40 à 59 ans	22	21	24	11	10	13	13	12	13	15	14	17
60 à 79 ans	27	25	30	13	12	14	15	14	16	18	17	19
3 à 79 ans	20	19	21	11	9	12	12	11	13	14	13	15
6 à 79 ans	20	19	22	11	10	12	12	11	13	14	13	15

	Gamma-glutamyl-transférase											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	U/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	13	12	14	16	14	17	17	16	19	19	16	21
6 à 11 ans	15	14	16	17	16	18	20	18	22	22	20	25
12 à 19 ans	16	14	17	19	18	20	24	21	28	31	22	40
20 à 39 ans	20	18	21	30	26	33	44	36	52	54	48	60
40 à 59 ans	25	23	27	38	35	42	64	49	79	89	73	104
60 à 79 ans	27	26	27	39	36	41	59	50	68	77	66	88
3 à 79 ans	21	19	22	31	30	33	49	45	53	69	60	78
6 à 79 ans	21	20	23	32	30	33	50	46	54	70	62	79
Hommes												
6 à 11 ans	15	14	16	17	16	19	20	18	22	22	19	25
12 à 19 ans	17	15	19	21	19	22	27	19	36	36 ^E	15	58
20 à 39 ans	25	21	29	36	30	42	53	46	60	61	54	67
40 à 59 ans	31	28	34	48	44	52	80	63	96	106	86	126
60 à 79 ans	29	27	32	41	36	45	64	52	75	77	69	85
3 à 79 ans	25	24	27	38	35	40	57	51	62	78	67	90
6 à 79 ans	26	24	27	38	35	41	57	51	63	80	68	92
Femmes												
6 à 11 ans	14	13	15	17	16	18	20	18	22	23	20	26
12 à 19 ans	15	14	16	18	17	20	22	21	23	25	20	30
20 à 39 ans	17	15	19	21	19	23	31	27	35	35	26	43
40 à 59 ans	20	18	21	28	25	31	41	33	49	70 ^E	42	97
60 à 79 ans	25	22	27	36	32	40	57	48	67	77	57	98
3 à 79 ans	18	17	19	25	23	27	37	34	41	53	46	59
6 à 79 ans	18	17	19	25	23	27	38	35	41	54	47	60

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.