

Tableau 48
Distribution du glucose mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Glucose											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,7	3,9	3,8	4,0	4,0	3,9	4,1	4,2	4,1	4,4
12 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	4,1	4,0	4,1	4,2	4,1	4,3	4,4	4,3	4,4
20 à 39 ans	4,8	4,7	4,9	4,1	4,0	4,2	4,2	4,1	4,3	4,4	4,4	4,5
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,4	4,3	4,2	4,4	4,4	4,3	4,5	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,7	5,5	5,8	4,5	4,5	4,6	4,7	4,6	4,7	4,9	4,8	5,1
6 à 79 ans	5,1	5,0	5,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,2	4,4	4,5	4,5	4,6
Hommes												
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,8	3,9	3,7	4,1	4,0	3,8	4,2	4,3	4,1	4,5
12 à 19 ans	4,8	4,7	4,9	4,1	3,9	4,3	4,3	4,1	4,5	4,5	4,4	4,6
20 à 39 ans	5,0	4,8	5,3	4,2	3,9	4,5	4,4	4,1	4,7	4,6	4,5	4,7
40 à 59 ans	5,4	5,2	5,7	4,4	4,3	4,5	4,5	4,4	4,6	4,8	4,6	4,9
60 à 79 ans	5,8	5,6	6,1	4,6	4,4	4,8	4,8	4,6	4,9	5,1	5,0	5,3
6 à 79 ans	5,2	5,1	5,4	4,2	4,1	4,4	4,4	4,3	4,5	4,7	4,6	4,7
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	3,9	3,7	4,1	4,0	3,9	4,2	4,2	4,0	4,3
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	4,0	4,0	4,1	4,1	4,0	4,2	4,3	4,3	4,4
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,2	4,4
40 à 59 ans	5,0	4,9	5,1	4,2	4,1	4,3	4,4	4,2	4,5	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,6	5,4	5,7	4,5	4,3	4,6	4,6	4,5	4,7	4,8	4,6	4,9
6 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,1	4,2	4,4	4,4	4,5

	Glucose											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à									
	mmol/L											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,8	4,7	4,8	5,0	4,9	5,1	5,1	5,1	5,2
12 à 19 ans	4,6	4,6	4,7	4,9	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	5,0	5,2
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,0	5,4	5,2	5,6	5,9	5,4	6,5
40 à 59 ans	5,0	4,8	5,1	5,5	5,3	5,6	6,1	5,7	6,5	7,0	6,0	7,9
60 à 79 ans	5,4	5,3	5,5	6,0	5,7	6,2	7,1	6,6	7,7	8,5	7,9	9,1
6 à 79 ans	4,8	4,8	4,9	5,3	5,2	5,4	6,0	5,8	6,1	6,7	6,3	7,1
Hommes												
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,7	4,8	4,7	4,9	5,0	4,9	5,2	5,2	5,0	5,3
12 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	4,9	4,9	5,0	5,1	5,0	5,1	5,2	5,1	5,4
20 à 39 ans	4,9	4,8	4,9	5,1	4,9	5,3	5,9	5,2	6,7	6,1	5,6	6,6
40 à 59 ans	5,1	4,8	5,4	5,7	5,3	6,1	6,6	5,7	7,5	7,4	5,2	9,5
60 à 79 ans	5,6	5,4	5,8	6,2	5,8	6,7	7,2	6,5	8,0	8,4	7,3	9,6
6 à 79 ans	4,9	4,9	5,0	5,5	5,3	5,7	6,2	6,0	6,5	7,1	6,6	7,6
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	4,8	5,1	5,1	5,0	5,2
12 à 19 ans	4,5	4,4	4,5	4,8	4,7	4,8	4,9	4,8	5,0	5,1	5,0	5,2
20 à 39 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,6	4,9	5,1	4,8	5,5	5,4	5,1	5,7
40 à 59 ans	4,8	4,7	5,0	5,2	5,1	5,3	5,6	5,4	5,7	5,8	5,5	6,2
60 à 79 ans	5,2	5,0	5,4	5,8	5,6	5,9	7,0	5,9	8,0	8,7	7,7	9,8
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,8	5,1	5,0	5,2	5,6	5,4	5,7	6,1	5,8	6,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans - sous-échantillon à jeun, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.