

Tableau 57
Distribution du bisphénol A mesuré dans l'urine pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Bisphénol A											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,4	1,1	1,8	.	.	.	0,3 ^E	0,1	0,5	0,8	0,5	0,99
6 à 11 ans	1,4	1,1	1,7	.	.	.	0,3 ^E	0,09	0,4	0,7	0,5	0,85
12 à 19 ans	1,3	1,1	1,6	.	.	.	0,4	0,2	0,5	0,80	0,6	0,97
20 à 39 ans	1,3	1,1	1,5	0,2 ^E	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,5	0,7
40 à 59 ans	1,2	0,97	1,5	.	.	.	0,3 ^E	0,1	0,4	0,6	0,4	0,84
60 à 79 ans	1,0	0,84	1,3	.	.	.	0,2 ^E	0,1	0,3	0,5 ^E	0,3	0,7
3 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	.	.	.	0,3	0,2	0,3	0,6	0,6	0,7
6 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	.	.	.	0,3	0,2	0,3	0,6	0,6	0,7
Hommes												
6 à 11 ans	1,3	1,0	1,8	.	.	.	F	.	.	0,7	0,6	0,89
12 à 19 ans	1,5	1,1	2,0	.	.	.	0,5 ^E	0,3	0,7	0,81	0,6	1,0
20 à 39 ans	1,4	0,99	1,9	X	.	.	F	.	.	0,7	0,5	0,89
40 à 59 ans	1,2	0,94	1,6	X	.	.	F	.	.	0,6 ^E	0,3	0,90
60 à 79 ans	1,1	0,83	1,5	X	.	.	0,3 ^E	0,09	0,4	0,5 ^E	0,3	0,8
3 à 79 ans	1,3	1,1	1,5	.	.	.	0,3	0,2	0,4	0,7	0,6	0,8
6 à 79 ans	1,3	1,1	1,4	.	.	.	0,3^E	0,2	0,4	0,7	0,5	0,8
Femmes												
6 à 11 ans	1,4	1,0	1,8	.	.	.	F	.	.	0,6 ^E	0,3	0,95
12 à 19 ans	1,2	0,99	1,5	.	.	.	0,3 ^E	0,2	0,5	0,8	0,5	1,0
20 à 39 ans	1,2	0,99	1,5	X	.	.	0,3 ^E	0,2	0,5	0,6	0,4	0,7
40 à 59 ans	1,2 ^E	0,81	1,7	X	.	.	F	.	.	0,7 ^E	0,3	1,0
60 à 79 ans	0,98	0,7	1,4	X	0,5 ^E	0,3	0,7
3 à 79 ans	1,2	1,0	1,3	.	.	.	0,3	0,2	0,3	0,6	0,5	0,7
6 à 79 ans	1,2	1,0	1,3	.	.	.	0,3	0,2	0,3	0,6	0,5	0,7

	Bisphénol A											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,3	1,1	1,5	2,6	1,8	3,4	5,4 ^E	1,9	9,0	9,9 ^E	5,5	14
6 à 11 ans	1,3	0,94	1,7	2,3	1,6	3,0	4,6 ^E	2,6	6,6	F	.	.
12 à 19 ans	1,3	0,99	1,6	2,5	2,0	2,9	4,4	2,9	5,9	7,6 ^E	4,3	11
20 à 39 ans	1,3	0,92	1,6	2,4	1,8	3,1	4,6	3,7	5,5	F	.	.
40 à 59 ans	1,2	0,98	1,4	2,2	1,7	2,7	4,3 ^E	2,7	6,0	6,7 ^E	2,6	11
60 à 79 ans	0,99	0,8	1,2	2,3	1,5	3,1	4,4 ^E	2,5	6,2	6,3	4,4	8,1
3 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	2,4	2,1	2,6	4,5	4,0	5,0	6,7	4,8	8,6
6 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	2,4	2,1	2,6	4,5	3,9	5,0	6,7	4,8	8,5
Hommes												
6 à 11 ans	1,4 ^E	0,86	1,9	2,3 ^E	1,1	3,5	4,4	3,2	5,6	5,5 ^E	2,1	8,8
12 à 19 ans	1,4	1,0	1,7	2,6 ^E	1,4	3,8	6,1 ^E	3,2	8,9	7,9 ^E	4,6	11
20 à 39 ans	1,4	1,1	1,8	2,5 ^E	1,4	3,7	F	.	.	X	.	.
40 à 59 ans	1,2	0,91	1,6	2,3	1,6	3,0	4,4	3,2	5,5	X	.	.
60 à 79 ans	1,1 ^E	0,7	1,5	2,4	1,8	3,1	4,3 ^E	2,4	6,3	X	.	.
3 à 79 ans	1,3	1,1	1,5	2,5	2,2	2,8	4,6	4,1	5,2	7,9^E	4,3	11
6 à 79 ans	1,3	1,1	1,5	2,5	2,1	2,8	4,6	4,1	5,2	7,3^E	4,0	11
Femmes												
6 à 11 ans	1,3	0,87	1,6	2,2 ^E	1,3	3,1	F	.	.	F	.	.
12 à 19 ans	1,2	0,85	1,5	2,4	1,8	3,0	3,4	3,0	3,9	4,3 ^E	2,6	6,1
20 à 39 ans	1,1 ^E	0,7	1,6	2,4	1,7	3,1	4,1	2,9	5,3	X	.	.
40 à 59 ans	1,2	0,8	1,5	2,0 ^E	1,2	2,8	F	.	.	X	.	.
60 à 79 ans	0,98	0,7	1,3	2,2 ^E	1,1	3,4	4,7 ^E	2,1	7,3	X	.	.
3 à 79 ans	1,1	0,98	1,3	2,3	2,0	2,7	4,1	3,0	5,1	6,6	4,9	8,4
6 à 79 ans	1,1	0,98	1,3	2,3	1,9	2,7	4,0	2,9	5,2	6,6	4,8	8,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.