

Tableau 60
Distribution du mercure (nmol/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Mercure											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nmol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1	1	2
6 à 11 ans	1	1	2
12 à 19 ans	1	1	2
20 à 39 ans	3,2	2,4	4,3
40 à 59 ans	5,0	4,0	6,4	0,7	0,5	0,9	.	.	.	1 ^E	0,5	2
60 à 79 ans	5,6	4,3	7,3	F	.	.	0,9	0,8	1	2,4	2	2,8
3 à 79 ans	3,5	2,8	4,3	.	.	.	1 ^E	0,6	1	3,0	2,1	3,9
6 à 79 ans	3,6	2,9	4,5	1 ^E	0,6	2
				1 ^E	0,7	2
Hommes												
6 à 11 ans	1	1	2
12 à 19 ans	1	1	2
20 à 39 ans	3,1	2,3	4,2	1 ^E	0,6	1
40 à 59 ans	6,2	4,6	8,4	0,8 ^E	0,5	1	1 ^E	0,5	2	2,5	2	3,3
60 à 79 ans	5,6	4,2	7,5	.	.	.	1 ^E	0,5	1	2,9	2	3,8
3 à 79 ans	3,6	2,8	4,6	1 ^E	0,6	2
6 à 79 ans	3,7	2,9	4,7	1 ^E	0,6	2
Femmes												
6 à 11 ans	2	1	2,1	F	.	.
12 à 19 ans	1	1	2
20 à 39 ans	3,3	2,4	4,6	1 ^E	0,4	2
40 à 59 ans	4,1	3,3	5,2	0,6 ^E	0,3	0,9	0,9	0,9	1	2,1	1	2,8
60 à 79 ans	5,6	4,2	7,4	0,6 ^E	0,2	1	1 ^E	0,3	2	3,0	2	4,1
3 à 79 ans	3,4	2,7	4,2	1 ^E	0,6	2
6 à 79 ans	3,4	2,8	4,3	1 ^E	0,7	2

	Mercure											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nmol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1 ^E	0,6	1	F	.	.	7,1 ^E	2,4	12	15 ^E	8,4	21
6 à 11 ans	1 ^E	0,6	2	3,1	2,3	3,9	6,1	4,3	7,9	10	6,7	13
12 à 19 ans	1 ^E	0,5	2	3,1	2,4	3,8	6,4	4,3	8,5	12 ^E	6,6	17
20 à 39 ans	3,2	2,1	4,3	8,1	5,6	11	15	9,8	20	26 ^E	13	39
40 à 59 ans	5,4	4,3	6,5	10	7,8	13	20 ^E	12	29	37 ^E	12	61
60 à 79 ans	6,1	4,6	7,6	11	8,7	14	21	16	27	32 ^E	19	46
3 à 79 ans	3,7	2,7	4,6	8,5	6,4	11	17	12	23	27^E	16	38
6 à 79 ans	3,8	2,8	4,8	8,7	6,5	11	17	12	23	28^E	17	39
Hommes												
6 à 11 ans	1	0,8	1	2,7	2	3,4	5,8 ^E	3,6	8,0	9,5 ^E	4,5	15
12 à 19 ans	1 ^E	0,5	1	3,1	2	4,1	6,8 ^E	2,8	11	13 ^E	7,3	19
20 à 39 ans	3,1	2,1	4,0	8,5 ^E	5,1	12	14	10	19	23 ^E	11	36
40 à 59 ans	6,0	4,9	7,1	13 ^E	8,0	19	F	.	.	F	.	.
60 à 79 ans	6,3	4,7	7,9	11	8,0	14	22	15	30	35 ^E	20	50
3 à 79 ans	3,8	2,7	5,0	9,7	7,3	12	19	13	26	30^E	13	47
6 à 79 ans	4,0	2,8	5,2	9,9	7,4	12	20	13	26	32^E	14	49
Femmes												
6 à 11 ans	2 ^E	0,8	2,3	3,5 ^E	2,2	4,9	6,6	4,6	8,5	10	6,9	14
12 à 19 ans	1 ^E	0,4	2	3,1	2,3	3,9	6	4,0	7,9	F	.	.
20 à 39 ans	3,5 ^E	2	5,0	7,9	5,4	10	16 ^E	7,2	24	F	.	.
40 à 59 ans	4,3	3,1	5,4	8,4	5,8	11	15	9,7	20	23 ^E	11	36
60 à 79 ans	5,8	4,2	7,4	11	8,5	14	21	14	28	F	.	.
3 à 79 ans	3,5	2,7	4,4	7,9	5,9	9,8	15	9,9	20	25^E	15	36
6 à 79 ans	3,7	2,8	4,6	7,9	6,0	9,9	15	9,9	20	25^E	15	36

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.