

Tableau 61
Distribution du mercure (µg/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Mercure											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,3	0,2	0,4
6 à 11 ans	0,3	0,2	0,3
12 à 19 ans	0,3	0,2	0,4
20 à 39 ans	0,64	0,47	0,85	0,2 ^E	0,09	0,3
40 à 59 ans	1,0	0,79	1,3	0,1	0,09	0,2	0,2	0,2	0,2	0,47	0,4	0,57
60 à 79 ans	1,1	0,87	1,5	F	.	.	0,2 ^E	0,1	0,3	0,59	0,42	0,77
3 à 79 ans	0,69	0,56	0,87	0,2^E	0,1	0,3
6 à 79 ans	0,71	0,57	0,89	0,2^E	0,1	0,4
Hommes												
6 à 11 ans	0,2	0,2	0,3
12 à 19 ans	0,3	0,2	0,4
20 à 39 ans	0,61	0,45	0,84	0,2 ^E	0,1	0,3
40 à 59 ans	1,2	0,91	1,7	0,2 ^E	0,1	0,2	0,2 ^E	0,1	0,3	0,50	0,3	0,67
60 à 79 ans	1,1	0,84	1,5	.	.	.	0,2 ^E	0,09	0,3	0,59	0,4	0,77
3 à 79 ans	0,72	0,57	0,91	0,2^E	0,1	0,3
6 à 79 ans	0,74	0,58	0,94	0,2^E	0,1	0,4
Femmes												
6 à 11 ans	0,3	0,2	0,4	F	.	.
12 à 19 ans	0,3	0,2	0,4
20 à 39 ans	0,66	0,47	0,92	0,2 ^E	0,09	0,4
40 à 59 ans	0,82	0,65	1,0	0,1 ^E	0,06	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,55
60 à 79 ans	1,1	0,84	1,5	0,1 ^E	0,04	0,2	0,2 ^E	0,06	0,3	0,60	0,4	0,82
3 à 79 ans	0,67	0,54	0,83	0,2^E	0,1	0,3
6 à 79 ans	0,69	0,55	0,86	0,2^E	0,1	0,4

	Mercure											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,2 ^E	0,1	0,3	F	.	.	1,4 ^E	0,44	2,3	3,0 ^E	1,7	4,3
6 à 11 ans	0,2 ^E	0,1	0,3	0,62	0,47	0,78	1,2	0,84	1,5	2,0	1,3	2,6
12 à 19 ans	0,2 ^E	0,1	0,3	0,62	0,47	0,76	1,3	0,84	1,7	2,4 ^E	1,3	3,5
20 à 39 ans	0,65	0,43	0,86	1,6	1,1	2,1	2,9	2,0	3,9	5,2 ^E	2,6	7,8
40 à 59 ans	1,0	0,84	1,2	2,1	1,5	2,6	4,1 ^E	2,4	5,8	7,3 ^E	2,5	12
60 à 79 ans	1,2	0,89	1,5	2,2	1,7	2,8	4,3	3,1	5,5	6,5 ^E	3,9	9,1
3 à 79 ans	0,74	0,55	0,93	1,7	1,2	2,1	3,4	2,4	4,5	5,5^E	3,3	7,6
6 à 79 ans	0,76	0,57	0,96	1,7	1,3	2,1	3,5	2,4	4,6	5,6^E	3,3	7,8
Hommes												
6 à 11 ans	0,2	0,2	0,2	0,54	0,4	0,68	1,1 ^E	0,70	1,5	1,9 ^E	0,86	2,9
12 à 19 ans	0,2 ^E	0,1	0,3	0,62	0,4	0,83	1,3 ^E	0,50	2,1	2,6 ^E	1,4	3,8
20 à 39 ans	0,62	0,43	0,80	1,6 ^E	0,98	2,3	2,9	2,1	3,7	4,7 ^E	2,2	7,1
40 à 59 ans	1,2	0,96	1,4	2,7 ^E	1,6	3,7	F	.	.	F	.	.
60 à 79 ans	1,2	0,92	1,6	2,2	1,6	2,9	4,5	2,9	6,0	7,0 ^E	3,9	10
3 à 79 ans	0,76	0,53	0,99	1,9	1,4	2,4	3,9	2,7	5,1	6,1^E	2,7	9,5
6 à 79 ans	0,80	0,56	1,0	1,9	1,4	2,4	3,9	2,7	5,2	6,3^E	2,9	9,7
Femmes												
6 à 11 ans	0,3 ^E	0,2	0,46	0,71 ^E	0,45	0,97	1,3	0,89	1,6	2,1	1,3	2,8
12 à 19 ans	0,2 ^E	0,08	0,3	0,62	0,46	0,78	1,2	0,79	1,5	F	.	.
20 à 39 ans	0,69 ^E	0,4	0,99	1,6	1,1	2,1	3,1 ^E	1,4	4,8	F	.	.
40 à 59 ans	0,85	0,64	1,1	1,7	1,1	2,2	2,9	1,9	3,9	4,7 ^E	2,1	7,2
60 à 79 ans	1,1	0,81	1,4	2,2	1,7	2,8	4,2	2,8	5,5	5,9 ^E	1,7	10
3 à 79 ans	0,71	0,53	0,88	1,5	1,1	1,9	3,0	2,0	4,0	5,1^E	3,0	7,1
6 à 79 ans	0,74	0,56	0,92	1,6	1,2	2,0	3,0	2,0	4,0	5,1^E	3,0	7,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.