


Enquête canadienne sur les mesures de la santé : tableaux de données du cycle 2



2009 à 2011



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à infostats@statcan.gc.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros sans frais suivants :

- Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
- Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
- Télécopieur 1-877-287-4369

Programme des services de dépôt

- Service de renseignements 1-800-635-7943
- Télécopieur 1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 82-626-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Notre organisme » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Enquête canadienne sur les mesures de la santé : tableaux de données du cycle 2

2009 à 2011

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2013

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'entente de licence ouverte de Statistique Canada.

<http://www.statcan.gc.ca/reference/licence-fra.html>

Avril 2013

N° 82-626-X au catalogue

ISSN 1929-7564

Périodicité : irrégulière

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Table des matières

Introduction

7

Tableaux statistiques

1	Pression diastolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011	9
2	Pression systolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011	10
3	Fréquence cardiaque au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011	11
4	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la tension artérielle, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	12
5	Population à domicile qui a autodéclaré prendre des médicaments pour l'hypertension ou qui a eu un résultat de tension artérielle hypertensive, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	13
6	Force de préhension totale de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	14
7	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la force de préhension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	15
8	Nombre de redressements assis partiels effectués par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	16
9	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux redressements assis partiels, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	17
10	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la santé du dos, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	18
11	Mesure de la flexion du tronc effectuée par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	19
12	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la flexion du tronc, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	20
13	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	21
14	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à l'aptitude aérobie, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	22
15	Puissance aérobie maximale prévue moyenne de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	23
16	Circonférence du cou mesurée chez la population à domicile âgée de 3 à 19 ans, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	24
17	Circonférence de la taille mesurée de la population à domicile - protocole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	25
18	Circonférence de la taille mesurée de la population à domicile - protocole des National Institutes of Health (NIH), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	26
19	Circonférence des hanches mesurée, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011	27

Table des matières – suite

20	Ratio taille/hanches mesuré, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011	28
21	Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la somme des mesures des cinq plis cutanés, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	29
22	Taille en position debout mesurée, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011	30
23	Poids mesuré, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011	31
24	Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	32
25	Distribution de la population à domicile âgée de 5 à 18 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	33
26	Distribution de la population à domicile âgée de 3 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode Center for Disease Control (CDC), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	34
27	Distribution de la population à domicile âgée de 3 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	35
28	Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	36
29	Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde par rapport à la capacité vitale forcée (VEMS/ CVF), selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011	37
30	Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	38
31	Meilleure capacité vitale forcée (CVF) de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	39
32	Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez la population à domicile âgée de 35 à 79 ans, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	40
33	Distribution des lipoprotéines de haute densité mesurées dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	41
34	Distribution des lipoprotéines de basse densité pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	42
35	Distribution du cholestérol total mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	43
36	Distribution du ratio du cholestérol total sur les lipoprotéines de haute densité pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	44
37	Distribution des triglycérides mesurés dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	45
38	Distribution de l'albumine mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	46
39	Distribution du calcium total mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	47
40	Distribution de la créatinine mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	48
41	Distribution de la gamma-glutamyl-transférase mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	49

Table des matières – suite

42	Distribution du phosphore mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	50
43	Distribution de l'urée mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	51
44	Distribution de l'acide urique mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	52
45	Distribution de l'hémoglobine mesurée dans le sang complet pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	53
46	Distribution de l'hématocrite mesurée dans le sang complet pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	54
47	Distribution du volume globulaire moyen mesuré dans le sang complet pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	55
48	Distribution du glucose mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	56
49	Prévalence de l'anticorps de surface du virus de l'hépatite B mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	57
50	Prévalence de l'herpès simplex-2 mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	57
51	Distribution de la ferritine mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	58
52	Distribution de l'iode mesuré dans l'urine pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	59
53	Distribution du ratio d'iode sur la créatinine pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	60
54	Distribution de l'hormone parathyroïdienne mesurée dans le plasma pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	61
55	Distribution de la vitamine B12 mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	62
56	Distribution de la vitamine D [(25-OH)] mesurée dans le plasma pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	63
57	Distribution du bisphéno A mesuré dans l'urine pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	64
58	Distribution du plomb ($\mu\text{mol/L}$) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	65
59	Distribution du plomb ($\mu\text{g/dL}$) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	66
60	Distribution du mercure (nmol/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	67
61	Distribution du mercure ($\mu\text{g/L}$) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	68
62	Distribution de cadmium (nmol/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile (non-fumeurs), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	69
63	Distribution de cadmium (nmol/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile (fumeurs), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	70

Table des matières – suite

64	Distribution de cadmium ($\mu\text{g/L}$) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile (non-fumeurs), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	71
65	Distribution de cadmium ($\mu\text{g/L}$) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile (fumeurs), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	72
66	Distribution de la concentration de benzène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	73
67	Distribution de la concentration de toluène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	74
68	Distribution de la concentration d'éthylbenzène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	75
69	Distribution de la concentration de m- & p-xylène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	76
70	Distribution de la concentration d'o-xylène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011	77

Appendice

I	Tableau de concordance	78
---	------------------------	----

Introduction

L'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) est l'enquête nationale la plus exhaustive sur les mesures physiques de la santé jamais menée au pays. La collecte des données se déroule en deux étapes principales, à savoir une interview en personne au domicile du répondant, suivie d'une visite à la clinique mobile de l'ECMS, où l'on prend des mesures physiques et prélève des échantillons de sang et d'urine. Des échantillons d'air intérieur sont aussi pris dans les maisons afin de mesurer un certain nombre de substances volatiles.

L'ECMS dresse un portrait de la santé des Canadiens, grâce à la collecte de données de base touchant divers sujets, y compris la santé cardiovasculaire, l'état nutritionnel, les maladies chroniques et l'activité physique, ainsi que l'exposition à des maladies infectieuses et à des contaminants environnementaux. L'enquête recueille des renseignements sur la santé qui ne pourraient être obtenus autrement ou qui pourraient être déclarés incorrectement par autodéclaration ou d'après les dossiers médicaux.

L'ECMS est menée par Statistique Canada, en partenariat avec Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.

Au cours du cycle 2 de l'ECMS, des mesures physiques ont été recueillies dans 18 sites au Canada, auprès de 6 395 personnes représentant la population canadienne de 3 à 79 ans. Les sites de collecte étaient situés dans sept provinces : Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique. La collecte a commencé en août 2009 et s'est poursuivie jusqu'en novembre 2011. Les données sont représentatives à l'échelon national.

Plusieurs tableaux de données du cycle 2 ont du contenu identique ou similaire aux tableaux de données du cycle 1. L'annexe 1 fournit un tableau de concordance pour les deux cycles.

Des données supplémentaires sont également disponibles pour les deux cycles dans le document de Santé Canada *Deuxième rapport sur la biosurveillance humaine des substances chimiques de l'environnement au Canada*

Pour obtenir plus de renseignements sur l'ECMS :

Numéro sans frais :	1-800-263-1136
Courriel :	infostats@statcan.gc.ca
Appareil de télécommunication pour malentendants :	1-866-753-7083
Site Web de Statistique Canada :	www.statcan.gc.ca

Tableaux statistiques

Tableau 1
Pression diastolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011

	Pression diastolique au repos moyenne											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres de mercure (mmHg)											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	61	61	62	49	48	51	52	51	53	56	55	57
12 à 19 ans	62	60	63	50	48	53	53	51	55	57	55	58
20 à 39 ans	69	67	70	55	54	57	58	57	59	62	61	63
40 à 59 ans	74	73	76	59	56	62	62	60	64	67	66	69
60 à 79 ans	72	71	73	57	55	59	60	58	61	66	64	67
6 à 79 ans	70	69	71	54	54	55	57	57	58	62	61	63
Hommes												
6 à 11 ans	61	60	62	48	46	50	51	48	53	56	55	57
12 à 19 ans	62	60	64	50	46	54	52	49	55	57	54	59
20 à 39 ans	70	69	72	57	55	60	59	58	61	64	62	65
40 à 59 ans	77	75	79	63	61	66	66	65	67	70	68	71
60 à 79 ans	73	72	74	58	56	59	60	57	62	66	65	68
6 à 79 ans	71	70	72	55	53	56	58	57	59	64	63	65
Femmes												
6 à 11 ans	62	61	63	51	49	53	53	52	54	56	55	57
12 à 19 ans	62	60	63	51	49	53	54	53	55	57	56	58
20 à 39 ans	67	65	69	53	50	56	57	56	58	60	59	62
40 à 59 ans	71	69	73	56	53	60	60	57	62	65	63	66
60 à 79 ans	71	70	72	56	53	59	59	57	61	65	63	67
6 à 79 ans	68	67	69	54	54	55	56	56	57	61	60	62

	Pression diastolique au repos moyenne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres de mercure (mmHg)											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	60	59	61	65	64	66	71	70	72	74	72	77
12 à 19 ans	61	60	62	65	64	67	70	68	73	73	70	77
20 à 39 ans	67	66	68	73	71	74	79	76	83	85	80	90
40 à 59 ans	73	71	74	79	77	82	87	84	89	90	86	93
60 à 79 ans	71	70	71	77	76	78	83	81	85	86	84	89
6 à 79 ans	68	68	69	75	74	76	82	80	84	87	85	89
Hommes												
6 à 11 ans	59	58	60	65	63	66	70	68	72	75	71	79
12 à 19 ans	61	59	63	66	64	68	70	67	73	74	70	78
20 à 39 ans	69	68	70	75	73	78	82	76	88	86	81	91
40 à 59 ans	75	74	77	82	80	84	89	86	92	93	84	101
60 à 79 ans	72	71	74	78	77	80	84	82	86	87	85	89
6 à 79 ans	70	69	71	77	76	79	85	82	88	89	86	91
Femmes												
6 à 11 ans	61	60	62	66	65	67	72	71	73	74	72	77
12 à 19 ans	61	60	62	65	63	66	71	68	73	73	70	75
20 à 39 ans	65	64	66	70	69	72	76	74	79	83	77	89
40 à 59 ans	70	67	72	76	74	78	82	79	84	86	83	90
60 à 79 ans	69	68	71	75	74	77	81	79	84	85	81	89
6 à 79 ans	67	65	68	73	72	74	79	77	81	84	82	86

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*)

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 2
Pression systolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011

	Pression systolique au repos moyenne											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres de mercure (mmHg)												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	94	94	95	82	81	83	84	83	85	88	88	89
12 à 19 ans	98	97	99	86	84	87	88	87	89	92	91	93
20 à 39 ans	105	103	107	87	85	90	91	90	92	97	95	98
40 à 59 ans	113	111	116	92	88	96	96	94	99	103	100	106
60 à 79 ans	124	122	125	99	98	100	103	101	104	111	109	114
6 à 79 ans	110	108	111	88	87	88	91	91	92	98	97	99
Hommes												
6 à 11 ans	94	93	95	82	80	83	84	83	85	88	87	89
12 à 19 ans	100	99	101	87	84	90	89	88	90	93	92	94
20 à 39 ans	109	106	112	92	90	94	94	90	99	101	99	103
40 à 59 ans	117	114	119	97	94	99	101	97	104	107	105	109
60 à 79 ans	122	120	125	99	97	100	102	100	104	111	108	114
6 à 79 ans	112	110	113	89	88	91	93	92	94	101	100	102
Femmes												
6 à 11 ans	95	94	96	83	81	84	84	82	86	89	88	90
12 à 19 ans	96	95	97	84	83	86	87	86	88	91	90	92
20 à 39 ans	101	100	102	85	83	88	88	86	91	93	91	96
40 à 59 ans	110	107	113	89	85	93	93	88	98	100	96	103
60 à 79 ans	125	124	127	100	97	102	103	100	105	112	109	115
6 à 79 ans	108	106	109	86	85	88	90	89	91	96	95	97

	Pression systolique au repos moyenne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres de mercure (mmHg)												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	93	92	94	99	98	99	104	102	107	109	105	113
12 à 19 ans	97	96	98	102	101	104	108	106	111	112	110	114
20 à 39 ans	103	101	105	111	108	114	119	116	122	126	119	132
40 à 59 ans	112	109	114	121	119	124	131	129	134	139	134	144
60 à 79 ans	121	120	123	133	131	136	146	143	149	157	149	165
6 à 79 ans	107	105	108	118	116	120	130	128	133	138	135	140
Hommes												
6 à 11 ans	92	91	93	98	96	99	105	101	109	111	106	115
12 à 19 ans	99	97	101	104	102	106	111	109	113	114	112	116
20 à 39 ans	107	105	110	115	112	118	121	117	126	129	119	138
40 à 59 ans	114	111	117	122	120	125	134	128	139	140	131	149
60 à 79 ans	119	116	122	131	126	135	143	139	146	152	148	155
6 à 79 ans	110	107	112	119	117	121	131	127	135	139	135	143
Femmes												
6 à 11 ans	94	93	95	99	98	101	104	102	106	108	105	110
12 à 19 ans	96	95	97	100	99	102	105	103	107	108	105	111
20 à 39 ans	99	98	101	105	103	107	113	110	117	123	114	131
40 à 59 ans	109	105	113	117	114	120	128	124	131	133	127	138
60 à 79 ans	124	123	126	134	132	136	147	142	152	163	153	173
6 à 79 ans	103	102	105	116	114	117	129	127	131	137	134	140

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 3
Fréquence cardiaque au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011

	Fréquence cardiaque au repos moyenne											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
battements par minute (bpm)												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	81	79	82	63	62	64	65	64	67	71	69	73
12 à 19 ans	74	72	76	54	53	56	57	55	60	66	64	67
20 à 39 ans	69	68	70	52	50	55	56	55	58	62	60	63
40 à 59 ans	67	66	68	53	51	55	56	55	57	60	60	61
60 à 79 ans	66	65	67	49	48	50	52	51	54	58	57	59
6 à 79 ans	69	69	70	52	51	53	56	55	57	61	60	62
Hommes												
6 à 11 ans	79	76	81	62	61	64	64	62	65	69	66	72
12 à 19 ans	73	70	75	53	51	55	55	53	57	63	60	66
20 à 39 ans	67	66	69	53	50	55	56	54	58	60	58	62
40 à 59 ans	67	65	68	53	52	54	55	54	56	59	59	60
60 à 79 ans	64	63	65	48	47	49	50	49	51	56	54	58
6 à 79 ans	68	67	69	52	51	53	55	54	56	60	59	61
Femmes												
6 à 11 ans	83	81	84	64	62	66	68	65	71	75	73	77
12 à 19 ans	75	74	77	59	54	63	62	60	64	68	66	70
20 à 39 ans	71	69	72	51	47	56	58	55	61	63	61	66
40 à 59 ans	68	67	69	54	50	58	58	56	59	61	60	62
60 à 79 ans	68	67	69	51	47	55	56	54	57	60	58	62
6 à 79 ans	71	70	71	54	51	57	58	57	59	63	62	64

	Fréquence cardiaque au repos moyenne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
battements par minute (bpm)												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	80	77	82	87	86	89	95	92	98	103	96	109
12 à 19 ans	73	71	74	81	78	83	89	87	92	93	88	98
20 à 39 ans	68	67	70	76	74	77	80	78	83	85	83	86
40 à 59 ans	66	64	67	72	71	73	79	77	81	85	82	88
60 à 79 ans	65	64	66	72	70	73	79	77	82	85	83	88
6 à 79 ans	68	67	68	75	74	76	83	82	85	88	87	90
Hommes												
6 à 11 ans	76	73	79	86	81	90	92	88	96	99	88	109
12 à 19 ans	71	69	74	79	76	82	89	84	94	97	86	108
20 à 39 ans	65	63	68	74	71	77	80	77	82	84	82	86
40 à 59 ans	64	63	66	72	69	74	80	75	84	86	81	91
60 à 79 ans	63	61	64	69	68	70	76	73	80	86	80	92
6 à 79 ans	66	65	67	74	73	76	83	80	85	88	85	90
Femmes												
6 à 11 ans	82	81	83	89	87	91	97	91	102	104	98	110
12 à 19 ans	74	71	76	82	79	84	89	87	92	92	91	94
20 à 39 ans	71	70	72	77	75	79	81	78	85	85	83	88
40 à 59 ans	67	65	69	72	71	74	78	75	80	82	79	86
60 à 79 ans	67	66	68	74	72	76	82	79	85	85	83	88
6 à 79 ans	70	69	71	76	75	77	84	83	85	88	87	90

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 4
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la tension artérielle, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives à la tension artérielle								
	Dans les limites souhaitables			Dans les limites souhaitables, mais dans les valeurs supérieures à la normale			Au-dessus des limites souhaitables		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
	pourcentage								
Les deux sexes									
18 à 39 ans	94,7	89,4	97,4	F	.	.	F	.	.
40 à 59 ans	82,7	77,4	86,9	9,3	6,8	12,6	6,5 ^E	3,9	10,6
60 à 79 ans	67,1	62,9	71,0	17,9	14,5	21,9	10,5	8,2	13,5
18 à 79 ans	84,1	80,7	87,0	8,9	7,3	10,9	5,4	3,8	7,5
Hommes									
18 à 39 ans	91,7	81,8	96,4	F	.	.	F	.	.
40 à 59 ans	75,8	67,8	82,3	11,3 ^E	7,6	16,5	10,5 ^E	5,5	19,2
60 à 79 ans	69,3	61,9	75,8	17,3	12,4	23,7	9,7 ^E	6,5	14,1
18 à 79 ans	80,7	75,0	85,4	10,5	7,6	14,5	6,9^E	4,2	11,3
Femmes									
18 à 39 ans	97,7	95,7	98,8	F	.	.	F	.	.
40 à 59 ans	89,6	83,9	93,4	7,2 ^E	4,1	12,6	F	.	.
60 à 79 ans	65,0	60,8	69,0	18,4	13,4	24,7	11,3 ^E	7,6	16,5
18 à 79 ans	87,4	85,3	89,2	7,4	5,9	9,1	3,8^E	2,6	5,4

	Normes relatives à la tension artérielle								
	Modérément élevée			Élevée			Très élevée		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
	pourcentage								
Les deux sexes									
18 à 39 ans	X	.	.	X	.	.	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	F	.	.	X	.	.	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	3,9 ^E	2,4	6,4	X	.	.	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	1,1^E	0,7	1,7	X	.	.	0,0	0,0	0,0
Hommes									
18 à 39 ans	X	.	.	X	.	.	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	X	.	.	X	.	.	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	3,1 ^E	1,9	5,0	X	.	.	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	0,9^E	0,5	1,6	X	.	.	0,0	0,0	0,0
Femmes									
18 à 39 ans	X	.	.	X	.	.	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	X	.	.	X	.	.	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	4,7 ^E	2,3	9,3	X	.	.	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	1,3^E	0,7	2,3	X	.	.	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de D. Abbott, N. Campbell, P. Carruthers-Czyzewski, A. Chockalingam, M. David, G. Dunkley, E. Ellis, J.G. Fodor, D. McKay, V.R. Ramsden, 1994, « Guidelines for measurement of blood pressure, follow-up, and lifestyle counselling », Canadian Journal of Public Health, Vol. 85 (suppl 2), p. S29 à S35. Population à domicile âgée de 18 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 5
Population à domicile qui a autodéclaré prendre des médicaments pour l'hypertension ou qui a eu un résultat de tension artérielle hypertensive, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Hypertension mesurée ou prend des médicaments pour l'hypertension			Aucune hypertension mesurée et ne prend pas des médicaments pour l'hypertension		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
6 à 11 ans	2,7 ^E	1,6	4,6	97,3	95,4	98,4
12 à 19 ans	X	.	.	99,5	98,8	99,8
20 à 39 ans	3,6 ^E	2,0	6,2	96,4	93,8	98,0
40 à 59 ans	21,7	16,6	27,8	78,3	72,2	83,4
60 à 79 ans	52,4	47,7	57,2	47,6	42,8	52,3
6 à 79 ans	18,0	15,8	20,4	82,0	79,6	84,2
Hommes						
6 à 11 ans	3,2 ^E	1,7	5,9	96,8	94,1	98,3
12 à 19 ans	X	.	.	99,3	97,8	99,8
20 à 39 ans	3,2 ^E	1,6	6,2	96,8	93,8	98,4
40 à 59 ans	28,6	20,4	38,6	71,4	61,4	79,6
60 à 79 ans	57,7	51,6	63,5	42,3	36,5	48,4
6 à 79 ans	20,8	17,0	25,2	79,2	74,8	83,0
Femmes						
6 à 11 ans	F	.	.	97,8	95,3	99,0
12 à 19 ans	X	.	.	99,8	99,0	100,0
20 à 39 ans	F	.	.	96,0	91,1	98,3
40 à 59 ans	14,7	10,4	20,5	85,3	79,5	89,6
60 à 79 ans	47,6	41,0	54,3	52,4	45,7	59,0
6 à 79 ans	15,2	13,0	17,6	84,8	82,4	87,0

Note(s) : L'hypertension chez les répondants âgés de 6 à 17 ans est caractérisée par une tension artérielle systolique ou diastolique \geq 95e percentile (2004, "National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents", Pediatrics, Vol. 114(2 Suppl. 4th report), pp. 555-76). L'hypertension chez les répondants âgés de 18 à 79 ans est caractérisée par une tension artérielle systolique \geq 140 bpm ou une tension artérielle diastolique \geq 90 bpm (Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al., 2003, "Seventh report on the Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure", Hypertension, 42(6) pp. 1206-52). Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 6
Force de préhension totale de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Force de préhension totale											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	kilogrammes											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	26	25	27	12	11	13	15	13	16	19	18	20
12 à 19 ans	58	56	60	31	29	33	35	33	38	42	40	45
20 à 39 ans	73	70	75	40	35	46	45	43	47	52	50	55
40 à 59 ans	71	68	73	41	39	43	44	43	46	52	49	54
60 à 79 ans	60	58	62	31	28	34	35	33	37	43	42	45
6 à 79 ans	65	63	67	26	25	28	34	33	36	46	45	48
Hommes												
6 à 11 ans	27	25	28	12	10	14	16	13	19	20	17	22
12 à 19 ans	68	65	71	30	27	34	36	29	42	51	43	58
20 à 39 ans	92	89	95	68	59	76	72	67	77	84	80	88
40 à 59 ans	88	84	92	58	46	70	66	56	75	77	72	82
60 à 79 ans	77	74	80	53	48	58	57	53	60	65	62	68
6 à 79 ans	81	78	83	27	26	29	45	42	48	69	66	73
Femmes												
6 à 11 ans	25	24	26	12	10	14	14	12	17	19	18	20
12 à 19 ans	47	46	49	32	30	34	35	34	36	39	37	41
20 à 39 ans	53	51	56	35	28	42	41	36	45	47	45	48
40 à 59 ans	53	51	55	36	32	40	41	39	43	46	44	47
60 à 79 ans	45	43	46	29	22	35	31	30	33	37	36	39
6 à 79 ans	49	48	50	25	24	27	32	30	33	42	40	43

	Force de préhension totale											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	kilogrammes											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	25	24	25	30	29	32	37	35	39	42	39	46
12 à 19 ans	54	51	57	71	68	74	86	82	89	92	90	94
20 à 39 ans	69	65	74	93	89	96	104	99	110	111	106	116
40 à 59 ans	65	60	69	88	83	92	103	98	108	110	105	115
60 à 79 ans	56	53	58	75	72	78	90	87	94	97	94	99
6 à 79 ans	60	57	62	84	81	86	98	95	102	107	104	110
Hommes												
6 à 11 ans	25	24	26	31	29	34	39	35	43	44	39	48
12 à 19 ans	70	66	73	84	80	87	92	90	94	100	96	104
20 à 39 ans	93	89	96	100	95	105	111	106	116	118	113	124
40 à 59 ans	88	84	92	100	97	103	110	105	115	116	112	120
60 à 79 ans	76	72	79	87	84	91	97	94	100	103	99	107
6 à 79 ans	84	81	86	96	93	99	107	105	110	113	110	117
Femmes												
6 à 11 ans	24	22	25	30	28	31	35	33	36	38	36	40
12 à 19 ans	46	44	49	54	53	56	59	58	61	63	59	66
20 à 39 ans	52	50	54	59	56	62	67	62	72	73	65	80
40 à 59 ans	53	50	55	59	57	61	65	62	67	69	65	72
60 à 79 ans	44	42	46	51	49	52	56	53	59	60	55	65
6 à 79 ans	49	48	51	57	55	58	63	61	66	68	63	72

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 7
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la force de préhension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives à la force de préhension									
	À améliorer			Acceptable			Bien			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à	
pourcentage										
Les deux sexes										
15 à 19 ans	45,9	36,3	55,7	22,2	16,6	29,1	19,9	14,5	26,7	
20 à 39 ans	32,8	26,3	40,0	29,6	24,1	35,9	17,9	13,6	23,2	
40 à 59 ans	24,8	18,4	32,5	18,6	14,7	23,4	21,1	17,4	25,5	
60 à 69 ans	28,1	21,3	36,0	19,7	16,3	23,7	14,0	10,8	18,1	
15 à 69 ans	30,0	25,3	35,3	23,2	20,6	25,9	18,8	16,7	21,1	
Hommes										
15 à 19 ans	52,3	38,1	66,2	25,2 ^E	15,8	37,6	12,8 ^E	7,2	21,8	
20 à 39 ans	23,6	18,4	29,8	33,2	25,7	41,7	22,5	17,1	29,1	
40 à 59 ans	26,1 ^E	16,6	38,6	18,0	12,7	24,8	22,3	15,5	31,0	
60 à 69 ans	32,0	23,5	41,9	23,9	18,2	30,7	15,6	11,6	20,5	
15 à 69 ans	28,3	22,2	35,3	25,1	22,0	28,6	20,6	16,7	25,1	
Femmes										
15 à 19 ans	39,0	32,1	46,4	19,1	14,3	25,0	27,4	21,5	34,1	
20 à 39 ans	42,0	32,8	51,8	26,1	19,1	34,4	13,3 ^E	8,4	20,4	
40 à 59 ans	23,6	17,2	31,4	19,3	14,1	25,9	20,0	15,4	25,6	
60 à 69 ans	24,4	18,2	31,8	15,7	12,7	19,2	12,6	8,7	17,7	
15 à 69 ans	31,8	27,3	36,5	21,2	17,4	25,6	17,0	14,3	20,2	

	Normes relatives à la force de préhension					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	8,7 ^E	6,0	12,3	3,4 ^E	2,0	5,7
20 à 39 ans	12,8	9,0	17,8	6,9 ^E	3,8	12,0
40 à 59 ans	20,2	15,8	25,6	15,2	11,4	19,9
60 à 69 ans	21,8	18,8	25,3	16,3	11,6	22,6
15 à 69 ans	16,7	13,5	20,5	11,3	8,1	15,4
Hommes						
15 à 19 ans	6,6 ^E	3,8	11,2	3,1 ^E	1,5	6,0
20 à 39 ans	13,3 ^E	7,5	22,5	7,3 ^E	4,6	11,5
40 à 59 ans	12,5	8,9	17,3	21,2	15,7	28,0
60 à 69 ans	17,3	12,7	23,2	11,2 ^E	7,4	16,8
15 à 69 ans	13	9,4	17,6	13,0	9,9	16,9
Femmes						
15 à 19 ans	10,8 ^E	7,2	16,1	F	.	.
20 à 39 ans	12,2	8,5	17,3	F	.	.
40 à 59 ans	27,8	20,4	36,7	9,3 ^E	6,3	13,5
60 à 69 ans	26,2	21,0	32,1	21,2 ^E	14,5	29,9
15 à 69 ans	20,4	16,3	25,3	9,5^E	6,0	15,0

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 8
Nombre de redressements assis partiels effectués par la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Nombre de redressements assis partiels											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	nombre											
Les deux sexes												
8 à 11 ans	11	10	13	0†	0	0	0‡	0	0	F	.	.
12 à 19 ans	19	18	20	0‡	-3	3	7 ^E	4	10	14	13	16
20 à 39 ans	15	14	16	0†	0	0	0‡	0	0	F	.	.
40 à 59 ans	10	8	11	0†	0	0	0†	0	0	0‡	0	0
60 à 69 ans	4	4	5	0†	0	0	0†	0	0	0†	0	0
8 à 69 ans	12	12	13	0†	0	0	0†	0	0	0†	0	0
Hommes												
8 à 11 ans	11	9	13	0†	0	0	0‡	0	0	F	.	.
12 à 19 ans	21	20	22	7 ^E	4	11	12	9	15	19	16	22
20 à 39 ans	19	17	20	0†	0	0	0‡	-6	6	13	10	15
40 à 59 ans	13	11	15	0†	0	0	0‡	0	0	0‡	-2	2
60 à 69 ans	7	5	8	0†	0	0	0†	0	0	0†	0	0
8 à 69 ans	15	14	16	0†	0	0	0‡	0	0	F	.	.
Femmes												
8 à 11 ans	12	10	13	0†	0	0	0†	0	0	F	.	.
12 à 19 ans	17	16	19	0‡	-1	1	F	.	.	12	9	14
20 à 39 ans	11	10	13	0†	0	0	0†	0	0	0†	0	0
40 à 59 ans	6	5	8	0†	0	0	0†	0	0	0†	0	0
60 à 69 ans	2 ^E	1	3	0†	0	0	0†	0	0	0†	0	0
8 à 69 ans	9	9	10	0†	0	0	0†	0	0	0‡	0	0

	Nombre de redressements assis partiels											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	nombre											
Les deux sexes												
8 à 11 ans	10	8	12	19	16	21	25†	24	26	25†	25	25
12 à 19 ans	23	22	24	25†	25	25	25†	25	25	25†	25	25
20 à 39 ans	18	16	20	25†	25	25	25†	25	25	25†	25	25
40 à 59 ans	F	.	.	22	20	25	25	24	25	25	25	25
60 à 69 ans	0† ^E	0	0	F	.	.	24	21	26	25†	25	25
8 à 69 ans	12	11	13	24	24	24	25	25	25	25	25	25
Hommes												
8 à 11 ans	10 ^E	6	13	18	14	22	25†	24	26	25†	25	25
12 à 19 ans	24	23	24	25†	25	25	25†	25	25	25†	25	25
20 à 39 ans	24	21	27	25†	25	25	25†	25	25	25†	25	25
40 à 59 ans	14 ^E	9	19	24	24	25	25	25	25	25	25	25
60 à 69 ans	0† ^E	0	0	13 ^E	6	20	25†	24	26	25†	25	25
8 à 69 ans	19	16	22	24	24	24	25	25	25	25	25	25
Femmes												
8 à 11 ans	10	8	12	19	16	23	25†	24	26	25†	25	25
12 à 19 ans	19	16	23	25†	25	25	25†	25	25	25†	25	25
20 à 39 ans	10	7	13	22	19	24	25†	25	25	25†	25	25
40 à 59 ans	0† ^E	0	0	13 ^E	8	19	25†	23	27	25†	25	25
60 à 69 ans	0†	0	0	0†	0	0	F	.	.	23 ^E	11	36
8 à 69 ans	F	.	.	19	18	21	25†	25	25	25†	25	25

† bruit introduit afin de calculer l'estimation

‡ le coefficient de variation ne peut être calculé, utiliser l'intervalle de confiance comme mesure de qualité

Note(s) : Population à domicile âgée de 8 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 9
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux redressements assis partiels, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives aux redressements assis partiels								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	19,1	13,5	26,5	13,5	9,8	18,4	8,7 ^E	4,8	15,2
20 à 39 ans	27,8	23,4	32,7	13,1	9,1	18,5	9,8 ^E	6,6	14,1
40 à 59 ans	51,9	45,1	58,6	5,6 ^E	3,4	8,9	10,2	7,9	13,2
60 à 69 ans	77,8	75,1	80,3	2,5 ^E	1,3	4,7	3,9 ^E	2,5	5,9
15 à 69 ans	43,2	40,1	46,4	8,7	7,2	10,5	9,1	7,5	10,9
Hommes									
15 à 19 ans	F	.	.	9,8 ^E	5,0	18,2	F	.	.
20 à 39 ans	18,0	13,7	23,4	11,5 ^E	7,0	18,3	F	.	.
40 à 59 ans	36,1	28,0	45,1	8,6 ^E	4,8	14,9	8,8 ^E	5,8	13,2
60 à 69 ans	68,9	62,5	74,6	F	.	.	4,9 ^E	2,7	8,4
15 à 69 ans	31,6	27,1	36,5	9,0	6,4	12,6	7,1^E	4,8	10,2
Femmes									
15 à 19 ans	24,2	17,5	32,4	17,7	12,9	23,9	F	.	.
20 à 39 ans	37,3	30,3	44,9	14,7 ^E	8,5	24,2	13,7	9,5	19,4
40 à 59 ans	66,5	57,9	74,2	F	.	.	11,5 ^E	7,4	17,6
60 à 69 ans	87,0	80,4	91,6	X	.	.	F	.	.
15 à 69 ans	54,5	51,2	57,8	8,5	6,1	11,7	11,0	8,3	14,6
	Normes relatives aux redressements assis partiels								
	Très bien			Excellent					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance				
		de	à		de	à			
	pourcentage								
Les deux sexes									
15 à 19 ans	12,7	8,9	17,8	45,9	38,8	53,2			
20 à 39 ans	15,1	11,8	19,2	34,2	30,0	38,7			
40 à 59 ans	12,0	8,4	17,0	20,3	16,1	25,3			
60 à 69 ans	6,4	4,9	8,2	9,5	6,9	12,9			
15 à 69 ans	12,5	10,1	15,4	26,4	24,1	29,0			
Hommes									
15 à 19 ans	13,4 ^E	7,8	22,1	53,7	41,9	65,1			
20 à 39 ans	15,0	10,4	21,1	49,8	40,3	59,3			
40 à 59 ans	16,1 ^E	10,6	23,7	30,4	23,5	38,3			
60 à 69 ans	9,1 ^E	5,5	14,5	14,4 ^E	9,6	21,1			
15 à 69 ans	14,5	11,3	18,4	37,8	32,6	43,4			
Femmes									
15 à 19 ans	11,9 ^E	7,6	18,3	37,2	28,4	47,1			
20 à 39 ans	15,3	10,9	21,0	19,0	14,9	24,0			
40 à 59 ans	8,2 ^E	5,0	13,1	11,0 ^E	6,4	18,1			
60 à 69 ans	3,6 ^E	2,0	6,5	F	.	.			
15 à 69 ans	10,6	8,1	13,8	15,4	12,8	18,3			

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 10
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la santé du dos, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives à la santé du dos								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	6,0 ^E	3,9	9,3	12,7	9,3	17,1	19,9	16,1	24,3
20 à 39 ans	12,5	9,1	17,0	16,9	12,4	22,6	23,4	17,7	30,2
40 à 59 ans	23,7	18,4	30,0	23,2	18,2	29,2	20,0	16,1	24,6
60 à 69 ans	32,1	25,2	40,0	33,3	28,2	38,8	12,6	9,9	15,8
15 à 69 ans	19,4	16,2	23,0	21,5	18,3	25,1	20,1	17,2	23,3
Hommes									
15 à 19 ans	F	.	.	12,7 ^E	6,7	22,6	25,2	19,0	32,6
20 à 39 ans	9,0 ^E	5,1	15,1	15,5 ^E	8,9	25,5	30,0	20,6	41,5
40 à 59 ans	18,2 ^E	11,6	27,4	20,0	15,6	25,2	22,2	17,2	28,1
60 à 69 ans	31,1	22,9	40,7	30,9	25,3	37,2	17,3	13,2	22,3
15 à 69 ans	15,5	11,6	20,4	19,2	15,9	23,0	24,6	19,7	30,4
Femmes									
15 à 19 ans	7,6 ^E	3,9	14,5	12,7 ^E	7,5	20,7	14,4 ^E	9,5	21,2
20 à 39 ans	16,2	11,7	22,0	18,4 ^E	12,6	25,9	16,5 ^E	11,1	23,9
40 à 59 ans	29,2	22,7	36,7	26,5	19,0	35,7	17,8	12,8	24,1
60 à 69 ans	33,1	23,3	44,6	35,4	28,2	43,4	8,2 ^E	5,5	12,0
15 à 69 ans	23,3	19,3	27,9	23,8	19,2	29,0	15,6	12,9	18,7

	Normes relatives à la santé du dos					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	46,8	40,5	53,3	14,5	11,3	18,5
20 à 39 ans	34,8	29,5	40,4	12,5	10,2	15,1
40 à 59 ans	22,7	18,0	28,1	10,4	7,7	13,9
60 à 69 ans	16,9	12,5	22,3	5,2 ^E	3,4	7,8
15 à 69 ans	28,3	25,3	31,5	10,7	9,4	12,3
Hommes						
15 à 19 ans	46,8	37,9	55,8	10,8 ^E	7,2	16,0
20 à 39 ans	33,5	26,4	41,4	12,1 ^E	6,9	20,2
40 à 59 ans	24,9	20,5	30,0	14,7 ^E	9,9	21,1
60 à 69 ans	14,6	10,4	20,1	6,1 ^E	3,8	9,4
15 à 69 ans	28,5	24,4	33,0	12,2	9,3	15,8
Femmes						
15 à 19 ans	46,9	36,5	57,5	18,4	14,1	23,7
20 à 39 ans	36,1	28,9	44,0	12,9	9,6	16,9
40 à 59 ans	20,4 ^E	13,9	29,0	6,1 ^E	3,4	10,8
60 à 69 ans	19,0	13,7	25,7	F	.	.
15 à 69 ans	28,0	24,8	31,6	9,3	7,7	11,2

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 11
Mesure de la flexion du tronc effectuée par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Mesure de la flexion du tronc											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	25,9	25,1	26,7	11,9	9,9	13,8	15,8	14,2	17,3	20,5	19,3	21,6
12 à 19 ans	25,7	24,4	27,0	7,5	5,5	9,5	11,2	9,5	12,9	16,8	14,6	18,9
20 à 39 ans	26,1	24,3	28,0	F	.	.	8,0 ^E	4,2	11,9	18,8	15,0	22,6
40 à 59 ans	25,5	24,3	26,6	8,9	7,4	10,3	11,8	10,2	13,3	18,5	17,2	19,8
60 à 69 ans	21,5	20,4	22,6	3,3 ^E	1,0	5,6	6,5	4,3	8,8	13,7	12,2	15,2
6 à 69 ans	25,2	24,4	26,1	6,3	5,1	7,6	10,3	9,0	11,6	17,8	16,6	18,9
Hommes												
6 à 11 ans	24,0	23,1	24,8	11,4	9,2	13,6	15,2	13,3	17,1	19,3	17,9	20,7
12 à 19 ans	21,6	19,5	23,7	4,3 ^E	2,5	6,2	8,3	5,6	11,0	13,9	11,9	15,8
20 à 39 ans	22,4	19,6	25,3	0,0††	-3,8	3,8	F	.	.	13,9	9,0	18,8
40 à 59 ans	23,0	21,9	24,1	5,9 ^E	2,6	9,3	9,6	7,8	11,4	16,2	14,9	17,5
60 à 69 ans	17,0	16,1	18,0	0,0††	-0,7	0,7	3,3 ^E	1,2	5,5	9,4	6,9	12,0
6 à 69 ans	22,0	20,9	23,0	3,2^E	1,7	4,7	7,0	5,2	8,7	14,3	13,3	15,3
Femmes												
6 à 11 ans	27,9	26,8	29,0	11,9	7,9	15,8	16,7	13,1	20,2	23,2	21,7	24,7
12 à 19 ans	30,1	28,6	31,5	14,2	12,9	15,5	15,9	14,4	17,4	23,9	21,8	26,1
20 à 39 ans	29,9	28,4	31,4	11,1 ^E	6,0	16,2	15,6	12,5	18,7	23,7	20,3	27,2
40 à 59 ans	27,8	26,2	29,5	10,9	7,1	14,8	15,0	13,0	16,9	20,9	18,4	23,5
60 à 69 ans	26,1	24,7	27,6	8,7	6,6	10,9	12,2	10,6	13,8	20,4	18,4	22,3
6 à 69 ans	28,6	27,7	29,4	11,1	9,0	13,1	15,0	14,1	15,9	22,1	20,4	23,8

	Mesure de la flexion du tronc											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	26,5	25,6	27,4	31,6	30,8	32,4	35,2	33,9	36,5	37,5	35,9	39,1
12 à 19 ans	26,1	24,3	27,9	34,1	32,7	35,4	39,0	37,2	40,8	43,0	41,1	44,9
20 à 39 ans	27,3	25,3	29,2	34,5	33,2	35,9	41,3	38,8	43,7	43,4	42,6	44,1
40 à 59 ans	25,9	24,6	27,2	32,6	31,2	34,0	37,7	36,6	38,7	41,4	39,2	43,7
60 à 69 ans	21,9	20,5	23,4	28,5	26,9	30,1	36,1	34,5	37,6	39,1	36,8	41,3
6 à 69 ans	26,1	25,4	26,9	33,0	32,2	33,8	38,5	37,6	39,4	42,4	41,6	43,1
Hommes												
6 à 11 ans	24,0	22,7	25,3	29,4	28,1	30,6	33,3	31,4	35,1	35,4	33,5	37,4
12 à 19 ans	21,3	19,3	23,2	28,7	25,8	31,5	34,7	31,4	38,1	38,0	33,6	42,4
20 à 39 ans	24,0	20,3	27,8	31,2	28,1	34,2	37,1	33,6	40,7	41,0	36,5	45,4
40 à 59 ans	23,3	21,1	25,6	30,7	28,7	32,6	34,7	33,4	36,0	36,6	35,0	38,3
60 à 69 ans	16,4	14,7	18,1	23,9	21,8	25,9	29,9	27,6	32,1	33,2	30,1	36,3
6 à 69 ans	22,4	21,0	23,8	29,9	28,5	31,4	35,0	33,9	36,1	38,0	36,2	39,8
Femmes												
6 à 11 ans	29,4	28,1	30,6	33,2	32,3	34,1	36,4	35,1	37,7	39,1	37,1	41,0
12 à 19 ans	31,0	29,0	33,1	37,0	34,9	39,1	42,0	39,4	44,5	44,3	42,5	46,1
20 à 39 ans	30,7	28,5	32,9	37,0	35,2	38,8	43,1	41,8	44,4	44,4	43,1	45,7
40 à 59 ans	27,3	25,0	29,6	34,8	32,3	37,3	40,1	36,9	43,3	42,7	40,6	44,7
60 à 69 ans	26,2	24,9	27,5	32,9	29,2	36,6	37,8	35,7	39,9	41,9	39,4	44,3
6 à 69 ans	28,9	27,8	30,1	35,5	34,4	36,5	41,5	39,9	43,1	43,6	42,7	44,5

† bruit introduit afin de calculer l'estimation

‡ le coefficient de variation ne peut être calculé, utiliser l'intervalle de confiance comme mesure de qualité

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 12
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la flexion du tronc, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives à la flexion du tronc								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	46,1	38,8	53,6	17,2	13,1	22,2	14,0	11,4	17,2
20 à 39 ans	41,9	33,7	50,5	18,7	14,3	24,1	16,0 ^E	11,0	22,6
40 à 59 ans	29,3	24,6	34,5	24,6	20,3	29,6	13,6	10,7	17,1
60 à 69 ans	36,1	31,0	41,6	20,0	16,4	24,3	17,2	13,6	21,5
15 à 69 ans	36,5	32,9	40,2	21,1	18,9	23,5	15,0	12,2	18,4
Hommes									
15 à 19 ans	53,2	41,9	64,1	14,8 ^E	9,9	21,4	13,2	9,6	18,0
20 à 39 ans	48,0	37,9	58,3	18,3	13,5	24,3	14,8 ^E	9,0	23,4
40 à 59 ans	24,6	20,9	28,7	27,2	21,0	34,4	13,8	10,5	17,9
60 à 69 ans	41,7	34,6	49,3	19,5 ^E	12,9	28,5	15,8	11,5	21,3
15 à 69 ans	38,5	34,2	42,9	21,6	18,9	24,6	14,4	11,7	17,6
Femmes									
15 à 19 ans	38,6	31,0	46,8	19,7	15,2	25,2	14,9	10,4	20,8
20 à 39 ans	35,6	26,1	46,4	19,1	13,2	26,9	17,2 ^E	11,3	25,4
40 à 59 ans	33,9	26,5	42,2	22,2	17,5	27,7	13,4	9,3	18,8
60 à 69 ans	30,3	24,8	36,3	20,5	16,9	24,8	18,7	13,6	25,1
15 à 69 ans	34,4	29,6	39,6	20,6	17,9	23,7	15,7	12,0	20,2

	Normes relatives à la flexion du tronc					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	13,3	9,6	18,3	9,3 ^E	5,7	14,8
20 à 39 ans	11,5	8,6	15,3	11,9	8,9	15,8
40 à 59 ans	19,6	15,0	25,3	12,8	9,9	16,5
60 à 69 ans	11,9	9,6	14,7	14,8	10,8	19,9
15 à 69 ans	14,9	12,6	17,6	12,5	10,6	14,5
Hommes						
15 à 19 ans	12,1 ^E	7,4	19,3	F	.	.
20 à 39 ans	11,2 ^E	7,4	16,4	7,8 ^E	4,2	14,2
40 à 59 ans	23,5	16,2	33,0	10,9 ^E	6,6	17,6
60 à 69 ans	16,2	11,6	22,2	6,7	4,8	9,2
15 à 69 ans	16,8	13,3	20,9	8,8	6,7	11,3
Femmes						
15 à 19 ans	14,6 ^E	8,6	23,8	12,1 ^E	6,4	21,8
20 à 39 ans	11,9 ^E	8,0	17,4	16,1	11,4	22,2
40 à 59 ans	15,9	11,0	22,3	14,7 ^E	10,1	20,8
60 à 69 ans	7,4 ^E	5,0	10,8	23,1 ^E	15,8	32,6
15 à 69 ans	13,1	10,5	16,3	16,2	13,2	19,6

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (*Guide du conseiller CPHV*), 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 13
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	13,4	10,9	16,2	41,5	35,1	48,2	32,2	26,4	38,5
20 à 39 ans	14,7	10,8	19,7	31,2	27,3	35,4	34,8	29,7	40,3
40 à 59 ans	15,6 ^E	10,6	22,3	25,4	21,3	30,0	34,4	29,4	39,7
60 à 69 ans	19,7 ^E	13,5	27,8	32,1	27,2	37,4	29,1	25,0	33,7
15 à 69 ans	15,7	12,7	19,2	29,9	26,9	33,1	33,6	30,4	36,8
Hommes									
15 à 19 ans	8,8 ^E	5,6	13,7	48,3	41,1	55,6	32,3	25,2	40,3
20 à 39 ans	9,0 ^E	4,8	16,1	30,0	25,3	35,3	36,0	28,5	44,2
40 à 59 ans	12,2 ^E	6,4	22,1	22,8	16,8	30,1	34,4	28,3	41,1
60 à 69 ans	21,2 ^E	14,5	29,8	34,3	27,3	42,1	29,3	23,4	36,1
15 à 69 ans	12,0	8,4	16,9	29,4	26,3	32,7	34,1	29,8	38,7
Femmes									
15 à 19 ans	18,2	13,8	23,6	34,3	24,5	45,6	32,0	23,6	41,7
20 à 39 ans	20,5	16,1	25,8	32,4	26,6	38,9	33,6	28,0	39,6
40 à 59 ans	18,9 ^E	12,6	27,3	27,9	23,3	32,9	34,3	27,0	42,5
60 à 69 ans	18,3 ^E	11,8	27,1	30,0	24,7	35,8	28,9	22,2	36,7
15 à 69 ans	19,3	15,8	23,4	30,4	26,8	34,2	33,0	28,2	38,3

	Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	11,3	8,0	15,7	1,7 ^E	1,0	2,9
20 à 39 ans	16,7	12,6	21,9	2,5 ^E	1,3	4,9
40 à 59 ans	19,4	15,5	23,9	5,3 ^E	3,7	7,6
60 à 69 ans	16,5	13,3	20,4	F	.	.
15 à 69 ans	17,3	14,6	20,4	3,6	2,5	5,1
Hommes						
15 à 19 ans	8,2 ^E	4,5	14,4	X	.	.
20 à 39 ans	22,3	15,5	31,0	2,7 ^E	1,5	4,9
40 à 59 ans	22,1	17,2	28,0	8,5 ^E	5,2	13,5
60 à 69 ans	11,3 ^E	7,7	16,2	F	.	.
15 à 69 ans	19,4	15,6	23,9	5,1^E	3,4	7,6
Femmes						
15 à 19 ans	14,5 ^E	8,9	22,8	X	.	.
20 à 39 ans	11,1 ^E	7,6	15,9	F	.	.
40 à 59 ans	16,7 ^E	11,5	23,6	F	.	.
60 à 69 ans	21,6	16,7	27,5	X	.	.
15 à 69 ans	15,2	12,5	18,3	F	.	.

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 14
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à l'aptitude aérobie, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives à l'aptitude aérobie								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	7,4 ^E	4,4	12,3	18,2	15,7	20,9	38,8	32,4	45,6
20 à 39 ans	14,7	10,4	20,3	24,6	20,6	29,1	40,7	31,8	50,2
40 à 59 ans	20,1 ^E	12,8	30,1	31,8	27,5	36,3	25,0	20,7	29,8
60 à 69 ans	45,1	39,0	51,3	33,0	27,0	39,6	16,6	12,1	22,3
15 à 69 ans	19,5	14,9	25,0	27,8	25,8	29,9	31,6	27,0	36,6
Hommes									
15 à 19 ans	F	.	.	24,5	18,3	31,8	30,0 ^E	19,2	43,6
20 à 39 ans	16,1 ^E	10,5	24,0	32,0	25,8	38,8	30,2	21,0	41,4
40 à 59 ans	18,6 ^E	10,8	30,1	22,3	16,1	30,2	30,1	24,0	36,9
60 à 69 ans	34,1	25,0	44,5	27,9 ^E	18,9	39,1	28,0	20,9	36,4
15 à 69 ans	18,1	12,6	25,3	27,1	24,2	30,1	29,9	24,5	36,0
Femmes									
15 à 19 ans	6,8 ^E	3,3	13,3	11,4 ^E	7,7	16,5	48,4	37,1	59,8
20 à 39 ans	13,1 ^E	8,0	20,7	16,3 ^E	11,0	23,5	52,5	40,2	64,5
40 à 59 ans	21,6 ^E	13,7	32,4	40,8	34,5	47,5	20,1	13,9	28,1
60 à 69 ans	54,4	45,3	63,1	37,3	29,5	45,8	6,9 ^E	3,5	13,2
15 à 69 ans	20,9	15,9	27,0	28,6	24,7	32,8	33,3	27,0	40,1

	Normes relatives à l'aptitude aérobie					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	25,2	19,6	31,7	10,4 ^E	6,8	15,7
20 à 39 ans	13,1	9,9	17,1	6,9 ^E	3,4	13,6
40 à 59 ans	18,9	14,1	24,8	4,3 ^E	2,7	6,8
60 à 69 ans	4,7 ^E	2,9	7,5	X	.	.
15 à 69 ans	15,6	13,3	18,3	5,5^E	3,8	7,9
Hommes						
15 à 19 ans	25,2 ^E	17,2	35,3	12,4 ^E	7,8	19,2
20 à 39 ans	15,0	10,5	20,8	F	.	.
40 à 59 ans	22,5	17,0	29,0	6,6 ^E	3,6	11,7
60 à 69 ans	8,7 ^E	5,2	14,3	X	.	.
15 à 69 ans	18,3	15,1	21,9	6,7^E	4,5	9,9
Femmes						
15 à 19 ans	25,2	17,4	35,1	8,3 ^E	4,8	13,8
20 à 39 ans	11,0 ^E	6,8	17,2	F	.	.
40 à 59 ans	15,4 ^E	10,3	22,4	F	.	.
60 à 69 ans	X	.	.	X	.	.
15 à 69 ans	13,0	10,4	16,1	4,3^E	2,2	8,2

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa. Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 15
Puissance aérobie maximale prévue moyenne de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Consommation maximale d'oxygène moyenne											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millilitres par kilogramme par minute												
Les deux sexes												
8 à 11 ans	50,4	50,1	50,7	45,2	44,8	45,5	45,7	45,4	46,0	47,0	46,0	48,0
12 à 19 ans	47,8	47,5	48,0	38,2	36,8	39,6	40,2	39,5	41,0	43,2	42,8	43,7
20 à 39 ans	41,4	40,5	42,4	32,4	31,4	33,4	33,6	32,9	34,4	36,8	36,0	37,7
40 à 59 ans	32,7	31,4	33,9	22,6	21,3	23,9	24,2	22,3	26,2	28,9	27,4	30,4
60 à 69 ans	25,1	24,6	25,6	18,6	17,6	19,7	19,4	18,9	19,8	21,1	20,6	21,6
8 à 69 ans	38,0	37,3	38,6	22,4	21,6	23,1	25,5	23,8	27,1	30,8	29,9	31,7
Hommes												
8 à 11 ans	50,8	50,2	51,3	45,0	44,3	45,7	45,6	45,1	46,1	46,9	45,2	48,6
12 à 19 ans	50,6	49,9	51,4	41,2	37,1	45,3	43,6	41,6	45,6	46,8	45,5	48,1
20 à 39 ans	43,7	42,1	45,3	32,9	31,6	34,1	34,0	32,2	35,7	39,5	36,2	42,8
40 à 59 ans	35,3	33,5	37,2	24,2	22,0	26,4	26,7	24,2	29,2	30,2	28,3	32,2
60 à 69 ans	26,5	25,4	27,5	X	.	.	19,4	18,6	20,1	21,5	19,5	23,5
8 à 69 ans	40,5	39,3	41,6	24,2	22,3	26,1	27,7	26,1	29,3	32,7	31,0	34,3
Femmes												
8 à 11 ans	50,1	49,6	50,5	45,2	44,8	45,5	45,8	45,6	46,1	47,0	45,8	48,3
12 à 19 ans	44,9	44,1	45,6	37,4	35,4	39,4	39,0	37,7	40,4	41,1	40,2	42,0
20 à 39 ans	38,8	38,0	39,7	31,5	30,2	32,9	33,1	32,0	34,3	36,1	35,2	36,9
40 à 59 ans	30,1	29,3	31,0	21,2	19,2	23,3	23,0	21,4	24,6	26,9	24,6	29,3
60 à 69 ans	24,0	23,2	24,8	18,5	17,5	19,5	19,4	18,6	20,2	21,0	20,2	21,8
8 à 69 ans	35,5	34,9	36,0	21,3	20,6	22,0	23,4	22,4	24,3	29,6	28,9	30,4

	Consommation maximale d'oxygène moyenne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millilitres par kilogramme par minute												
Les deux sexes												
8 à 11 ans	50,2	49,9	50,6	53,8	50,9	56,7	55,9	55,7	56,1	56,3	56,2	56,4
12 à 19 ans	47,6	47,2	48,0	52,5	51,9	53,2	54,9	54,3	55,5	56,2	54,5	57,8
20 à 39 ans	40,4	39,6	41,2	45,7	43,7	47,8	50,2	49,4	51,0	51,3	49,2	53,4
40 à 59 ans	31,9	30,8	33,0	36,8	35,0	38,7	41,2	38,7	43,8	44,6	42,8	46,4
60 à 69 ans	23,9	22,8	24,9	28,7	28,1	29,3	30,6	29,8	31,3	33,5	29,6	37,3
8 à 69 ans	37,8	36,9	38,7	45,0	44,1	45,8	50,4	49,8	51,0	53,6	52,6	54,6
Hommes												
8 à 11 ans	50,6	50,1	51,0	54,7	53,9	55,6	56,0	55,8	56,2	56,3	56,1	56,5
12 à 19 ans	51,8	51,0	52,6	54,1	53,2	55,1	55,9	54,2	57,7	59,5	57,6	61,5
20 à 39 ans	44,0	42,1	45,8	49,1	47,4	50,8	51,0	49,1	52,9	54,2	50,3	58,1
40 à 59 ans	34,4	30,4	38,4	39,8	38,3	41,3	44,6	42,6	46,6	46,1	43,9	48,4
60 à 69 ans	26,8	25,3	28,3	29,8	29,2	30,5	33,3	28,5	38,0	X	.	.
8 à 69 ans	40,9	39,3	42,5	47,8	46,2	49,5	52,3	51,2	53,5	55,0	54,2	55,8
Femmes												
8 à 11 ans	49,9	49,6	50,3	51,2	50,2	52,2	55,8	55,1	56,4	56,3	56,0	56,6
12 à 19 ans	43,9	43,3	44,5	48,0	47,3	48,7	52,7	50,9	54,5	54,2	53,4	55,0
20 à 39 ans	38,4	37,6	39,3	40,7	39,7	41,6	45,0	40,5	49,6	49,5	44,7	54,4
40 à 59 ans	30,1	29,4	30,9	33,5	32,4	34,5	36,0	35,3	36,6	36,8	36,2	37,5
60 à 69 ans	23,0	22,2	23,8	27,8	26,1	29,6	29,3	28,5	30,0	30,1	28,5	31,6
8 à 69 ans	35,4	34,7	36,2	40,7	40,1	41,3	47,8	46,4	49,3	50,4	49,8	51,0

Note(s) : Population à domicile âgée de 8 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). L'équation pour la puissance aérobie maximale prévue n'a pas été validée pour les enfants de 8 à 14 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 16
Circonférence du cou mesurée chez la population à domicile âgée de 3 à 19 ans, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Circonférence du cou mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	24,6	24,4	24,9	21,9	21,4	22,4	22,5	22,2	22,7	23,4	23,2	23,6
6 à 11 ans	27,5	27,3	27,8	24,2	24,0	24,5	24,8	24,5	25,1	25,8	25,5	26,1
12 à 19 ans	32,8	32,4	33,3	27,9	27,2	28,6	28,5	28,0	28,9	30,2	29,8	30,5
3 à 19 ans	29,8	29,6	30,0	23,5	23,4	23,6	24,3	24,2	24,5	26,3	26,0	26,5
6 à 19 ans	30,8	30,5	31,1	25,1	24,9	25,3	25,9	25,6	26,2	27,7	27,4	28,0
Hommes												
6 à 11 ans	28,1	27,7	28,5	24,8	24,1	25,5	25,3	24,8	25,7	26,1	25,4	26,8
12 à 19 ans	34,7	34,0	35,3	28,1	26,1	30,1	29,8	28,1	31,4	32,6	31,6	33,6
3 à 19 ans	31,0	30,6	31,3	24,2	23,9	24,5	25,0	24,6	25,4	26,6	26,1	27,1
6 à 19 ans	32,1	31,7	32,5	25,5	25,0	26,0	26,1	25,7	26,5	28,1	27,6	28,5
Femmes												
6 à 11 ans	27,0	26,8	27,1	23,9	23,6	24,3	24,4	24,1	24,7	25,4	25,2	25,6
12 à 19 ans	31,0	30,5	31,4	27,9	27,4	28,4	28,2	27,8	28,5	29,3	28,9	29,7
3 à 19 ans	28,5	28,3	28,8	23,1	22,9	23,4	23,9	23,6	24,2	25,8	25,5	26,0
6 à 19 ans	29,4	29,1	29,7	24,6	24,3	24,9	25,4	25,2	25,6	27,4	27,3	27,6

	Circonférence du cou mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	24,4	24,2	24,6	25,7	25,2	26,2	27,0	26,1	27,8	27,6	27,0	28,2
6 à 11 ans	27,3	26,9	27,6	28,8	28,5	29,1	30,6	29,7	31,4	31,8	31,4	32,1
12 à 19 ans	32,5	31,8	33,1	35,2	34,7	35,7	37,5	36,9	38,0	39,1	38,0	40,3
3 à 19 ans	29,1	28,8	29,5	32,6	32,1	33,0	35,7	35,2	36,2	37,5	37,0	38,1
6 à 19 ans	30,2	29,8	30,5	33,5	32,8	34,1	36,2	35,6	36,8	38,1	37,4	38,7
Hommes												
6 à 11 ans	27,8	27,5	28,1	29,4	28,8	30,1	31,6	30,6	32,5	32,2	30,7	33,7
12 à 19 ans	34,9	34,2	35,5	36,7	36,0	37,5	38,8	37,7	39,8	40,9	39,4	42,3
3 à 19 ans	30,2	29,5	30,8	35,0	34,4	35,5	37,4	36,8	38,0	38,8	37,7	39,9
6 à 19 ans	32,2	31,3	33,1	35,5	35,0	35,9	37,7	37,1	38,4	39,2	37,7	40,7
Femmes												
6 à 11 ans	26,8	26,6	27,1	28,2	28,0	28,4	29,3	28,8	29,9	30,6	29,3	31,8
12 à 19 ans	30,6	30,1	31,0	32,0	31,3	32,7	33,8	33,1	34,5	34,8	34,1	35,5
3 à 19 ans	28,5	28,1	28,9	30,9	30,4	31,4	32,6	31,8	33,3	33,9	33,1	34,6
6 à 19 ans	29,3	28,9	29,7	31,2	30,7	31,7	33,0	32,2	33,8	34,2	33,3	35,1

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 19 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 17
Circonférence de la taille mesurée de la population à domicile - protocole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Circonférence de la taille mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	51,3	50,6	52,0	45,2	44,6	45,7	46,2	45,4	46,9	48,4	47,6	49,2
6 à 11 ans	60,5	59,8	61,3	49,2	47,7	50,7	50,6	49,3	51,8	53,9	52,8	55,0
12 à 19 ans	74,7	73,1	76,2	58,8	56,2	61,4	61,2	59,5	62,9	66,5	65,0	68,0
20 à 39 ans	85,7	83,6	87,7	66,5	64,6	68,3	69,9	68,1	71,7	75,4	73,4	77,5
40 à 59 ans	93,8	92,1	95,6	71,5	69,2	73,9	75,9	74,0	77,7	83,2	81,1	85,4
60 à 79 ans	97,3	95,4	99,1	72,8	70,1	75,5	77,5	74,8	80,2	86,5	84,0	89,0
3 à 79 ans	86,3	84,9	87,6	54,7	53,9	55,6	63,0	61,7	64,2	73,5	71,9	75,1
6 à 79 ans	87,5	86,1	88,9	60,0	58,6	61,4	66,4	65,6	67,2	75,2	74,1	76,4
Hommes												
6 à 11 ans	61,8	60,8	62,9	50,3	48,6	51,9	51,8	49,9	53,8	55,1	53,6	56,6
12 à 19 ans	76,3	74,3	78,3	56,2	52,9	59,6	60,9	56,0	65,7	67,8	65,7	69,8
20 à 39 ans	88,9	86,2	91,6	71,3	70,4	72,1	72,7	70,7	74,8	79,0	76,2	81,8
40 à 59 ans	97,7	95,6	99,8	78,5	75,2	81,8	83,3	80,5	86,1	88,6	86,9	90,4
60 à 79 ans	103,2	100,5	106,0	82,4	79,3	85,5	86,2	82,9	89,5	93,8	90,5	97,2
3 à 79 ans	89,5	87,9	91,1	55,3	54,6	56,1	64,5	62,6	66,4	77,9	76,6	79,2
6 à 79 ans	90,9	89,3	92,5	59,5	57,4	61,6	68,9	67,8	70,1	79,4	77,8	81,0
Femmes												
6 à 11 ans	59,2	58,4	59,9	48,3	46,9	49,6	50,1	48,8	51,4	52,8	51,6	54,0
12 à 19 ans	72,9	71,0	74,9	60,2	58,6	61,7	61,3	60,2	62,4	65,3	63,7	66,8
20 à 39 ans	82,3	79,9	84,8	64,8	62,9	66,7	66,5	64,7	68,3	71,5	69,0	73,9
40 à 59 ans	90,0	87,5	92,4	68,6	65,4	71,9	71,7	68,6	74,7	78,5	76,6	80,5
60 à 79 ans	91,9	89,6	94,1	70,0	66,9	73,2	73,6	71,3	75,8	79,6	77,6	81,6
3 à 79 ans	83,0	81,6	84,4	54,2	53,3	55,1	62,0	60,3	63,6	71,1	69,8	72,4
6 à 79 ans	84,1	82,6	85,6	60,2	58,8	61,6	64,7	63,6	65,8	72,1	70,8	73,5

	Circonférence de la taille mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	50,5	49,9	51,1	53,1	51,9	54,4	57,2	55,7	58,8	58,8	55,8	61,7
6 à 11 ans	58,0	56,8	59,2	65,4	64,5	66,4	72,6	69,7	75,4	77,9	73,8	82,0
12 à 19 ans	72,4	71,0	73,8	80,5	77,5	83,5	90,3	84,6	95,9	101,1	95,8	106,4
20 à 39 ans	83,5	81,3	85,6	94,2	91,9	96,4	104,5	98,0	111,1	113,6	109,3	118,0
40 à 59 ans	92,4	90,4	94,4	101,9	99,1	104,7	113,7	110,3	117,0	119,9	116,4	123,5
60 à 79 ans	97,2	95,0	99,5	106,6	103,7	109,5	117,9	115,0	120,8	124,7	120,7	128,7
3 à 79 ans	86,1	84,3	87,9	98,0	96,4	99,7	110,2	107,4	113,0	117,4	115,6	119,3
6 à 79 ans	86,8	85,2	88,4	98,5	96,9	100,2	110,5	107,7	113,2	117,9	116,1	119,7
Hommes												
6 à 11 ans	58,9	57,2	60,5	66,7	64,9	68,4	75,6	71,4	79,8	81,4	70,2	92,6
12 à 19 ans	73,7	71,7	75,7	83,3	79,5	87,0	96,7	88,8	104,5	102,7	99,1	106,2
20 à 39 ans	87,2	83,8	90,5	95,9	92,9	99,0	107,3	100,3	114,4	113,6	108,3	118,8
40 à 59 ans	95,7	93,4	98,0	104,4	100,2	108,5	113,9	109,2	118,5	119,9	114,8	125,0
60 à 79 ans	101,3	98,1	104,6	111,3	108,0	114,5	121,8	117,6	125,9	126,6	122,0	131,2
3 à 79 ans	90,2	88,6	91,7	101,2	98,7	103,6	112,5	109,2	115,7	118,6	115,7	121,6
6 à 79 ans	90,9	89,2	92,6	101,6	99,0	104,2	112,7	109,6	115,8	118,7	115,5	121,8
Femmes												
6 à 11 ans	57,1	55,6	58,6	64,0	62,9	65,0	70,3	68,6	71,9	74,6	70,8	78,5
12 à 19 ans	70,7	68,3	73,2	77,9	74,0	81,9	87,2	82,8	91,5	94,3	88,1	100,4
20 à 39 ans	78,1	74,5	81,8	89,9	85,7	94,0	100,8	92,7	109,0	114,9	105,2	124,7
40 à 59 ans	86,9	83,7	90,1	98,0	94,4	101,6	111,6	107,3	115,8	120,0	114,6	125,3
60 à 79 ans	91,4	88,6	94,3	99,6	97,3	102,0	111,5	107,3	115,7	118,9	113,7	124,2
3 à 79 ans	80,7	78,7	82,8	94,0	92,0	95,9	106,1	100,8	111,5	115,4	111,4	119,5
6 à 79 ans	81,5	79,4	83,6	94,4	92,5	96,3	107,3	101,8	112,9	115,7	111,7	119,8

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 18
Circonférence de la taille mesurée de la population à domicile - protocole des National Institutes of Health (NIH), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Circonférence de la taille mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	51,7	51,0	52,4	45,4	44,8	46,1	46,4	45,6	47,1	48,4	47,3	49,5
6 à 11 ans	61,7	60,9	62,5	49,9	48,3	51,5	51,5	50,5	52,5	54,7	53,7	55,8
12 à 19 ans	76,8	75,1	78,4	59,8	57,2	62,5	63,1	61,1	65,1	68,4	67,0	69,9
20 à 39 ans	87,7	85,7	89,7	68,6	66,9	70,3	71,7	70,1	73,3	77,7	76,3	79,1
40 à 59 ans	95,2	93,4	97,0	73,4	70,3	76,5	78,8	76,5	81,1	85,5	83,5	87,4
60 à 79 ans	98,3	96,6	100,1	75,0	72,0	77,9	79,5	77,1	81,9	88,1	85,6	90,6
3 à 79 ans	87,8	86,5	89,1	55,3	54,4	56,2	64,6	63,4	65,8	75,9	74,6	77,2
6 à 79 ans	89,1	87,7	90,4	61,4	60,2	62,7	68,1	67,1	69,0	77,4	76,2	78,6
Hommes												
6 à 11 ans	62,8	61,8	63,8	50,8	49,2	52,4	51,8	50,1	53,5	55,3	54,0	56,6
12 à 19 ans	77,7	75,6	79,8	57,1	53,4	60,9	62,3	57,6	67,0	69,0	66,9	71,2
20 à 39 ans	90,3	87,5	93,1	72,0	70,7	73,3	74,2	71,4	77,0	80,7	77,8	83,5
40 à 59 ans	98,3	96,2	100,4	80,5	78,2	82,8	84,2	81,5	86,8	89,5	87,9	91,1
60 à 79 ans	103,3	100,6	106,0	82,6	80,3	85,0	86,8	83,8	89,8	94,0	90,7	97,3
3 à 79 ans	90,4	88,8	92,0	55,4	54,2	56,6	64,9	63,6	66,3	79,3	77,9	80,7
6 à 79 ans	91,8	90,2	93,4	60,9	59,0	62,9	69,9	68,6	71,2	80,8	79,4	82,2
Femmes												
6 à 11 ans	60,6	59,8	61,4	48,9	47,4	50,5	51,2	49,6	52,7	54,0	52,8	55,3
12 à 19 ans	75,8	73,7	77,9	61,6	59,9	63,4	63,2	61,3	65,1	67,8	66,4	69,2
20 à 39 ans	85,0	82,7	87,3	66,9	64,8	69,0	68,8	66,9	70,7	73,9	71,7	76,2
40 à 59 ans	92,1	89,6	94,6	71,4	69,1	73,8	74,3	71,1	77,6	80,6	78,5	82,6
60 à 79 ans	93,8	91,7	95,8	71,9	68,9	75,0	76,1	73,7	78,4	83,1	80,2	85,9
3 à 79 ans	85,2	83,8	86,6	55,1	54,2	55,9	64,1	62,5	65,8	73,3	71,9	74,7
6 à 79 ans	86,4	84,9	87,8	61,7	60,4	62,9	67,0	65,6	68,3	74,5	72,9	76,0

	Circonférence de la taille mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	50,8	50,1	51,4	53,9	52,9	55,0	57,6	55,9	59,3	60,1	56,1	64,1
6 à 11 ans	59,3	58,0	60,6	67,1	65,9	68,2	74,2	70,7	77,6	79,6	75,2	84,1
12 à 19 ans	74,5	72,8	76,1	82,9	79,8	86,0	92,5	86,6	98,5	103,9	99,1	108,8
20 à 39 ans	85,4	83,5	87,4	96,1	93,7	98,5	106,1	100,3	111,9	117,2	110,8	123,7
40 à 59 ans	93,7	92,1	95,2	103,0	100,6	105,4	113,3	109,4	117,2	120,9	116,1	125,7
60 à 79 ans	98,1	95,7	100,5	107,4	104,7	110,2	118,9	115,5	122,3	124,4	120,8	127,9
3 à 79 ans	87,8	86,2	89,4	99,4	97,7	101,1	111,0	108,4	113,5	119,3	117,2	121,5
6 à 79 ans	88,6	87,1	90,1	99,6	97,8	101,4	111,2	108,8	113,6	119,4	117,5	121,2
Hommes												
6 à 11 ans	59,7	57,8	61,5	68,4	66,9	70,0	77,9	73,1	82,8	82,1	69,7	94,5
12 à 19 ans	75,2	73,3	77,1	84,9	81,4	88,4	99,5	89,9	109,1	106,0	102,1	109,9
20 à 39 ans	88,4	85,3	91,4	96,9	93,7	100,2	108,1	101,0	115,2	117,2	108,7	125,7
40 à 59 ans	96,6	93,9	99,2	104,7	101,4	108,1	113,5	107,5	119,6	119,4	114,0	124,8
60 à 79 ans	101,8	99,4	104,1	112,3	108,6	116,1	120,4	117,4	123,5	125,0	118,9	131,2
3 à 79 ans	91,5	89,8	93,1	102,3	100,3	104,3	112,4	109,0	115,8	119,8	117,4	122,1
6 à 79 ans	92,1	90,5	93,7	102,4	100,4	104,5	112,8	109,4	116,2	119,8	117,5	122,1
Femmes												
6 à 11 ans	58,7	56,9	60,5	65,5	64,5	66,4	72,3	70,4	74,2	77,1	73,8	80,5
12 à 19 ans	73,5	71,0	76,0	81,3	77,7	85,0	89,6	85,5	93,6	97,5	90,2	104,8
20 à 39 ans	81,4	78,0	84,9	92,8	88,6	97,0	104,5	96,8	112,1	116,8	107,6	125,9
40 à 59 ans	89,2	86,0	92,4	99,4	96,2	102,6	112,3	107,8	116,7	123,3	115,6	131,0
60 à 79 ans	92,8	90,5	95,1	101,8	99,0	104,5	112,5	107,4	117,6	122,9	117,7	128,2
3 à 79 ans	83,9	81,9	85,9	95,5	92,9	98,1	108,4	104,6	112,2	117,6	113,0	122,2
6 à 79 ans	84,7	82,9	86,6	96,4	93,8	99,0	108,9	105,1	112,7	118,0	113,5	122,6

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 19
Circonférence des hanches mesurée, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011

	Circonférence des hanches mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	59,1	58,4	59,9	51,9	51,0	52,8	53,3	52,6	53,9	55,3	54,6	56,1
6 à 11 ans	73,2	72,4	73,9	59,7	58,3	61,1	61,6	60,1	63,1	66,2	65,0	67,3
12 à 19 ans	94,2	92,6	95,8	76,9	72,7	81,2	81,4	78,3	84,6	87,8	86,0	89,6
20 à 39 ans	102,1	100,5	103,7	87,9	85,3	90,5	90,4	88,8	92,0	94,9	93,5	96,3
40 à 59 ans	104,5	103,1	105,8	89,9	88,2	91,6	91,9	90,0	93,8	97,4	96,2	98,6
60 à 79 ans	105,1	103,8	106,4	90,2	88,4	91,9	92,9	91,1	94,8	98,1	97,1	99,1
3 à 79 ans	99,1	98,2	100,0	66,6	65,6	67,5	80,6	79,3	81,9	92,6	91,5	93,7
6 à 79 ans	100,5	99,5	101,5	75,4	73,9	77,0	84,9	83,5	86,4	93,5	92,5	94,5
Hommes												
6 à 11 ans	73,4	72,6	74,2	59,9	57,5	62,4	61,9	59,8	64,1	66,4	64,8	67,9
12 à 19 ans	93,5	91,4	95,6	73,5	66,3	80,6	78,7	73,2	84,3	87,5	85,0	90,0
20 à 39 ans	102,0	100,0	103,9	88,9	86,6	91,2	91,0	88,4	93,6	95,4	94,0	96,9
40 à 59 ans	102,6	101,2	104,0	89,8	87,5	92,1	91,4	88,6	94,1	96,9	95,3	98,6
60 à 79 ans	103,8	102,2	105,5	91,2	89,8	92,7	93,9	92,2	95,5	98,0	96,4	99,6
3 à 79 ans	98,1	97,1	99,0	66,6	65,5	67,7	79,4	77,2	81,6	92,9	91,7	94,1
6 à 79 ans	99,4	98,4	100,5	73,5	71,2	75,8	85,6	84,0	87,2	93,8	92,8	94,8
Femmes												
6 à 11 ans	72,9	71,8	74,0	59,5	57,8	61,2	61,2	59,7	62,8	66,0	64,0	68,0
12 à 19 ans	95,0	92,7	97,2	79,8	76,6	83,0	82,5	80,6	84,4	88,4	86,3	90,6
20 à 39 ans	102,3	100,3	104,3	85,8	81,4	90,2	89,9	88,5	91,2	93,9	91,8	96,0
40 à 59 ans	106,3	104,2	108,5	89,9	86,7	93,1	92,4	90,0	94,7	97,5	95,2	99,9
60 à 79 ans	106,2	104,4	108,1	88,2	85,0	91,5	91,9	89,4	94,3	98,6	97,1	100,0
3 à 79 ans	100,1	99,0	101,3	66,5	65,0	68,0	81,1	79,7	82,4	92,3	91,1	93,5
6 à 79 ans	101,6	100,4	102,8	77,0	75,7	78,3	84,8	82,7	86,8	93,2	92,0	94,4

	Circonférence des hanches mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	58,2	57,1	59,4	62,0	60,7	63,3	66,1	64,6	67,5	67,5	65,9	69,0
6 à 11 ans	71,7	70,8	72,7	79,1	78,1	80,0	85,2	83,6	86,7	90,8	88,3	93,3
12 à 19 ans	92,8	91,2	94,3	100,7	98,6	102,8	108,3	104,7	111,9	115,2	110,1	120,3
20 à 39 ans	100,4	98,3	102,4	107,9	106,6	109,2	115,4	110,8	120,1	122,9	119,3	126,4
40 à 59 ans	102,6	101,4	103,7	108,8	106,0	111,6	119,2	117,1	121,3	124,8	119,6	129,9
60 à 79 ans	103,8	102,6	105,0	110,4	108,9	111,9	118,4	115,9	120,9	125,0	119,6	130,4
3 à 79 ans	100,1	98,8	101,3	107,2	106,1	108,3	115,7	113,3	118,1	122,8	120,7	124,9
6 à 79 ans	100,6	99,5	101,8	107,4	106,4	108,5	116,5	114,2	118,9	123,0	121,0	124,9
Hommes												
6 à 11 ans	71,5	70,5	72,6	79,1	77,2	81,0	85,9	82,5	89,4	91,3	89,0	93,5
12 à 19 ans	91,8	90,0	93,6	100,5	98,0	102,9	108,3	103,2	113,5	115,3	109,2	121,3
20 à 39 ans	101,1	98,8	103,4	107,4	105,5	109,4	112,3	106,6	118,0	120,1	113,2	126,9
40 à 59 ans	102,0	100,5	103,5	106,7	104,4	108,9	113,5	109,3	117,7	117,6	114,0	121,1
60 à 79 ans	102,7	101,2	104,1	108,7	106,7	110,7	113,6	111,6	115,6	119,8	113,9	125,6
3 à 79 ans	99,7	98,2	101,2	106,1	104,8	107,4	112,1	109,3	114,9	117,4	114,4	120,4
6 à 79 ans	100,3	98,8	101,8	106,4	105,1	107,7	112,3	109,4	115,2	117,4	114,3	120,5
Femmes												
6 à 11 ans	72,0	70,2	73,8	79,0	78,0	80,1	85,1	84,0	86,2	88,2	84,1	92,3
12 à 19 ans	93,9	91,7	96,1	100,9	97,2	104,7	108,0	103,4	112,5	114,0	106,9	121,1
20 à 39 ans	99,7	96,6	102,7	108,0	105,6	110,3	118,9	112,4	125,5	126,0	119,4	132,7
40 à 59 ans	102,9	101,4	104,5	113,1	109,2	117,1	123,5	120,0	127,0	135,2	125,4	145,0
60 à 79 ans	105,0	103,2	106,9	112,3	109,9	114,7	120,3	116,7	123,8	127,5	119,6	135,3
3 à 79 ans	100,3	98,9	101,7	108,1	106,5	109,7	119,6	117,2	122,1	126,9	122,1	131,7
6 à 79 ans	100,9	99,7	102,2	108,5	106,6	110,4	119,8	117,2	122,4	127,0	122,1	131,9

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 20
Ratio taille/hanches mesuré, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011

	Ratio taille/hanches mesuré											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
ratio												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,88	0,87	0,88	0,78	0,76	0,80	0,81	0,79	0,83	0,84	0,82	0,85
6 à 11 ans	0,84	0,84	0,85	0,76	0,75	0,76	0,77	0,76	0,77	0,80	0,79	0,80
12 à 19 ans	0,81	0,81	0,82	0,72	0,71	0,73	0,74	0,73	0,75	0,77	0,76	0,78
20 à 39 ans	0,86	0,85	0,86	0,73	0,72	0,74	0,75	0,74	0,76	0,80	0,78	0,81
40 à 59 ans	0,91	0,90	0,92	0,77	0,75	0,79	0,80	0,79	0,81	0,85	0,84	0,86
60 à 79 ans	0,93	0,93	0,94	0,78	0,76	0,79	0,81	0,80	0,83	0,86	0,85	0,87
3 à 79 ans	0,88	0,88	0,89	0,74	0,74	0,75	0,77	0,76	0,77	0,82	0,81	0,82
6 à 79 ans	0,88	0,88	0,89	0,74	0,74	0,75	0,77	0,76	0,77	0,81	0,81	0,82
Hommes												
6 à 11 ans	0,85	0,84	0,86	0,77	0,76	0,78	0,78	0,77	0,80	0,81	0,80	0,83
12 à 19 ans	0,83	0,82	0,84	0,75	0,74	0,76	0,76	0,75	0,77	0,79	0,78	0,79
20 à 39 ans	0,88	0,87	0,89	0,76	0,74	0,79	0,79	0,76	0,82	0,83	0,82	0,85
40 à 59 ans	0,96	0,95	0,97	0,85	0,83	0,87	0,87	0,86	0,89	0,91	0,89	0,92
60 à 79 ans	0,99	0,98	1,01	0,87	0,86	0,89	0,90	0,88	0,91	0,94	0,92	0,95
3 à 79 ans	0,92	0,91	0,92	0,78	0,77	0,78	0,80	0,79	0,81	0,85	0,84	0,86
6 à 79 ans	0,92	0,91	0,93	0,78	0,77	0,78	0,80	0,79	0,81	0,85	0,84	0,86
Femmes												
6 à 11 ans	0,83	0,83	0,84	0,74	0,72	0,76	0,76	0,75	0,77	0,79	0,78	0,79
12 à 19 ans	0,80	0,79	0,81	0,70	0,69	0,72	0,72	0,71	0,73	0,75	0,74	0,76
20 à 39 ans	0,83	0,82	0,84	0,72	0,71	0,73	0,74	0,72	0,75	0,76	0,75	0,78
40 à 59 ans	0,86	0,86	0,87	0,73	0,71	0,76	0,77	0,75	0,79	0,81	0,80	0,82
60 à 79 ans	0,88	0,87	0,89	0,76	0,74	0,78	0,78	0,76	0,80	0,83	0,82	0,84
3 à 79 ans	0,85	0,84	0,85	0,73	0,72	0,74	0,75	0,74	0,76	0,79	0,78	0,80
6 à 79 ans	0,85	0,84	0,85	0,73	0,72	0,74	0,75	0,74	0,76	0,79	0,78	0,80

	Ratio taille/hanches mesuré											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
ratio												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,87	0,86	0,88	0,90	0,90	0,91	0,93	0,92	0,94	0,96	0,93	0,99
6 à 11 ans	0,83	0,83	0,84	0,87	0,86	0,87	0,91	0,90	0,92	0,93	0,91	0,96
12 à 19 ans	0,80	0,80	0,81	0,84	0,83	0,85	0,89	0,87	0,91	0,93	0,91	0,94
20 à 39 ans	0,85	0,84	0,86	0,90	0,89	0,92	0,95	0,94	0,97	0,98	0,95	1,00
40 à 59 ans	0,91	0,89	0,92	0,96	0,95	0,97	1,00	0,99	1,01	1,03	1,01	1,05
60 à 79 ans	0,93	0,92	0,94	0,99	0,98	1,01	1,05	1,04	1,06	1,08	1,06	1,10
3 à 79 ans	0,87	0,87	0,88	0,94	0,93	0,94	0,99	0,98	1,00	1,03	1,01	1,04
6 à 79 ans	0,87	0,87	0,88	0,94	0,93	0,95	0,99	0,99	1,00	1,03	1,02	1,04
Hommes												
6 à 11 ans	0,84	0,83	0,86	0,87	0,85	0,89	0,92	0,90	0,94	0,94	0,88	1,00
12 à 19 ans	0,82	0,81	0,83	0,85	0,84	0,86	0,91	0,89	0,93	0,94	0,91	0,96
20 à 39 ans	0,87	0,86	0,89	0,92	0,91	0,94	0,97	0,94	1,00	1,00	0,97	1,02
40 à 59 ans	0,95	0,94	0,96	0,99	0,98	1,00	1,03	1,01	1,05	1,06	1,02	1,10
60 à 79 ans	0,99	0,97	1,00	1,04	1,03	1,05	1,08	1,06	1,09	1,10	1,08	1,11
3 à 79 ans	0,91	0,90	0,92	0,97	0,96	0,99	1,02	1,01	1,04	1,05	1,04	1,07
6 à 79 ans	0,91	0,90	0,92	0,97	0,96	0,99	1,02	1,01	1,04	1,06	1,04	1,07
Femmes												
6 à 11 ans	0,82	0,81	0,83	0,86	0,85	0,87	0,90	0,89	0,91	0,92	0,90	0,94
12 à 19 ans	0,78	0,77	0,79	0,83	0,81	0,84	0,88	0,86	0,90	0,91	0,88	0,93
20 à 39 ans	0,81	0,80	0,82	0,88	0,86	0,89	0,92	0,90	0,94	0,95	0,93	0,97
40 à 59 ans	0,86	0,85	0,87	0,90	0,89	0,91	0,95	0,93	0,96	0,97	0,95	1,00
60 à 79 ans	0,87	0,86	0,88	0,93	0,91	0,94	0,97	0,96	0,98	1,00	0,98	1,01
3 à 79 ans	0,84	0,83	0,85	0,89	0,89	0,90	0,94	0,93	0,95	0,97	0,96	0,98
6 à 79 ans	0,84	0,83	0,85	0,89	0,89	0,90	0,94	0,93	0,95	0,97	0,96	0,98

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 21

Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la somme des mesures des cinq plis cutanés, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	La somme des mesures des cinq plis cutanés											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	37,5	35,9	39,0	25,6	24,3	26,9	27,2	26,2	28,2	30,2	29,5	30,9
6 à 11 ans	51,5	49,6	53,5	24,8	23,8	25,8	27,1	25,9	28,4	32,1	31,1	33,2
12 à 19 ans	59,5	57,4	61,7	26,3	24,4	28,3	29,5	28,1	31,0	37,5	34,7	40,3
20 à 39 ans	68,8	64,4	73,1	28,9	26,7	31,1	32,9	29,5	36,2	46,9	40,3	53,5
40 à 59 ans	77,4	73,8	81,0	36,4	31,7	41,0	41,9	38,9	44,8	57,5	53,7	61,3
60 à 79 ans	74,9	71,7	78,0	36,5	33,2	39,8	43,9	39,9	47,9	55,6	52,0	59,1
3 à 79 ans	68,1	66,2	70,1	28,7	28,1	29,2	32,5	31,5	33,5	44,6	42,9	46,4
6 à 79 ans	69,6	67,6	71,5	29,0	28,4	29,5	33,5	32,3	34,6	47,1	44,8	49,3
Hommes												
6 à 11 ans	50,9	47,8	54,0	23,7	22,4	25,0	25,7	24,6	26,9	29,8	27,9	31,7
12 à 19 ans	48,4	45,7	51,1	24,8	22,6	27,0	26,4	24,5	28,2	31,5	29,8	33,2
20 à 39 ans	56,3	51,1	61,5	28,7	24,0	33,4	29,6	27,3	31,8	36,2	30,7	41,8
40 à 59 ans	62,3	58,0	66,6	31,9	25,7	38,1	37,5	32,7	42,4	46,5	39,6	53,3
60 à 79 ans	60,2	57,8	62,7	33,4	27,7	39,2	38,5	35,1	42,0	48,2	44,9	51,4
3 à 79 ans	56,1	54,2	58,1	27,0	25,7	28,2	29,4	28,7	30,1	37,3	35,6	38,9
6 à 79 ans	57,1	55,1	59,1	27,2	25,9	28,5	29,6	28,3	30,9	38,4	36,3	40,4
Femmes												
6 à 11 ans	52,2	50,0	54,3	26,7	24,4	29,0	29,4	27,7	31,1	34,5	32,3	36,7
12 à 19 ans	71,5	68,5	74,4	36,0	31,8	40,2	41,4	36,6	46,1	52,1	48,8	55,5
20 à 39 ans	81,5	76,4	86,5	40,1	30,6	49,6	51,0	43,9	58,1	62,9	57,3	68,5
40 à 59 ans	91,9	86,9	96,8	51,8	46,1	57,5	56,3	46,4	66,2	75,9	71,6	80,1
60 à 79 ans	87,9	82,8	93,1	49,4	39,2	59,5	57,0	51,4	62,7	71,0	62,9	79,0
3 à 79 ans	80,1	77,6	82,5	33,9	32,2	35,7	40,4	37,8	43,1	59,1	57,2	61,1
6 à 79 ans	81,9	79,4	84,4	36,4	33,0	39,8	45,1	42,3	48,0	61,9	60,2	63,7

	La somme des mesures des cinq plis cutanés											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	35,1	33,6	36,6	41,1	39,2	42,9	48,0	44,1	51,8	59,0	46,4	71,5
6 à 11 ans	42,5	39,2	45,8	65,0	58,5	71,5	89,8	81,2	98,4	107,5	97,0	118,0
12 à 19 ans	54,0	51,5	56,5	76,5	71,9	81,1	98,8	91,5	106,1	113,4	105,4	121,4
20 à 39 ans	67,3	63,1	71,6	87,4	81,2	93,6	108,1	100,3	115,8	123,5	113,5	133,5
40 à 59 ans	75,3	71,6	78,9	97,9	90,8	105,0	111,1	102,0	120,2	125,5	116,3	134,8
60 à 79 ans	71,8	67,9	75,8	90,8	84,2	97,4	113,2	106,5	119,8	120,9	117,0	124,8
3 à 79 ans	65,2	62,6	67,7	87,3	83,8	90,9	107,9	103,8	112,0	119,9	114,4	125,4
6 à 79 ans	67,0	64,6	69,3	88,9	85,2	92,5	108,6	104,2	113,0	120,9	115,6	126,2
Hommes												
6 à 11 ans	38,9	35,2	42,5	65,3	55,0	75,6	95,4	80,7	110,0	109,1	91,5	126,6
12 à 19 ans	39,9	37,4	42,3	60,4	55,1	65,7	77,8	70,4	85,3	98,5	87,9	109,0
20 à 39 ans	53,9	45,6	62,3	70,2	64,9	75,6	87,3	74,9	99,7	99,2	86,9	111,5
40 à 59 ans	62,4	58,3	66,6	73,1	67,6	78,6	89,3	79,9	98,6	99,0	89,7	108,2
60 à 79 ans	58,8	54,2	63,4	72,1	67,4	76,8	84,8	81,2	88,3	88,5	82,6	94,3
3 à 79 ans	53,9	51,0	56,8	70,1	67,6	72,6	86,1	81,7	90,5	99,3	93,4	105,1
6 à 79 ans	55,3	52,2	58,4	70,8	68,4	73,2	86,7	82,1	91,3	99,4	94,0	104,9
Femmes												
6 à 11 ans	45,3	42,2	48,5	63,7	57,5	69,9	84,6	77,1	92,0	97,1	90,4	103,8
12 à 19 ans	67,1	62,6	71,6	87,4	81,6	93,1	109,7	98,6	120,9	118,8	108,6	129,0
20 à 39 ans	76,1	70,5	81,6	99,2	89,8	108,5	120,8	108,9	132,7	126,2	122,1	130,3
40 à 59 ans	91,8	85,6	98,1	107,5	100,8	114,2	123,7	113,6	133,7	130,8	124,0	137,5
60 à 79 ans	85,9	79,1	92,7	106,4	101,2	111,5	120,1	115,3	124,9	126,7	118,4	135,0
3 à 79 ans	78,4	75,1	81,8	100,7	96,2	105,2	118,5	113,0	124,0	127,7	124,6	130,9
6 à 79 ans	80,5	77,2	83,8	102,1	97,7	106,4	119,2	113,6	124,8	128,1	125,1	131,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 22
Taille en position debout mesurée, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011

	Taille en position debout mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	106,46	105,49	107,43	93,73	91,37	96,10	96,08	94,87	97,29	100,98	99,64	102,33
6 à 11 ans	134,84	133,63	136,04	117,16	115,05	119,27	119,78	118,40	121,16	125,75	123,54	127,97
12 à 19 ans	166,26	164,72	167,79	147,82	142,29	153,35	152,46	150,04	154,87	159,15	157,27	161,03
20 à 39 ans	170,35	169,18	171,53	155,09	152,78	157,39	157,91	156,02	159,80	162,43	160,76	164,10
40 à 59 ans	168,27	167,36	169,18	154,10	152,31	155,88	156,44	155,13	157,75	161,55	160,33	162,78
60 à 79 ans	165,33	164,80	165,86	150,57	149,00	152,14	152,90	151,93	153,88	158,87	158,13	159,62
3 à 79 ans	163,74	163,10	164,39	124,82	122,66	126,98	146,02	144,32	147,71	158,44	157,60	159,27
6 à 79 ans	165,77	165,10	166,45	140,08	138,00	142,16	151,58	150,40	152,76	159,27	158,43	160,11
Hommes												
6 à 11 ans	134,59	133,25	135,92	118,47	116,13	120,81	120,15	118,65	121,65	125,80	122,60	129,00
12 à 19 ans	170,64	168,36	172,92	145,81	134,82	156,81	152,91	144,69	161,13	164,79	160,99	168,58
20 à 39 ans	177,70	176,52	178,87	165,76	163,55	167,97	168,00	165,69	170,30	173,67	171,67	175,67
40 à 59 ans	174,66	173,61	175,72	163,83	162,49	165,16	166,15	164,09	168,22	169,59	168,43	170,75
60 à 79 ans	172,62	171,63	173,61	162,02	161,00	163,04	163,38	161,72	165,04	167,72	165,90	169,54
3 à 79 ans	169,55	168,99	170,11	124,48	121,12	127,83	145,98	143,06	148,91	167,51	166,55	168,48
6 à 79 ans	171,85	171,24	172,45	138,82	136,43	141,21	160,20	158,52	161,89	168,39	167,42	169,37
Femmes												
6 à 11 ans	135,10	133,17	137,04	115,96	112,03	119,88	119,42	117,12	121,72	125,41	122,37	128,45
12 à 19 ans	161,67	159,99	163,36	150,12	146,55	153,70	152,38	149,85	154,91	157,06	154,67	159,45
20 à 39 ans	162,98	161,42	164,54	153,26	150,77	155,75	155,13	152,81	157,46	158,70	157,04	160,36
40 à 59 ans	161,85	160,79	162,92	150,95	147,78	154,12	154,04	152,19	155,88	157,37	156,22	158,53
60 à 79 ans	158,67	158,19	159,16	147,82	146,19	149,44	150,59	149,02	152,15	154,02	152,83	155,21
3 à 79 ans	157,95	157,10	158,80	126,12	123,38	128,86	146,04	143,98	148,10	155,44	154,39	156,49
6 à 79 ans	159,73	158,87	160,60	142,36	139,36	145,35	150,09	148,52	151,66	155,81	154,86	156,76

	Taille en position debout mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	107,00	105,50	108,50	111,55	109,70	113,39	116,22	114,35	118,09	120,17	117,16	123,18
6 à 11 ans	135,08	133,59	136,57	143,64	142,00	145,28	150,60	148,77	152,43	154,33	152,72	155,94
12 à 19 ans	165,68	164,44	166,91	174,52	173,00	176,05	180,19	178,66	181,72	183,09	180,38	185,81
20 à 39 ans	170,33	169,00	171,66	178,79	177,65	179,94	182,82	181,81	183,82	185,50	184,52	186,48
40 à 59 ans	168,24	167,31	169,16	174,87	173,39	176,36	180,71	179,43	181,98	183,51	182,21	184,80
60 à 79 ans	164,79	163,60	165,97	172,84	171,56	174,12	178,18	177,06	179,30	180,87	180,04	181,69
3 à 79 ans	166,05	165,09	167,01	174,70	173,76	175,63	180,57	179,86	181,27	183,53	182,96	184,10
6 à 79 ans	166,66	165,66	167,66	175,02	174,12	175,92	180,74	179,98	181,50	183,58	183,01	184,15
Hommes												
6 à 11 ans	134,79	132,50	137,07	142,58	140,96	144,19	150,08	147,01	153,14	152,81	150,45	155,17
12 à 19 ans	173,46	171,72	175,20	178,14	176,10	180,18	182,96	180,32	185,59	186,03	184,10	187,96
20 à 39 ans	178,74	177,41	180,07	181,89	181,03	182,74	185,49	184,50	186,48	187,69	184,61	190,78
40 à 59 ans	174,29	172,65	175,93	179,53	178,38	180,69	183,50	182,20	184,81	185,11	183,38	186,84
60 à 79 ans	172,88	171,58	174,18	177,12	176,03	178,21	180,96	180,11	181,82	183,11	181,70	184,52
3 à 79 ans	174,14	173,13	175,15	179,58	179,19	179,97	183,52	182,95	184,09	185,58	184,98	186,18
6 à 79 ans	174,51	173,54	175,48	179,74	179,32	180,15	183,58	183,01	184,16	185,68	185,01	186,36
Femmes												
6 à 11 ans	135,17	133,19	137,16	144,54	142,32	146,75	152,14	148,91	155,37	155,35	153,19	157,51
12 à 19 ans	162,09	160,67	163,50	165,79	164,17	167,40	171,03	168,36	173,71	173,60	169,94	174,26
20 à 39 ans	162,86	161,18	164,54	167,94	165,22	170,67	171,20	169,17	173,22	173,23	171,66	174,79
40 à 59 ans	161,79	160,51	163,07	166,36	164,86	167,86	170,25	168,41	172,09	173,53	171,50	175,56
60 à 79 ans	159,06	158,72	159,40	162,57	161,58	163,57	166,91	165,45	168,37	168,98	167,39	170,56
3 à 79 ans	160,66	159,87	161,45	165,22	164,13	166,31	170,02	168,95	171,10	172,80	171,50	174,11
6 à 79 ans	160,87	160,09	161,64	165,39	164,20	166,58	170,26	169,20	171,31	172,81	171,56	174,06

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 23
Poids mesuré, selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011

	Poids mesuré											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
kilogrammes												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	18,7	18,2	19,2	13,9	13,1	14,7	14,4	14,0	14,8	16,1	15,5	16,7
6 à 11 ans	33,4	32,5	34,3	20,7	19,6	21,8	21,9	20,9	22,8	25,5	24,7	26,4
12 à 19 ans	62,8	60,3	65,2	38,4	32,4	44,4	43,0	39,7	46,3	51,2	49,0	53,4
20 à 39 ans	75,6	72,5	78,7	51,1	49,5	52,6	54,9	53,5	56,4	61,7	59,0	64,3
40 à 59 ans	79,8	77,7	81,8	54,2	51,4	56,9	58,5	56,3	60,7	64,8	61,9	67,8
60 à 79 ans	78,0	76,0	80,1	51,6	48,7	54,4	57,2	54,7	59,6	66,5	63,9	69,1
3 à 79 ans	71,1	69,4	72,9	25,5	24,7	26,4	41,1	39,5	42,7	58,2	56,7	59,6
6 à 79 ans	73,0	71,2	74,8	35,3	33,6	36,9	47,7	45,6	49,8	59,8	58,4	61,2
Hommes												
6 à 11 ans	33,9	32,9	34,9	21,1	19,8	22,3	22,9	20,9	24,8	25,8	24,6	27,0
12 à 19 ans	66,2	63,0	69,4	32,6	26,1	39,1	41,0	32,6	49,5	55,4	50,4	60,3
20 à 39 ans	82,5	79,1	85,9	60,0	57,7	62,4	63,0	59,4	66,7	70,4	68,6	72,2
40 à 59 ans	86,0	83,3	88,6	61,2	57,8	64,5	64,9	60,3	69,6	75,0	72,5	77,5
60 à 79 ans	85,7	82,4	89,0	61,7	56,8	66,7	67,5	63,2	71,8	74,6	71,7	77,5
3 à 79 ans	76,7	74,7	78,6	25,5	24,4	26,6	40,8	37,2	44,4	65,3	62,7	68,0
6 à 79 ans	78,8	76,8	80,8	33,7	31,6	35,7	53,2	49,7	56,7	67,9	65,6	70,2
Femmes												
6 à 11 ans	32,8	31,7	34,0	19,9	18,6	21,3	21,4	20,6	22,2	24,9	23,1	26,7
12 à 19 ans	59,1	56,0	62,2	41,2	38,0	44,3	43,3	41,9	44,7	49,3	46,8	51,8
20 à 39 ans	68,7	65,0	72,4	48,8	44,9	52,7	51,2	49,6	52,8	56,5	54,5	58,6
40 à 59 ans	73,5	70,7	76,4	50,7	46,9	54,6	54,3	51,4	57,3	60,1	58,2	62,1
60 à 79 ans	71,0	68,7	73,4	48,4	45,1	51,6	52,1	49,0	55,1	60,2	57,7	62,7
3 à 79 ans	65,6	63,8	67,4	25,4	23,9	26,9	41,3	39,5	43,1	54,8	53,3	56,3
6 à 79 ans	67,2	65,4	69,1	36,9	35,4	38,5	44,9	41,8	48,0	55,8	54,4	57,3

	Poids mesuré											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
kilogrammes												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	18,1	17,5	18,7	20,4	19,4	21,4	23,4	22,8	24,1	24,5	23,0	26,0
6 à 11 ans	31,2	29,8	32,6	39,3	37,8	40,8	46,2	44,0	48,5	53,7	49,2	58,1
12 à 19 ans	60,2	58,3	62,0	71,6	67,8	75,5	85,1	79,1	91,0	95,8	88,6	103,0
20 à 39 ans	72,9	70,3	75,5	86,9	83,0	90,7	101,6	93,3	110,0	110,7	102,9	118,4
40 à 59 ans	77,8	75,3	80,2	91,9	90,0	93,8	104,2	100,7	107,6	111,1	104,7	117,4
60 à 79 ans	76,2	74,2	78,1	87,6	84,1	91,0	102,0	98,1	105,9	108,8	103,1	114,4
3 à 79 ans	71,2	69,3	73,1	85,7	82,9	88,4	99,4	95,0	103,7	108,5	103,9	113,0
6 à 79 ans	72,2	70,2	74,1	86,5	83,8	89,2	100,1	95,8	104,5	108,8	104,1	113,5
Hommes												
6 à 11 ans	31,3	29,8	32,9	40,2	37,7	42,6	46,3	41,8	50,8	55,8	51,2	60,5
12 à 19 ans	63,6	61,1	66,1	76,9	71,6	82,2	93,0	83,9	102,2	104,5	94,6	114,5
20 à 39 ans	80,9	76,4	85,4	91,4	87,4	95,4	103,1	93,3	112,9	115,1	105,7	124,5
40 à 59 ans	84,0	80,3	87,6	95,0	91,7	98,4	105,5	100,1	111,0	111,0	102,5	119,5
60 à 79 ans	83,0	79,5	86,5	95,0	91,1	98,8	107,1	102,4	111,7	115,2	108,4	121,9
3 à 79 ans	78,8	76,4	81,2	91,6	89,0	94,1	103,4	99,3	107,5	111,0	105,3	116,7
6 à 79 ans	79,5	77,1	82,0	92,0	89,5	94,6	104,0	100,0	108,0	111,3	105,6	117,1
Femmes												
6 à 11 ans	30,8	28,9	32,8	38,6	37,1	40,1	45,9	43,7	48,2	50,8	45,7	55,9
12 à 19 ans	56,9	54,3	59,5	65,1	60,0	70,1	77,3	71,3	83,2	86,7	77,7	95,7
20 à 39 ans	64,1	59,8	68,5	76,1	72,5	79,8	94,4	82,4	106,5	107,1	97,0	117,2
40 à 59 ans	68,4	64,1	72,7	82,9	77,5	88,3	98,1	91,7	104,6	111,8	100,5	123,1
60 à 79 ans	69,7	67,6	71,8	78,9	75,6	82,2	89,4	82,5	96,3	101,0	93,8	108,2
3 à 79 ans	63,6	61,1	66,1	76,4	74,3	78,5	92,5	88,2	96,9	104,9	98,2	111,5
6 à 79 ans	64,4	61,8	67,0	76,6	74,3	78,9	93,0	88,7	97,3	105,0	98,6	111,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 24
Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Indice de masse corporelle mesuré											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	kilogrammes par mètre carré											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	16,37	16,11	16,62	14,07	13,76	14,39	14,41	14,11	14,70	15,21	15,02	15,41
6 à 11 ans	17,98	17,70	18,25	13,99	13,66	14,32	14,56	14,05	15,08	15,59	15,20	15,97
12 à 19 ans	22,43	21,78	23,09	16,21	15,32	17,11	17,19	16,48	17,91	19,11	18,73	19,50
20 à 39 ans	25,87	25,09	26,65	19,04	18,63	19,45	20,00	19,00	21,01	22,08	21,39	22,77
40 à 59 ans	28,02	27,38	28,66	20,78	20,22	21,34	21,88	21,10	22,67	23,94	23,42	24,46
60 à 79 ans	28,43	27,75	29,12	20,56	19,76	21,36	22,34	21,57	23,11	24,65	23,91	25,39
3 à 79 ans	25,77	25,29	26,25	16,19	15,96	16,42	18,10	17,86	18,35	21,59	21,18	21,99
6 à 79 ans	26,11	25,61	26,60	17,22	16,94	17,49	19,06	18,84	19,27	22,07	21,59	22,56
Hommes												
6 à 11 ans	18,35	17,94	18,76	14,11	13,44	14,78	14,83	14,12	15,54	15,78	15,41	16,16
12 à 19 ans	22,38	21,55	23,21	15,35	14,06	16,64	16,79	15,55	18,04	19,10	18,58	19,61
20 à 39 ans	26,11	25,08	27,13	19,41	18,46	20,36	20,89	19,41	22,37	22,68	21,83	23,52
40 à 59 ans	28,08	27,33	28,83	21,82	20,62	23,03	22,83	21,83	23,82	25,00	24,26	25,74
60 à 79 ans	28,70	27,78	29,62	21,72	20,41	23,03	23,23	22,27	24,19	25,39	24,19	26,58
3 à 79 ans	25,88	25,31	26,45	16,17	15,82	16,51	18,18	17,71	18,65	22,24	21,65	22,84
6 à 79 ans	26,22	25,63	26,81	17,16	16,70	17,62	19,34	18,94	19,73	22,67	22,10	23,25
Femmes												
6 à 11 ans	17,59	17,33	17,85	13,87	13,37	14,38	14,42	14,07	14,76	15,36	14,97	15,76
12 à 19 ans	22,49	21,58	23,40	16,59	16,06	17,11	17,55	16,76	18,35	19,15	18,53	19,78
20 à 39 ans	25,62	24,68	26,56	18,83	18,44	19,22	19,27	18,27	20,28	21,52	20,96	22,08
40 à 59 ans	27,96	26,98	28,94	19,87	18,44	21,30	21,41	20,58	22,24	23,44	22,88	24,00
60 à 79 ans	28,19	27,32	29,07	19,74	18,54	20,94	21,63	20,77	22,49	24,30	23,77	24,83
3 à 79 ans	25,66	25,12	26,20	16,21	16,01	16,41	18,07	17,77	18,37	21,27	20,83	21,70
6 à 79 ans	25,99	25,43	26,55	17,23	16,98	17,48	18,86	18,66	19,05	21,55	21,13	21,96

	Indice de masse corporelle mesuré											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	kilogrammes par mètre carré											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	15,98	15,74	16,22	17,25	16,98	17,52	18,52	17,95	19,10	19,56	18,31	20,80
6 à 11 ans	17,20	16,81	17,59	19,59	19,06	20,12	22,84	21,96	23,72	24,46	22,82	26,10
12 à 19 ans	21,43	20,93	21,93	24,39	23,30	25,49	29,04	27,08	31,00	32,53	30,81	34,25
20 à 39 ans	24,85	23,94	25,77	28,61	27,50	29,71	33,29	30,85	35,74	36,50	33,77	39,22
40 à 59 ans	27,25	26,48	28,01	30,64	29,72	31,57	35,57	34,23	36,90	38,89	37,10	40,68
60 à 79 ans	27,70	27,04	28,36	31,46	30,88	32,04	35,14	33,61	36,67	38,65	35,51	41,78
3 à 79 ans	25,16	24,53	25,79	29,07	28,15	29,98	33,60	32,30	34,89	36,97	35,74	38,20
6 à 79 ans	25,41	24,79	26,03	29,39	28,51	30,27	33,78	32,40	35,17	37,13	35,85	38,40
Hommes												
6 à 11 ans	17,28	16,84	17,72	19,89	18,81	20,97	23,52	22,04	25,00	25,45	22,20	28,71
12 à 19 ans	21,23	20,71	21,75	24,56	23,11	26,01	28,76	25,78	31,74	33,16	31,10	35,22
20 à 39 ans	25,48	24,42	26,54	28,80	27,52	30,09	31,87	28,92	34,83	35,78	32,69	38,87
40 à 59 ans	27,71	27,05	28,37	30,64	29,62	31,67	33,75	31,28	36,21	36,37	34,32	38,42
60 à 79 ans	28,08	27,14	29,02	31,57	30,58	32,57	34,86	33,17	36,54	37,39	34,80	39,98
3 à 79 ans	25,77	25,26	26,28	29,43	28,46	30,41	33,06	31,59	34,52	35,79	34,19	37,40
6 à 79 ans	25,99	25,48	26,50	29,68	28,74	30,63	33,11	31,60	34,62	35,82	34,32	37,33
Femmes												
6 à 11 ans	17,07	16,50	17,64	19,10	18,65	19,54	21,45	20,49	22,40	23,17	22,01	24,32
12 à 19 ans	21,78	20,91	22,65	24,28	23,04	25,53	29,31	26,43	32,18	31,42	29,22	33,61
20 à 39 ans	23,96	22,68	25,24	28,00	26,46	29,53	34,32	30,88	37,76	39,13	35,64	42,62
40 à 59 ans	26,48	25,23	27,72	30,88	29,06	32,71	37,10	35,31	38,90	40,38	36,80	43,95
60 à 79 ans	27,20	26,31	28,08	31,13	30,12	32,15	35,43	32,92	37,94	40,64	36,64	44,64
3 à 79 ans	24,43	23,74	25,11	28,86	27,91	29,80	35,20	33,43	36,97	39,18	37,17	41,19
6 à 79 ans	24,63	23,83	25,44	29,05	28,07	30,03	35,24	33,71	36,77	39,19	37,33	41,04

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 25
Distribution de la population à domicile âgée de 5 à 18 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

Normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode Organisation mondiale de la santé (OMS)												
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint			Obèse		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
pourcentage												
Les deux sexes												
5 à 11 ans	F	.	.	65,5	61,7	69,1	19,7	16,5	23,4	13,2	10,5	16,4
12 à 18 ans	F	.	.	67,2	61,0	72,9	19,5	14,9	25,1	11,0	7,9	15,2
5 à 15 ans	2,0^E	1,0	3,8	66,5	62,8	69,9	19,6	16,3	23,3	12,0	10,1	14,3
Hommes												
5 à 11 ans	X	.	.	58,8	51,9	65,5	19,8	14,9	25,9	19,6	15,6	24,3
12 à 18 ans	F	.	.	64,7	55,2	73,1	19,7 ^E	13,1	28,5	11,5 ^E	7,7	16,8
5 à 15 ans	F	.	.	62,0	55,9	67,8	19,8	15,1	25,4	15,2	12,7	18,1
Femmes												
5 à 11 ans	X	.	.	72,6	69,9	75,2	19,5	16,1	23,5	6,3 ^E	4,1	9,7
12 à 18 ans	X	.	.	69,9	60,7	77,8	19,3	13,9	26,0	10,5 ^E	6,9	15,6
5 à 15 ans	0,9^E	0,5	1,4	71,2	65,4	76,3	19,4	15,2	24,4	8,6	6,4	11,5

Note(s) : De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for schoolaged children and adolescents. Bulletin of the World Health Organization 2007;85:660-7. www.who.int/childgrowth/fr. Population à domicile âgée de 5 à 18 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 26
Distribution de la population à domicile âgée de 3 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode Center for Disease Control (CDC), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode Center for Disease Control (CDC)											
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint			Obèse		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	pourcentage											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	2,5 ^E	1,4	4,5	65,5	60,3	70,4	17,5 ^E	11,9	24,9	14,5 ^E	9,7	21,0
6 à 11 ans	4,3 ^E	2,1	8,6	70,5	64,6	75,7	12,4	10,0	15,4	12,7	9,8	16,4
12 à 17 ans	5,6 ^E	3,1	9,7	68,7	60,7	75,6	15,5	11,2	21,1	10,3	7,4	14,0
3 à 17 ans	4,5^E	2,9	7,0	68,8	64,9	72,3	14,7	12,2	17,6	12,0	10,1	14,2
6 à 17 ans	5,0^E	3,1	7,9	69,5	64,9	73,8	14,1	11,3	17,5	11,4	9,7	13,4
Hommes												
6 à 11 ans	F	.	.	66,2	57,3	74,2	11,3	8,2	15,4	18,5	14,0	24,0
12 à 17 ans	F	.	.	67,8	58,6	75,8	13,0 ^E	8,1	20,3	10,8	7,7	14,9
3 à 17 ans	5,9^E	3,7	9,2	66,5	61,4	71,2	12,9	9,9	16,6	14,7	11,8	18,3
6 à 17 ans	6,4^E	3,9	10,4	67,1	61,8	72,0	12,2	9,1	16,2	14,3	11,7	17,4
Femmes												
6 à 11 ans	4,7 ^E	2,6	8,3	75,0	70,0	79,4	13,7	10,7	17,3	6,7 ^E	4,2	10,5
12 à 17 ans	X	.	.	69,7	58,0	79,2	18,3 ^E	12,1	26,6	9,6 ^E	6,0	15,2
3 à 17 ans	3,1^E	1,7	5,5	71,2	65,9	76,0	16,7	12,9	21,3	9,0	6,9	11,7
6 à 17 ans	3,5^E	1,9	6,3	72,1	65,4	78,0	16,1	12,3	20,9	8,3	5,9	11,4

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de National Center for Health Statistics, 2000, *Clinical Growth Charts*, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, Hyattsville, MD, <http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/growthcharts/clinicalcharts.htm> (site consulté le 19 décembre 2006). Population à domicile âgée de 3 à 17 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Center for Disease Control (CDC).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 27
Distribution de la population à domicile âgée de 3 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes — méthode Cole								
	Ni embonpoint ni obèse			Embonpoint			Obèse		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
	pourcentage								
Les deux sexes									
3 à 5 ans	79,5	72,4	85,1	14,3 ^E	9,9	20,2	6,2 ^E	3,5	10,9
6 à 11 ans	76,8	72,2	80,9	15,1	12,3	18,3	8,1	5,7	11,4
12 à 17 ans	73,1	66,2	79,1	18,0	13,8	23,1	8,9	6,3	12,3
3 à 17 ans	75,7	71,8	79,2	16,2	13,3	19,7	8,1	6,5	9,9
6 à 17 ans	74,8	70,9	78,4	16,7	13,8	20,0	8,5	6,8	10,5
Hommes									
6 à 11 ans	73,9	66,1	80,4	15,4	11,0	21,2	10,7 ^E	7,2	15,8
12 à 17 ans	74,7	65,4	82,1	16,6 ^E	11,2	24,0	8,7 ^E	6,0	12,4
3 à 17 ans	75,6	69,0	81,1	15,3	11,1	20,9	9,1	7,1	11,5
6 à 17 ans	74,3	67,6	80,1	16,1	11,9	21,4	9,6	7,3	12,6
Femmes									
6 à 11 ans	80,0	76,4	83,2	14,7	11,5	18,7	5,3 ^E	3,0	9,2
12 à 17 ans	71,4	60,3	80,4	19,6 ^E	13,0	28,4	9,0 ^E	5,6	14,2
3 à 17 ans	75,8	70,7	80,3	17,1	13,5	21,6	7,0	4,9	9,9
6 à 17 ans	75,4	69,5	80,5	17,3	13,2	22,3	7,3	5,1	10,3

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de T.J. Cole, M.C. Bellizzi, K.M. Flegal & W.H. Diets, 2000, "Establishing a Standard Definition for Child Overweight and Obesity Worldwide : International survey," *The BMJ*, Vol. 320, p. 1240-1243. Population à domicile âgée de 3 à 17 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 28
Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basé sur les mesures directes, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Indice de masse corporelle basé sur les mesures directes								
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	3,1 ^E	2,0	4,8	49,7	43,3	56,2	28,4	24,0	33,3
40 à 59 ans	0,9 ^E	0,5	1,5	32,2	27,2	37,6	37,4	31,1	44,1
60 à 79 ans	F	.	.	25,6	19,9	32,3	38,8	34,0	43,9
18 à 79 ans	2,0	1,4	2,7	37,6	33,1	42,3	34,2	30,9	37,7
Hommes									
18 à 39 ans	X	.	.	44,6	37,3	52,1	33,7	27,4	40,6
40 à 59 ans	X	.	.	24,0	18,4	30,5	44,6	35,0	54,6
60 à 79 ans	X	.	.	21,3	14,8	29,6	42,5	33,7	51,7
18 à 79 ans	F	.	.	31,6	27,5	36,0	39,8	35,6	44,2
Femmes									
18 à 39 ans	3,8 ^E	2,4	5,9	55,0	44,9	64,7	23,0	16,5	31,1
40 à 59 ans	1,4 ^E	0,7	2,7	40,4	32,4	48,9	30,2	24,6	36,5
60 à 79 ans	F	.	.	29,6	22,8	37,5	35,4	30,0	41,2
18 à 79 ans	2,6	1,9	3,7	43,5	37,4	49,8	28,6	24,2	33,5

	Indice de masse corporelle basées sur les mesures directes								
	Obésité, classe I			Obésité, classe II			Obésité, classe III		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	11,3	8,5	14,9	4,8 ^E	2,8	8,1	2,7 ^E	1,5	4,6
40 à 59 ans	17,3	14,1	21,0	8,1 ^E	5,2	12,5	4,2 ^E	2,8	6,1
60 à 79 ans	23,1	20,4	26,1	5,9	4,5	7,8	4,6 ^E	2,8	7,5
18 à 79 ans	16,2	14,0	18,7	6,3	4,6	8,7	3,7	2,8	4,8
Hommes									
18 à 39 ans	13,3	9,7	18,0	F	.	.	F	.	.
40 à 59 ans	22,6	18,5	27,3	F	.	.	F	.	.
60 à 79 ans	25,7	20,1	32,1	6,6 ^E	4,4	9,7	3,3 ^E	1,7	6,4
18 à 79 ans	19,5	16,9	22,5	5,5^E	3,0	9,9	2,2^E	1,2	4,0
Femmes									
18 à 39 ans	9,2 ^E	6,2	13,5	5,4 ^E	3,0	9,4	F	.	.
40 à 59 ans	11,9 ^E	7,4	18,7	9,9 ^E	6,3	15,3	6,2 ^E	3,9	9,7
60 à 79 ans	20,8	15,8	26,9	5,4	3,8	7,6	5,8 ^E	3,3	10,0
18 à 79 ans	12,9	9,8	16,7	7,2	5,2	9,9	5,1^E	3,5	7,4

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Santé Canada, 2003. « Description des "Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes" », *Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes*, produit no H49-179/2003F au catalogue de Santé Canada, p. 9 à 13, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/weight_book_tc-livres_des_poids_tm-fra.php (site consulté le 19 décembre 2006). Population à domicile âgée de 18 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 29
Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde par rapport à la capacité vitale forcée (VEMS/ CVF), selon l'âge et le sexe, population à domicile, Canada, 2009 à 2011

	Meilleur ratio du VEMS/ CVF											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	ratio											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,851	0,842	0,859	0,742	0,710	0,773	0,767	0,747	0,786	0,812	0,803	0,821
12 à 19 ans	0,843	0,835	0,852	0,719	0,694	0,744	0,754	0,727	0,781	0,806	0,794	0,817
20 à 39 ans	0,802	0,790	0,813	0,686	0,648	0,725	0,721	0,696	0,746	0,763	0,752	0,774
40 à 59 ans	0,768	0,762	0,775	0,663	0,629	0,697	0,697	0,684	0,711	0,742	0,732	0,751
60 à 79 ans	0,741	0,736	0,746	0,581	0,544	0,618	0,657	0,648	0,666	0,712	0,702	0,721
6 à 79 ans	0,788	0,782	0,793	0,667	0,651	0,683	0,703	0,694	0,713	0,749	0,742	0,756
Hommes												
6 à 11 ans	0,836	0,824	0,849	0,725	0,676	0,774	0,745	0,718	0,772	0,799	0,783	0,815
12 à 19 ans	0,823	0,812	0,835	0,676	0,629	0,723	0,723	0,686	0,759	0,791	0,775	0,807
20 à 39 ans	0,796	0,784	0,808	0,691	0,658	0,724	0,718	0,694	0,742	0,756	0,741	0,772
40 à 59 ans	0,767	0,758	0,775	0,658	0,619	0,697	0,691	0,670	0,712	0,736	0,718	0,753
60 à 79 ans	0,735	0,729	0,741	0,570	0,536	0,604	0,649	0,617	0,681	0,707	0,696	0,718
6 à 79 ans	0,782	0,776	0,788	0,661	0,642	0,680	0,698	0,684	0,712	0,742	0,734	0,751
Femmes												
6 à 11 ans	0,865	0,857	0,873	0,762	0,742	0,782	0,794	0,779	0,809	0,839	0,833	0,845
12 à 19 ans	0,864	0,854	0,874	0,745	0,710	0,780	0,787	0,766	0,807	0,824	0,815	0,832
20 à 39 ans	0,807	0,793	0,822	0,670	0,604	0,736	0,729	0,685	0,773	0,772	0,755	0,790
40 à 59 ans	0,770	0,762	0,778	0,671	0,620	0,721	0,703	0,682	0,723	0,744	0,736	0,753
60 à 79 ans	0,746	0,735	0,757	0,594	0,536	0,652	0,663	0,647	0,679	0,719	0,707	0,731
6 à 79 ans	0,793	0,787	0,800	0,670	0,645	0,695	0,708	0,696	0,719	0,754	0,749	0,759

	Meilleur ratio du VEMS/ CVF											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	ratio											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,857	0,851	0,863	0,890	0,881	0,899	0,926	0,910	0,941	0,942	0,929	0,955
12 à 19 ans	0,848	0,840	0,855	0,889	0,876	0,902	0,931	0,920	0,942	0,950	0,939	0,962
20 à 39 ans	0,806	0,793	0,818	0,842	0,834	0,850	0,880	0,865	0,895	0,907	0,880	0,935
40 à 59 ans	0,775	0,768	0,782	0,803	0,798	0,808	0,828	0,823	0,832	0,841	0,828	0,854
60 à 79 ans	0,753	0,749	0,757	0,787	0,776	0,799	0,814	0,804	0,824	0,836	0,824	0,848
6 à 79 ans	0,791	0,786	0,795	0,830	0,826	0,835	0,875	0,866	0,884	0,903	0,892	0,914
Hommes												
6 à 11 ans	0,840	0,824	0,856	0,879	0,870	0,889	0,907	0,887	0,926	0,936	0,922	0,950
12 à 19 ans	0,831	0,821	0,841	0,872	0,855	0,889	0,903	0,894	0,912	0,932	0,908	0,956
20 à 39 ans	0,800	0,785	0,815	0,837	0,825	0,849	0,871	0,855	0,887	0,907	0,871	0,944
40 à 59 ans	0,772	0,760	0,783	0,803	0,794	0,812	0,828	0,823	0,832	0,839	0,827	0,851
60 à 79 ans	0,748	0,741	0,755	0,777	0,768	0,786	0,807	0,797	0,817	0,818	0,806	0,830
6 à 79 ans	0,786	0,780	0,792	0,825	0,819	0,831	0,865	0,854	0,875	0,894	0,879	0,909
Femmes												
6 à 11 ans	0,868	0,861	0,876	0,896	0,887	0,906	0,934	0,920	0,948	0,952	0,931	0,973
12 à 19 ans	0,863	0,851	0,875	0,909	0,890	0,928	0,946	0,931	0,961	0,961	0,946	0,976
20 à 39 ans	0,814	0,800	0,828	0,845	0,834	0,856	0,884	0,870	0,899	0,908	0,879	0,937
40 à 59 ans	0,777	0,767	0,787	0,803	0,798	0,809	0,823	0,813	0,834	0,847	0,827	0,867
60 à 79 ans	0,757	0,748	0,766	0,798	0,785	0,811	0,824	0,805	0,843	0,839	0,821	0,857
6 à 79 ans	0,795	0,790	0,800	0,836	0,828	0,843	0,882	0,873	0,890	0,912	0,896	0,927

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 30
Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) de la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS)											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
litres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,84	1,77	1,90	1,18	1,09	1,27	1,31	1,23	1,39	1,50	1,42	1,59
12 à 19 ans	3,45	3,35	3,56	2,23	2,09	2,37	2,46	2,32	2,60	2,83	2,72	2,95
20 à 39 ans	3,64	3,54	3,74	2,37	2,19	2,54	2,61	2,42	2,80	3,00	2,85	3,15
40 à 59 ans	3,09	3,00	3,18	1,91	1,72	2,10	2,17	1,99	2,35	2,56	2,46	2,66
60 à 79 ans	2,44	2,39	2,49	1,44	1,36	1,52	1,66	1,60	1,73	1,95	1,86	2,03
6 à 79 ans	3,10	3,04	3,17	1,68	1,62	1,74	1,90	1,82	1,97	2,43	2,34	2,52
Hommes												
6 à 11 ans	1,86	1,77	1,95	1,18	0,98	1,37	1,31	1,18	1,45	1,53	1,41	1,65
12 à 19 ans	3,81	3,67	3,95	2,11	1,75	2,47	2,50	2,17	2,84	3,14	2,89	3,39
20 à 39 ans	4,22	4,10	4,33	3,12	2,92	3,33	3,44	3,24	3,64	3,77	3,59	3,95
40 à 59 ans	3,58	3,48	3,68	2,53	2,28	2,78	2,76	2,54	2,97	3,17	2,97	3,36
60 à 79 ans	2,89	2,82	2,96	1,87	1,75	1,99	2,11	1,96	2,26	2,44	2,33	2,56
6 à 79 ans	3,58	3,50	3,65	1,84	1,77	1,92	2,31	2,24	2,38	2,97	2,86	3,09
Femmes												
6 à 11 ans	1,81	1,74	1,87	1,19	1,14	1,24	1,30	1,23	1,38	1,47	1,40	1,54
12 à 19 ans	3,09	2,96	3,21	2,29	2,17	2,42	2,45	2,29	2,60	2,72	2,56	2,89
20 à 39 ans	3,06	2,93	3,19	2,29	2,20	2,37	2,37	2,17	2,56	2,72	2,54	2,90
40 à 59 ans	2,61	2,52	2,70	1,85	1,77	1,92	1,95	1,76	2,14	2,28	2,14	2,42
60 à 79 ans	2,05	1,99	2,10	1,23	1,07	1,38	1,49	1,43	1,56	1,78	1,74	1,82
6 à 79 ans	2,64	2,57	2,71	1,57	1,51	1,63	1,80	1,75	1,85	2,20	2,12	2,29

	Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS)											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
litres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,79	1,72	1,86	2,10	2,03	2,17	2,48	2,31	2,65	2,69	2,53	2,86
12 à 19 ans	3,33	3,23	3,43	4,00	3,80	4,20	4,64	4,44	4,84	5,04	4,74	5,33
20 à 39 ans	3,60	3,46	3,75	4,17	3,98	4,35	4,79	4,70	4,87	5,05	4,93	5,17
40 à 59 ans	3,01	2,86	3,16	3,61	3,50	3,71	4,10	3,97	4,22	4,32	4,20	4,43
60 à 79 ans	2,36	2,30	2,42	2,87	2,80	2,93	3,40	3,31	3,49	3,66	3,57	3,75
6 à 79 ans	3,03	2,94	3,12	3,75	3,64	3,86	4,31	4,20	4,43	4,73	4,65	4,80
Hommes												
6 à 11 ans	1,81	1,73	1,90	2,11	2,03	2,20	2,51	2,23	2,79	2,80	2,54	3,06
12 à 19 ans	3,86	3,64	4,07	4,51	4,28	4,73	5,01	4,71	5,30	5,37	5,06	5,68
20 à 39 ans	4,15	3,95	4,35	4,70	4,60	4,80	5,05	4,93	5,16	5,32	5,07	5,57
40 à 59 ans	3,60	3,49	3,71	3,98	3,84	4,11	4,32	4,20	4,44	4,55	4,45	4,66
60 à 79 ans	2,88	2,80	2,96	3,33	3,26	3,40	3,68	3,60	3,75	3,91	3,77	4,05
6 à 79 ans	3,64	3,55	3,72	4,17	4,05	4,28	4,73	4,65	4,80	5,01	4,87	5,15
Femmes												
6 à 11 ans	1,77	1,67	1,86	2,07	1,96	2,17	2,43	2,24	2,61	2,59	2,53	2,65
12 à 19 ans	3,08	2,95	3,22	3,42	3,29	3,56	3,72	3,58	3,85	3,90	3,73	4,07
20 à 39 ans	3,03	2,88	3,19	3,41	3,23	3,58	3,80	3,59	4,01	3,99	3,80	4,18
40 à 59 ans	2,61	2,52	2,70	2,90	2,80	3,01	3,22	3,05	3,39	3,47	3,31	3,63
60 à 79 ans	2,05	1,96	2,15	2,36	2,29	2,43	2,60	2,48	2,71	2,78	2,64	2,91
6 à 79 ans	2,65	2,56	2,74	3,09	2,99	3,18	3,49	3,37	3,62	3,73	3,58	3,87

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 31
Meilleure capacité vitale forcée (CVF) de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Meilleure capacité vitale forcée (CVF)											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	litres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,16	2,08	2,25	1,35	1,23	1,46	1,53	1,43	1,63	1,77	1,66	1,88
12 à 19 ans	4,12	3,98	4,26	2,61	2,46	2,76	2,87	2,72	3,02	3,34	3,18	3,51
20 à 39 ans	4,56	4,41	4,71	2,88	2,54	3,22	3,35	3,08	3,61	3,74	3,54	3,93
40 à 59 ans	4,03	3,91	4,15	2,60	2,36	2,84	2,90	2,69	3,11	3,32	3,20	3,43
60 à 79 ans	3,29	3,22	3,36	2,05	1,96	2,13	2,24	2,14	2,35	2,61	2,52	2,71
6 à 79 ans	3,95	3,85	4,04	2,14	2,07	2,21	2,47	2,39	2,55	3,14	3,04	3,24
Hommes												
6 à 11 ans	2,24	2,11	2,36	1,40	1,15	1,65	1,58	1,39	1,76	1,83	1,66	2,00
12 à 19 ans	4,65	4,45	4,84	2,62	2,21	3,04	3,00	2,66	3,34	3,75	3,46	4,05
20 à 39 ans	5,30	5,15	5,45	3,81	3,44	4,18	4,29	4,02	4,56	4,78	4,57	5,00
40 à 59 ans	4,68	4,54	4,83	3,41	3,25	3,56	3,59	3,20	3,98	4,13	3,89	4,37
60 à 79 ans	3,93	3,84	4,02	2,69	2,58	2,80	2,91	2,74	3,08	3,39	3,23	3,56
6 à 79 ans	4,58	4,48	4,69	2,39	2,27	2,51	3,04	2,89	3,19	3,89	3,78	4,00
Femmes												
6 à 11 ans	2,09	2,01	2,18	1,35	1,27	1,42	1,51	1,43	1,59	1,71	1,60	1,81
12 à 19 ans	3,59	3,44	3,73	2,61	2,45	2,76	2,81	2,63	2,99	3,12	2,91	3,33
20 à 39 ans	3,81	3,63	3,99	2,70	2,48	2,92	2,88	2,55	3,22	3,43	3,24	3,62
40 à 59 ans	3,39	3,28	3,51	2,38	2,23	2,54	2,61	2,35	2,87	3,05	2,92	3,18
60 à 79 ans	2,73	2,65	2,81	1,90	1,75	2,04	2,08	1,99	2,17	2,35	2,25	2,44
6 à 79 ans	3,33	3,24	3,43	2,01	1,93	2,09	2,32	2,26	2,38	2,80	2,67	2,92

	Meilleure capacité vitale forcée (CVF)											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	litres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,13	2,00	2,26	2,50	2,39	2,60	2,90	2,76	3,04	3,10	2,99	3,21
12 à 19 ans	3,91	3,77	4,06	4,81	4,59	5,02	5,69	5,40	5,99	6,03	5,85	6,22
20 à 39 ans	4,50	4,34	4,66	5,38	5,19	5,56	5,93	5,75	6,11	6,33	6,08	6,58
40 à 59 ans	3,91	3,74	4,07	4,74	4,54	4,94	5,30	5,14	5,46	5,64	5,51	5,78
60 à 79 ans	3,17	3,09	3,24	3,88	3,79	3,97	4,50	4,35	4,65	4,97	4,84	5,09
6 à 79 ans	3,87	3,75	3,98	4,77	4,65	4,89	5,53	5,42	5,63	5,91	5,78	6,05
Hommes												
6 à 11 ans	2,22	2,06	2,39	2,59	2,46	2,72	3,00	2,79	3,21	3,16	2,94	3,38
12 à 19 ans	4,79	4,50	5,09	5,54	5,27	5,82	6,03	5,85	6,21	6,39	6,19	6,60
20 à 39 ans	5,36	5,15	5,57	5,80	5,63	5,97	6,33	6,07	6,58	6,70	6,56	6,84
40 à 59 ans	4,72	4,50	4,95	5,18	5,04	5,32	5,64	5,50	5,79	5,90	5,58	6,22
60 à 79 ans	3,92	3,81	4,04	4,43	4,34	4,51	4,97	4,88	5,06	5,20	5,09	5,32
6 à 79 ans	4,72	4,57	4,86	5,38	5,26	5,50	5,92	5,78	6,05	6,25	6,07	6,42
Femmes												
6 à 11 ans	2,02	1,88	2,17	2,42	2,31	2,52	2,80	2,63	2,97	2,99	2,87	3,11
12 à 19 ans	3,55	3,38	3,73	3,98	3,83	4,13	4,41	4,23	4,58	4,62	4,45	4,79
20 à 39 ans	3,79	3,57	4,01	4,20	4,04	4,37	4,56	4,37	4,75	4,92	4,51	5,33
40 à 59 ans	3,35	3,23	3,48	3,74	3,59	3,90	4,15	3,99	4,31	4,39	4,22	4,55
60 à 79 ans	2,70	2,59	2,81	3,09	3,02	3,17	3,46	3,27	3,65	3,63	3,45	3,81
6 à 79 ans	3,36	3,25	3,47	3,86	3,73	3,99	4,31	4,17	4,45	4,55	4,45	4,66

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 32
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) chez la population à domicile âgée de 35 à 79 ans , selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)					
	Obstruction des voies respiratoires mesurée représentative de la MPOC			Absence de la MPOC basée sur le débit d'air mesuré		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
35 à 59 ans	9,9	7,3	13,5	90,1	86,5	92,7
60 à 79 ans	18,7	15,9	21,9	81,3	78,1	84,1
35 à 79 ans	12,5	10,5	14,9	87,5	85,1	89,5
Hommes						
35 à 59 ans	11,5 ^E	7,5	17,2	88,5	82,8	92,5
60 à 79 ans	20,6	16,4	25,7	79,4	74,3	83,6
35 à 79 ans	14,1	11,0	17,8	85,9	82,2	89,0
Femmes						
35 à 59 ans	8,5 ^E	5,6	12,7	91,5	87,3	94,4
60 à 79 ans	17,0	14,1	20,4	83,0	79,6	85,9
35 à 79 ans	11,1	8,6	14,1	88,9	85,9	91,4

Note(s) : Une obstruction des voies respiratoires représentative de la MPOC se caractérise par un ratio du volume expiratoire maximale en une seconde (VEMS) sur la capacité vitale forcée (CVF) de moins de 70% de la valeur prédite en fonction de l'âge, le sexe, la taille et l'origine raciale. Population à domicile âgée de 35 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 33
Distribution des lipoprotéines de haute densité mesurées dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Lipoprotéines de haute densité (HDL)											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,40	1,36	1,44	0,92	0,80	1,05	1,05	1,00	1,10	1,17	1,12	1,22
6 à 11 ans	1,45	1,41	1,49	0,99	0,93	1,05	1,05	1,00	1,11	1,21	1,17	1,24
12 à 19 ans	1,37	1,33	1,41	0,89	0,82	0,95	0,97	0,92	1,02	1,15	1,11	1,18
20 à 39 ans	1,40	1,33	1,47	0,85	0,80	0,89	0,94	0,89	0,99	1,11	1,03	1,18
40 à 59 ans	1,39	1,34	1,44	0,85	0,79	0,90	0,92	0,86	0,98	1,09	1,03	1,14
60 à 79 ans	1,44	1,39	1,49	0,84	0,82	0,87	0,94	0,91	0,96	1,12	1,08	1,16
3 à 79 ans	1,40	1,36	1,45	0,86	0,83	0,88	0,95	0,91	0,98	1,12	1,08	1,16
6 à 79 ans	1,40	1,36	1,45	0,85	0,83	0,88	0,94	0,91	0,98	1,12	1,07	1,16
Hommes												
6 à 11 ans	1,47	1,42	1,52	0,96	0,85	1,07	1,02	0,92	1,12	1,22	1,14	1,31
12 à 19 ans	1,27	1,22	1,32	0,83	0,76	0,90	0,93	0,86	0,99	1,07	1,01	1,13
20 à 39 ans	1,24	1,17	1,31	0,81	0,77	0,85	0,87	0,81	0,92	1,01	0,93	1,08
40 à 59 ans	1,25	1,20	1,30	0,79	0,75	0,84	0,88	0,82	0,94	1,01	0,95	1,07
60 à 79 ans	1,27	1,22	1,31	0,80	0,73	0,88	0,87	0,84	0,90	1,03	0,98	1,08
3 à 79 ans	1,27	1,23	1,31	0,81	0,79	0,84	0,88	0,85	0,92	1,03	0,98	1,08
6 à 79 ans	1,27	1,23	1,31	0,81	0,78	0,84	0,88	0,85	0,92	1,03	0,98	1,08
Femmes												
6 à 11 ans	1,43	1,38	1,48	1,00	0,92	1,07	1,07	1,03	1,11	1,20	1,16	1,24
12 à 19 ans	1,46	1,41	1,52	0,99	0,91	1,08	1,09	1,04	1,14	1,22	1,16	1,27
20 à 39 ans	1,56	1,48	1,65	1,00	0,90	1,10	1,07	0,99	1,16	1,26	1,19	1,33
40 à 59 ans	1,53	1,45	1,61	0,89	0,79	0,99	1,00	0,90	1,10	1,21	1,10	1,32
60 à 79 ans	1,60	1,51	1,68	0,95	0,89	1,01	1,06	0,98	1,13	1,30	1,24	1,36
3 à 79 ans	1,53	1,48	1,59	0,95	0,89	1,00	1,05	1,00	1,10	1,24	1,19	1,29
6 à 79 ans	1,54	1,48	1,60	0,95	0,89	1,00	1,05	1,00	1,10	1,24	1,20	1,29

	Lipoprotéines de haute densité (HDL)											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,38	1,30	1,45	1,59	1,53	1,64	1,77	1,70	1,84	1,91	1,77	2,04
6 à 11 ans	1,42	1,37	1,47	1,64	1,58	1,70	1,85	1,74	1,97	2,03	1,93	2,12
12 à 19 ans	1,32	1,27	1,36	1,54	1,50	1,57	1,78	1,69	1,87	1,91	1,82	2,01
20 à 39 ans	1,33	1,24	1,42	1,63	1,55	1,71	2,02	1,81	2,24	2,13	2,03	2,24
40 à 59 ans	1,34	1,28	1,39	1,62	1,55	1,69	1,93	1,84	2,03	2,10	1,99	2,21
60 à 79 ans	1,38	1,34	1,42	1,69	1,60	1,77	1,97	1,83	2,12	2,22	2,03	2,40
3 à 79 ans	1,35	1,30	1,40	1,62	1,57	1,67	1,92	1,83	2,02	2,11	2,03	2,18
6 à 79 ans	1,35	1,30	1,40	1,62	1,57	1,67	1,93	1,83	2,03	2,11	2,03	2,19
Hommes												
6 à 11 ans	1,47	1,41	1,53	1,70	1,63	1,76	1,85	1,73	1,97	2,02	1,89	2,16
12 à 19 ans	1,25	1,18	1,31	1,46	1,36	1,57	1,63	1,55	1,70	1,82	1,68	1,97
20 à 39 ans	1,19	1,11	1,27	1,42	1,30	1,53	1,59	1,53	1,65	1,78	1,43	2,13
40 à 59 ans	1,22	1,16	1,28	1,41	1,36	1,47	1,63	1,53	1,73	1,86	1,66	2,06
60 à 79 ans	1,21	1,17	1,25	1,46	1,39	1,53	1,69	1,63	1,75	1,87	1,67	2,07
3 à 79 ans	1,23	1,18	1,27	1,45	1,40	1,50	1,67	1,60	1,73	1,86	1,76	1,96
6 à 79 ans	1,22	1,18	1,27	1,44	1,39	1,49	1,65	1,59	1,72	1,86	1,75	1,97
Femmes												
6 à 11 ans	1,39	1,32	1,46	1,58	1,53	1,63	1,86	1,69	2,02	2,08	1,92	2,24
12 à 19 ans	1,40	1,34	1,45	1,62	1,56	1,68	1,87	1,78	1,96	2,08	1,79	2,36
20 à 39 ans	1,54	1,42	1,65	1,77	1,61	1,94	2,09	2,01	2,17	2,21	2,13	2,30
40 à 59 ans	1,49	1,42	1,56	1,79	1,67	1,9	2,05	1,94	2,16	2,21	2,08	2,34
60 à 79 ans	1,54	1,46	1,62	1,83	1,73	1,94	2,15	1,95	2,35	2,36	2,06	2,66
3 à 79 ans	1,49	1,45	1,53	1,77	1,68	1,85	2,08	1,98	2,17	2,21	2,13	2,29
6 à 79 ans	1,50	1,45	1,54	1,77	1,68	1,86	2,08	1,98	2,17	2,22	2,14	2,30

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 34
Distribution des lipoprotéines de basse densité pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Lipoprotéine de basse densité (LDL)											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,4	2,3	2,5	1,3	1,1	1,4	1,5	1,3	1,7	1,9	1,8	2,1
12 à 19 ans	2,3	2,2	2,4	1,3	1,2	1,5	1,5	1,3	1,6	1,8	1,7	1,9
20 à 39 ans	2,6	2,5	2,7	1,5	1,3	1,7	1,8	1,5	2,0	2,1	2,0	2,2
40 à 59 ans	3,2	3,1	3,4	1,7	1,4	2,0	2,0	1,6	2,3	2,6	2,4	2,8
60 à 79 ans	2,9	2,8	3,0	1,4	1,1	1,6	1,6	1,5	1,8	2,1	1,9	2,2
6 à 79 ans	2,8	2,7	2,9	1,4	1,3	1,6	1,7	1,6	1,8	2,1	2,0	2,2
Hommes												
6 à 11 ans	2,4	2,3	2,5	1,3	1,1	1,5	1,5	1,2	1,7	1,9	1,8	2,1
12 à 19 ans	2,3	2,2	2,4	1,3	1,2	1,4	1,4	1,3	1,6	1,7	1,6	1,9
20 à 39 ans	2,7	2,6	2,9	1,5	1,3	1,7	1,7	1,5	2,0	2,2	1,9	2,5
40 à 59 ans	3,3	3,0	3,5	1,7	1,3	2,1	2,0	1,5	2,4	2,7	2,4	2,9
60 à 79 ans	2,7	2,5	2,9	1,3 ^E	0,7	1,9	1,5	1,3	1,7	1,8	1,8	1,9
6 à 79 ans	2,8	2,7	2,9	1,4	1,3	1,5	1,7	1,6	1,8	2,1	1,9	2,2
Femmes												
6 à 11 ans	2,4	2,2	2,6	1,2	0,8	1,5	1,5	1,1	1,9	1,9	1,7	2,1
12 à 19 ans	2,3	2,2	2,4	1,2	0,9	1,6	1,5	1,3	1,7	1,9	1,7	2,1
20 à 39 ans	2,5	2,4	2,7	1,4	0,9	1,8	1,8	1,5	2,0	2,1	1,9	2,2
40 à 59 ans	3,1	3,0	3,3	1,7	1,3	2,1	1,9	1,6	2,3	2,6	2,4	2,7
60 à 79 ans	3,1	2,9	3,2	1,6	1,3	1,9	1,8	1,6	2,1	2,3	2,1	2,5
6 à 79 ans	2,8	2,7	2,9	1,5	1,3	1,6	1,8	1,7	1,9	2,2	2,1	2,2

	Lipoprotéine de basse densité (LDL)											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,3	2,2	2,5	2,8	2,6	3,0	3,2	3,0	3,4	3,5	3,3	3,8
12 à 19 ans	2,2	2,1	2,3	2,7	2,5	2,8	3,2	2,9	3,4	3,5	3,2	3,7
20 à 39 ans	2,5	2,3	2,6	3,0	2,9	3,1	3,6	3,4	3,8	4,0	3,6	4,4
40 à 59 ans	3,1	2,9	3,4	3,7	3,6	3,9	4,2	3,9	4,5	4,7	4,3	5,2
60 à 79 ans	2,8	2,7	3,0	3,5	3,3	3,7	4,2	4,0	4,5	4,5	4,3	4,8
6 à 79 ans	2,7	2,6	2,7	3,4	3,3	3,5	4,0	3,8	4,1	4,3	4,1	4,5
Hommes												
6 à 11 ans	2,3	2,2	2,5	2,8	2,4	3,1	3,2	3,0	3,4	3,3	3,2	3,5
12 à 19 ans	2,2	2,1	2,3	2,7	2,4	2,9	3,3	2,9	3,7	3,6	3,2	4,0
20 à 39 ans	2,6	2,5	2,8	3,1	3,0	3,2	3,7	3,2	4,1	4,2	3,7	4,8
40 à 59 ans	3,3	3,0	3,7	3,8	3,5	4,2	4,2	3,6	4,7	4,8	4,1	5,5
60 à 79 ans	2,4	2,1	2,8	3,4	3,1	3,8	4,2	3,9	4,5	4,4	4,1	4,7
6 à 79 ans	2,7	2,6	2,8	3,4	3,2	3,6	4,0	3,8	4,3	4,4	4,0	4,7
Femmes												
6 à 11 ans	2,4	2,1	2,6	2,7	2,5	2,9	3,3	2,8	3,8	3,6	3,2	4,1
12 à 19 ans	2,2	2,1	2,3	2,7	2,5	2,8	3,1	2,8	3,3	3,4	3,1	3,7
20 à 39 ans	2,4	2,2	2,5	2,8	2,6	3,0	3,5	3,0	3,9	3,8	3,4	4,2
40 à 59 ans	3,0	2,9	3,2	3,7	3,6	3,8	4,1	3,6	4,5	4,7	4,1	5,3
60 à 79 ans	3,0	2,7	3,2	3,6	3,3	3,8	4,3	4,0	4,6	4,7	4,4	5,0
6 à 79 ans	2,7	2,6	2,7	3,3	3,2	3,5	3,9	3,7	4,1	4,3	4,0	4,6

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans - sous-échantillon à jeun, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 35
Distribution du cholestérol total mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Cholestérol total											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	4,2	4,1	4,3	3,2	3,1	3,4	3,4	3,3	3,5	3,7	3,5	3,8
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	3,0	2,8	3,2	3,3	3,1	3,5	3,7	3,6	3,8
12 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	3,0	2,8	3,1	3,2	3,1	3,3	3,6	3,4	3,7
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	3,3	3,0	3,5	3,6	3,4	3,8	4,0	3,9	4,1
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	3,7	3,4	3,9	4,1	3,9	4,2	4,5	4,4	4,6
60 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	3,1	3,0	3,3	3,5	3,3	3,7	4,1	3,9	4,3
3 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	3,2	3,1	3,3	3,5	3,4	3,6	4,0	4,0	4,1
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	3,2	3,1	3,3	3,5	3,4	3,6	4,1	4,0	4,1
Hommes												
6 à 11 ans	4,2	4,0	4,4	3,0	2,7	3,2	3,2	2,9	3,5	3,7	3,5	3,9
12 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	2,9	2,8	3,0	3,1	3,0	3,2	3,4	3,3	3,6
20 à 39 ans	4,7	4,5	4,8	3,2	2,9	3,5	3,5	3,2	3,8	3,9	3,9	4,0
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,4	3,6	3,4	3,9	4,0	3,8	4,2	4,6	4,4	4,8
60 à 79 ans	4,7	4,6	4,8	2,9	2,7	3,1	3,2	3,0	3,4	3,8	3,7	3,9
3 à 79 ans	4,7	4,7	4,8	3,1	3,1	3,2	3,4	3,3	3,5	4,0	3,9	4,0
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,8	3,1	3,1	3,2	3,4	3,3	3,5	4,0	3,9	4,0
Femmes												
6 à 11 ans	4,3	4,1	4,4	3,1	2,9	3,3	3,4	3,2	3,5	3,7	3,5	3,8
12 à 19 ans	4,2	4,1	4,3	3,2	2,9	3,4	3,3	3,2	3,5	3,7	3,6	3,8
20 à 39 ans	4,6	4,4	4,7	3,3	3,0	3,7	3,6	3,4	3,8	4,0	3,9	4,2
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	3,7	3,4	4,1	4,1	4,0	4,3	4,4	4,3	4,6
60 à 79 ans	5,3	5,2	5,5	3,5	3,1	3,8	3,8	3,6	4,0	4,5	4,2	4,7
3 à 79 ans	4,8	4,8	4,9	3,3	3,2	3,5	3,6	3,5	3,7	4,1	4,0	4,2
6 à 79 ans	4,9	4,8	4,9	3,4	3,2	3,5	3,6	3,5	3,8	4,1	4,1	4,2

	Cholestérol total											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	4,1	4,0	4,3	4,5	4,4	4,7	5,0	4,7	5,2	5,4	5,0	5,7
6 à 11 ans	4,1	4,1	4,2	4,6	4,5	4,8	5,1	4,9	5,3	5,4	5,1	5,6
12 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	4,5	4,4	4,6	5,1	4,9	5,2	5,3	5,1	5,5
20 à 39 ans	4,5	4,4	4,5	5,0	4,9	5,1	5,7	5,5	5,9	6,3	6,1	6,5
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,3	5,8	5,6	5,9	6,3	6,1	6,5	6,8	6,6	7,0
60 à 79 ans	4,9	4,7	5,0	5,8	5,6	6,0	6,5	6,3	6,8	6,9	6,8	7,1
3 à 79 ans	4,6	4,6	4,7	5,4	5,3	5,5	6,1	6,0	6,3	6,6	6,4	6,8
6 à 79 ans	4,6	4,6	4,7	5,4	5,3	5,5	6,2	6,0	6,3	6,6	6,5	6,8
Hommes												
6 à 11 ans	4,1	4,0	4,2	4,7	4,4	4,9	5,1	4,9	5,3	5,3	5,1	5,5
12 à 19 ans	4,0	3,8	4,1	4,4	4,3	4,5	5,0	4,8	5,2	5,2	4,9	5,5
20 à 39 ans	4,4	4,3	4,6	5,1	4,9	5,3	5,9	5,7	6,2	6,5	6,1	6,9
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,3	5,8	5,6	6,0	6,3	6,1	6,5	6,7	6,4	6,9
60 à 79 ans	4,5	4,4	4,7	5,4	5,2	5,6	6,2	6,1	6,4	6,6	6,3	6,8
3 à 79 ans	4,6	4,5	4,7	5,4	5,2	5,5	6,1	6,0	6,3	6,5	6,2	6,7
6 à 79 ans	4,6	4,5	4,7	5,4	5,3	5,5	6,2	6,0	6,3	6,5	6,3	6,7
Femmes												
6 à 11 ans	4,1	4,0	4,3	4,6	4,5	4,8	5,1	4,9	5,4	5,7	5,1	6,3
12 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	4,5	4,4	4,7	5,1	5,0	5,3	5,3	5,1	5,6
20 à 39 ans	4,5	4,3	4,6	4,9	4,7	5,1	5,5	5,3	5,8	6,2	5,6	6,7
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,3	5,7	5,6	5,9	6,4	6,0	6,7	6,9	6,7	7,1
60 à 79 ans	5,3	5,1	5,5	6,0	5,8	6,3	6,8	6,5	7,1	7,1	6,9	7,2
3 à 79 ans	4,6	4,6	4,7	5,4	5,3	5,5	6,2	6,0	6,3	6,7	6,4	7,0
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,7	5,5	5,3	5,6	6,2	6,0	6,3	6,7	6,5	7,0

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 36
Distribution du ratio du cholestérol total sur les lipoprotéines de haute densité pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Ratio du cholestérol total sur les lipoprotéines de haute densité (HDL)											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
mmol/mmol												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	3,1	3,0	3,3	2,1	1,9	2,2	2,2	2,1	2,4	2,6	2,4	2,7
6 à 11 ans	3,0	3,0	3,1	2,0	2,0	2,1	2,2	2,1	2,3	2,5	2,4	2,6
12 à 19 ans	3,1	3,0	3,3	2,0	2,0	2,1	2,2	2,1	2,3	2,5	2,5	2,6
20 à 39 ans	3,6	3,4	3,7	2,1	2,0	2,2	2,2	2,1	2,3	2,6	2,4	2,7
40 à 59 ans	4,0	3,9	4,2	2,2	2,1	2,3	2,5	2,4	2,6	3,0	2,9	3,2
60 à 79 ans	3,7	3,6	3,9	2,1	1,9	2,3	2,4	2,2	2,6	2,8	2,7	2,9
3 à 79 ans	3,6	3,5	3,8	2,1	2,0	2,2	2,3	2,2	2,4	2,7	2,6	2,8
6 à 79 ans	3,7	3,5	3,8	2,1	2,1	2,2	2,3	2,2	2,4	2,7	2,6	2,8
Hommes												
6 à 11 ans	3,0	2,9	3,1	2,1	2,0	2,1	2,2	2,1	2,2	2,4	2,3	2,5
12 à 19 ans	3,3	3,1	3,4	2,1	2,0	2,2	2,3	2,2	2,3	2,6	2,5	2,7
20 à 39 ans	4,0	3,8	4,2	2,2	2,1	2,4	2,4	2,3	2,6	2,9	2,7	3,2
40 à 59 ans	4,4	4,2	4,7	2,5	2,2	2,8	2,7	2,4	3,1	3,5	3,2	3,8
60 à 79 ans	3,9	3,8	4,0	2,3	2,1	2,5	2,5	2,4	2,7	2,9	2,8	3,1
3 à 79 ans	3,9	3,8	4,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,9	2,8	3,0
6 à 79 ans	4,0	3,8	4,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,9	2,8	3,1
Femmes												
6 à 11 ans	3,1	3,0	3,2	2,0	1,8	2,3	2,2	2,1	2,4	2,6	2,4	2,8
12 à 19 ans	3,0	2,9	3,1	1,9	1,8	2,1	2,1	2,0	2,3	2,4	2,3	2,6
20 à 39 ans	3,1	2,9	3,3	1,9	1,8	2,1	2,1	2,0	2,2	2,4	2,3	2,5
40 à 59 ans	3,6	3,4	3,8	2,2	2,1	2,3	2,3	2,2	2,5	2,8	2,6	2,9
60 à 79 ans	3,5	3,4	3,7	2,0	1,8	2,2	2,3	2,0	2,6	2,7	2,6	2,8
3 à 79 ans	3,3	3,2	3,5	2,0	2,0	2,1	2,2	2,1	2,3	2,6	2,5	2,7
6 à 79 ans	3,3	3,2	3,5	2,0	1,9	2,1	2,2	2,1	2,3	2,6	2,5	2,7

	Ratio du cholestérol total sur les lipoprotéines de haute densité (HDL)											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
mmol/mmol												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	3,0	2,8	3,2	3,5	3,3	3,6	4,0	3,8	4,2	4,3	3,7	5,0
6 à 11 ans	2,9	2,8	3,0	3,3	3,2	3,5	3,9	3,8	4,1	4,3	3,9	4,6
12 à 19 ans	3,0	2,9	3,1	3,5	3,4	3,6	4,1	3,8	4,4	4,7	4,3	5,0
20 à 39 ans	3,2	3,0	3,4	4,2	3,8	4,6	5,2	4,9	5,5	5,9	5,5	6,3
40 à 59 ans	3,8	3,7	3,9	4,6	4,4	4,9	5,7	5,4	6,0	6,3	6,0	6,6
60 à 79 ans	3,4	3,2	3,6	4,3	4,1	4,4	5,3	5,0	5,5	6,0	5,7	6,3
3 à 79 ans	3,3	3,2	3,5	4,3	4,1	4,5	5,2	5,0	5,5	5,9	5,6	6,2
6 à 79 ans	3,4	3,2	3,5	4,3	4,1	4,5	5,3	5,0	5,5	5,9	5,7	6,2
Hommes												
6 à 11 ans	2,8	2,7	2,9	3,3	3,1	3,5	3,9	3,7	4,1	4,4	3,7	5,1
12 à 19 ans	3,1	2,9	3,3	3,6	3,4	3,9	4,3	3,9	4,8	4,9	4,5	5,3
20 à 39 ans	3,7	3,3	4,0	4,9	4,5	5,3	5,7	5,3	6,0	6,4	5,9	6,8
40 à 59 ans	4,3	4,1	4,6	5,2	4,8	5,6	6,1	5,7	6,5	6,4	6,3	6,6
60 à 79 ans	3,6	3,4	3,8	4,5	4,3	4,7	5,6	5,3	5,8	6,2	5,8	6,5
3 à 79 ans	3,7	3,5	3,8	4,7	4,4	5,0	5,6	5,4	5,9	6,3	6,0	6,5
6 à 79 ans	3,7	3,6	3,9	4,7	4,4	5,1	5,7	5,4	5,9	6,3	6,0	6,5
Femmes												
6 à 11 ans	3,0	2,9	3,1	3,4	3,2	3,6	4,0	3,8	4,2	4,3	4,0	4,6
12 à 19 ans	2,9	2,8	2,9	3,3	3,2	3,5	3,9	3,6	4,1	4,3	4,0	4,6
20 à 39 ans	2,8	2,6	3,0	3,5	3,2	3,8	4,3	3,9	4,7	4,8	4,3	5,3
40 à 59 ans	3,3	3,1	3,6	4,2	3,8	4,5	5,0	4,5	5,5	5,7	5,1	6,4
60 à 79 ans	3,2	3,0	3,4	4,1	3,9	4,3	5,0	4,8	5,3	5,7	5,2	6,1
3 à 79 ans	3,1	3,0	3,2	3,8	3,6	4,0	4,7	4,5	4,9	5,3	4,8	5,7
6 à 79 ans	3,1	3,0	3,2	3,8	3,6	4,0	4,7	4,5	4,9	5,3	4,8	5,7

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 37
Distribution des triglycérides mesurés dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Triglycérides											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,80	0,75	0,85	0,44	0,41	0,47	0,49	0,44	0,53	0,60	0,57	0,63
12 à 19 ans	0,92	0,85	1,00	0,53	0,47	0,58	0,59	0,55	0,64	0,69	0,65	0,73
20 à 39 ans	1,06	0,98	1,16	0,53	0,50	0,55	0,59	0,55	0,62	0,74	0,69	0,80
40 à 59 ans	1,32	1,24	1,41	0,65	0,59	0,71	0,71	0,66	0,76	0,96	0,89	1,03
60 à 79 ans	1,34	1,26	1,43	0,65	0,60	0,70	0,75	0,67	0,83	0,96	0,89	1,02
6 à 79 ans	1,15	1,10	1,20	0,55	0,53	0,57	0,62	0,60	0,64	0,78	0,75	0,82
Hommes												
6 à 11 ans	0,77	0,70	0,86	0,42	0,38	0,45	0,45	0,41	0,49	0,55	0,49	0,62
12 à 19 ans	0,91	0,83	1,00	0,53	0,46	0,60	0,60	0,55	0,64	0,68	0,63	0,72
20 à 39 ans	1,20	1,07	1,34	0,56	0,51	0,61	0,60	0,56	0,65	0,77	0,67	0,86
40 à 59 ans	1,51	1,36	1,69	0,70	0,54	0,87	0,88	0,75	1,02	1,04	0,91	1,16
60 à 79 ans	1,35	1,25	1,46	0,61	0,52	0,71	0,71	0,63	0,78	0,96	0,83	1,08
6 à 79 ans	1,24	1,16	1,33	0,56	0,54	0,58	0,62	0,59	0,64	0,82	0,76	0,87
Femmes												
6 à 11 ans	0,83	0,76	0,91	0,50	0,43	0,57	0,55	0,49	0,61	0,62	0,57	0,67
12 à 19 ans	0,93	0,84	1,04	0,53	0,41	0,64	0,59	0,51	0,68	0,70	0,63	0,76
20 à 39 ans	0,94	0,85	1,05	0,51	0,39	0,64	0,54	0,49	0,59	0,71	0,64	0,78
40 à 59 ans	1,15	1,07	1,24	0,64	0,57	0,70	0,69	0,66	0,72	0,86	0,76	0,97
60 à 79 ans	1,33	1,23	1,44	0,67	0,55	0,78	0,79	0,67	0,92	0,96	0,89	1,02
6 à 79 ans	1,06	1,01	1,12	0,53	0,50	0,57	0,62	0,60	0,65	0,76	0,72	0,80

	Triglycérides											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,78	0,68	0,87	1,03	0,91	1,15	1,36	1,18	1,53	1,56	1,11	2,01
12 à 19 ans	0,86	0,80	0,93	1,16	1,03	1,29	1,72	1,31	2,12	2,06	1,62	2,50
20 à 39 ans	0,99	0,87	1,11	1,51	1,21	1,81	2,03	1,78	2,29	2,94	1,94	3,94
40 à 59 ans	1,28	1,14	1,43	1,83	1,61	2,04	2,39	2,12	2,66	2,97	2,27	3,67
60 à 79 ans	1,27	1,13	1,42	1,87	1,67	2,07	2,42	2,19	2,66	2,94	2,38	3,50
6 à 79 ans	1,08	1,01	1,14	1,61	1,46	1,75	2,25	2,07	2,43	2,81	2,50	3,13
Hommes												
6 à 11 ans	0,71	0,62	0,81	0,97	0,82	1,12	1,51	1,13	1,88	2,04 ^E	1,19	2,88
12 à 19 ans	0,81	0,74	0,88	1,07	0,83	1,31	1,75	1,17	2,33	2,29	1,68	2,90
20 à 39 ans	1,13	0,93	1,33	1,73	1,43	2,03	2,76 ^E	1,60	3,91	3,22	2,32	4,13
40 à 59 ans	1,48	1,24	1,72	2,17	1,75	2,60	2,89	2,05	3,73	4,15	2,89	5,41
60 à 79 ans	1,35	1,16	1,54	1,88	1,72	2,03	2,43	2,18	2,69	2,89	2,45	3,33
6 à 79 ans	1,19	1,05	1,34	1,81	1,60	2,02	2,47	2,16	2,78	3,25	2,74	3,76
Femmes												
6 à 11 ans	0,83	0,70	0,95	1,07	0,92	1,22	1,23	1,07	1,39	1,40	1,05	1,75
12 à 19 ans	0,93	0,82	1,04	1,18	1,03	1,33	1,45	1,07	1,83	1,83	1,37	2,30
20 à 39 ans	0,86	0,74	0,97	1,24	0,87	1,61	1,92	1,52	2,31	2,03	1,71	2,35
40 à 59 ans	1,09	0,99	1,18	1,60	1,37	1,83	1,97	1,80	2,14	2,26	1,89	2,64
60 à 79 ans	1,21	1,06	1,36	1,77	1,43	2,11	2,41	2,07	2,75	2,98	2,03	3,93
6 à 79 ans	1,02	0,98	1,06	1,41	1,23	1,58	1,99	1,88	2,11	2,29	2,11	2,48

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans - sous-échantillon à jeun, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 38
Distribution de l'albumine mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Albumine											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
g/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	45	45	46	40	39	41	41	40	42	43	42	44
6 à 11 ans	46	45	47	41	40	42	42	41	42	44	43	44
12 à 19 ans	46	45	46	41	40	42	42	41	42	43	43	44
20 à 39 ans	45	45	46	39	39	40	40	40	41	42	42	43
40 à 59 ans	44	43	44	39	38	40	40	39	40	42	41	42
60 à 79 ans	43	42	43	37	36	39	39	38	40	41	40	41
3 à 79 ans	44	44	45	39	38	40	40	39	40	42	41	42
6 à 79 ans	44	44	45	39	38	40	40	39	40	42	41	42
Hommes												
6 à 11 ans	46	45	46	41	39	42	41	40	42	43	42	44
12 à 19 ans	46	46	47	42	41	42	42	42	43	44	44	45
20 à 39 ans	46	46	47	41	41	42	42	42	43	44	43	45
40 à 59 ans	44	44	45	39	39	40	40	40	41	42	42	43
60 à 79 ans	43	43	44	38	37	39	39	39	40	41	40	42
3 à 79 ans	45	45	46	40	39	40	41	40	41	43	42	43
6 à 79 ans	45	45	46	40	39	40	41	40	41	43	42	43
Femmes												
6 à 11 ans	46	46	47	41	41	42	42	41	43	44	43	45
12 à 19 ans	45	44	45	40	39	41	41	40	42	43	42	43
20 à 39 ans	44	43	44	38	36	40	39	39	40	41	40	42
40 à 59 ans	43	43	44	38	37	40	39	39	40	41	40	42
60 à 79 ans	42	42	43	37	36	38	38	37	40	40	39	41
3 à 79 ans	44	43	44	38	37	39	39	39	40	41	41	42
6 à 79 ans	44	43	44	38	37	39	39	39	40	41	40	42

	Albumine											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
g/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	45	44	46	46	46	47	49	48	50	50	49	51
6 à 11 ans	46	45	46	47	47	48	49	48	49	50	49	50
12 à 19 ans	45	45	45	47	46	48	49	48	49	50	49	50
20 à 39 ans	45	44	45	47	46	47	49	48	49	50	50	51
40 à 59 ans	43	43	44	45	45	46	47	46	47	47	47	48
60 à 79 ans	42	42	43	44	44	45	46	45	47	47	46	47
3 à 79 ans	44	43	44	46	46	46	48	47	48	49	48	49
6 à 79 ans	44	43	44	46	45	46	48	47	48	49	48	49
Hommes												
6 à 11 ans	45	44	46	47	47	48	48	48	49	49	48	49
12 à 19 ans	46	46	47	48	47	49	49	49	50	50	49	51
20 à 39 ans	46	46	47	48	47	48	50	49	50	51	50	51
40 à 59 ans	44	44	44	45	45	46	47	46	48	48	47	49
60 à 79 ans	43	42	44	45	44	46	47	46	47	47	47	48
3 à 79 ans	45	44	45	47	46	47	48	48	49	49	49	50
6 à 79 ans	45	44	45	47	46	47	48	48	49	49	49	50
Femmes												
6 à 11 ans	46	45	46	47	47	48	49	48	50	50	49	51
12 à 19 ans	44	44	44	46	45	46	48	47	49	49	48	50
20 à 39 ans	43	43	44	45	45	46	47	46	47	48	46	50
40 à 59 ans	43	42	44	44	44	45	46	45	47	47	46	48
60 à 79 ans	42	41	43	44	43	44	45	44	46	46	46	47
3 à 79 ans	43	43	44	45	45	46	47	46	47	48	47	49
6 à 79 ans	43	43	44	45	44	45	47	46	47	48	47	48

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 39
Distribution du calcium total mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Calcium total											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	2,51	2,50	2,52	2,38	2,34	2,41	2,42	2,40	2,44	2,46	2,45	2,47
6 à 11 ans	2,50	2,49	2,51	2,38	2,36	2,40	2,40	2,38	2,41	2,44	2,43	2,46
12 à 19 ans	2,45	2,44	2,46	2,33	2,32	2,34	2,35	2,34	2,37	2,40	2,39	2,41
20 à 39 ans	2,42	2,41	2,43	2,29	2,28	2,31	2,32	2,31	2,33	2,35	2,33	2,37
40 à 59 ans	2,41	2,39	2,42	2,26	2,23	2,29	2,30	2,28	2,32	2,34	2,33	2,36
60 à 79 ans	2,42	2,40	2,43	2,27	2,26	2,29	2,30	2,29	2,31	2,35	2,33	2,36
3 à 79 ans	2,43	2,42	2,44	2,28	2,27	2,30	2,31	2,30	2,32	2,36	2,35	2,37
6 à 79 ans	2,42	2,41	2,43	2,28	2,27	2,30	2,31	2,30	2,32	2,36	2,34	2,37
Hommes												
6 à 11 ans	2,49	2,47	2,50	2,38	2,36	2,39	2,39	2,38	2,40	2,43	2,41	2,44
12 à 19 ans	2,47	2,46	2,48	2,35	2,32	2,37	2,37	2,35	2,39	2,42	2,40	2,43
20 à 39 ans	2,44	2,43	2,46	2,32	2,30	2,33	2,34	2,32	2,36	2,38	2,36	2,40
40 à 59 ans	2,41	2,40	2,43	2,28	2,25	2,31	2,31	2,29	2,33	2,36	2,34	2,38
60 à 79 ans	2,40	2,39	2,42	2,27	2,25	2,30	2,29	2,28	2,31	2,34	2,33	2,36
3 à 79 ans	2,43	2,42	2,45	2,30	2,28	2,31	2,32	2,31	2,34	2,37	2,36	2,39
6 à 79 ans	2,43	2,42	2,44	2,30	2,28	2,31	2,32	2,31	2,34	2,37	2,36	2,39
Femmes												
6 à 11 ans	2,51	2,49	2,53	2,38	2,34	2,41	2,41	2,38	2,45	2,46	2,44	2,48
12 à 19 ans	2,44	2,43	2,45	2,32	2,30	2,33	2,34	2,32	2,36	2,38	2,37	2,39
20 à 39 ans	2,40	2,38	2,42	2,28	2,27	2,30	2,30	2,28	2,32	2,34	2,33	2,35
40 à 59 ans	2,40	2,38	2,41	2,24	2,20	2,29	2,29	2,25	2,32	2,33	2,32	2,35
60 à 79 ans	2,43	2,41	2,44	2,28	2,26	2,29	2,30	2,29	2,31	2,35	2,33	2,37
3 à 79 ans	2,42	2,41	2,43	2,28	2,25	2,30	2,30	2,29	2,32	2,34	2,34	2,35
6 à 79 ans	2,41	2,40	2,43	2,27	2,25	2,30	2,30	2,29	2,32	2,34	2,33	2,35

	Calcium total											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	2,51	2,49	2,53	2,56	2,54	2,58	2,60	2,58	2,62	2,63	2,62	2,64
6 à 11 ans	2,49	2,48	2,50	2,54	2,53	2,55	2,58	2,56	2,60	2,62	2,59	2,64
12 à 19 ans	2,45	2,44	2,46	2,50	2,49	2,50	2,54	2,53	2,55	2,56	2,54	2,58
20 à 39 ans	2,41	2,39	2,43	2,47	2,45	2,49	2,53	2,51	2,55	2,57	2,54	2,61
40 à 59 ans	2,40	2,39	2,41	2,45	2,44	2,46	2,51	2,48	2,53	2,55	2,51	2,58
60 à 79 ans	2,40	2,39	2,42	2,47	2,45	2,48	2,53	2,51	2,56	2,58	2,56	2,61
3 à 79 ans	2,42	2,40	2,43	2,48	2,47	2,49	2,54	2,52	2,55	2,58	2,56	2,59
6 à 79 ans	2,41	2,40	2,43	2,48	2,47	2,49	2,53	2,52	2,55	2,57	2,55	2,59
Hommes												
6 à 11 ans	2,48	2,47	2,49	2,53	2,51	2,55	2,57	2,55	2,58	2,59	2,57	2,62
12 à 19 ans	2,47	2,46	2,48	2,51	2,50	2,53	2,55	2,53	2,56	2,57	2,54	2,60
20 à 39 ans	2,43	2,41	2,46	2,50	2,47	2,52	2,55	2,52	2,58	2,58	2,55	2,61
40 à 59 ans	2,41	2,39	2,42	2,45	2,44	2,47	2,50	2,47	2,53	2,54	2,50	2,59
60 à 79 ans	2,40	2,38	2,41	2,45	2,44	2,47	2,51	2,48	2,53	2,55	2,51	2,58
3 à 79 ans	2,43	2,41	2,44	2,48	2,47	2,49	2,54	2,52	2,56	2,57	2,55	2,59
6 à 79 ans	2,42	2,41	2,44	2,48	2,47	2,49	2,54	2,52	2,56	2,57	2,55	2,59
Femmes												
6 à 11 ans	2,51	2,49	2,53	2,56	2,54	2,58	2,60	2,57	2,63	2,64	2,58	2,69
12 à 19 ans	2,43	2,42	2,44	2,48	2,47	2,49	2,51	2,50	2,53	2,54	2,53	2,56
20 à 39 ans	2,38	2,36	2,40	2,44	2,43	2,46	2,52	2,47	2,57	2,53	2,48	2,58
40 à 59 ans	2,39	2,37	2,40	2,45	2,43	2,47	2,51	2,47	2,54	2,55	2,50	2,61
60 à 79 ans	2,41	2,39	2,43	2,48	2,46	2,50	2,56	2,52	2,59	2,60	2,56	2,64
3 à 79 ans	2,41	2,39	2,42	2,47	2,46	2,49	2,53	2,52	2,55	2,58	2,56	2,60
6 à 79 ans	2,40	2,39	2,42	2,47	2,45	2,48	2,53	2,51	2,54	2,58	2,56	2,59

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 40
Distribution de la créatinine mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Créatinine											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile				
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	35	34	37	27	25	28	28	27	30	31	30	33
6 à 11 ans	46	44	47	35	33	38	38	36	40	41	39	43
12 à 19 ans	65	64	67	47	45	49	50	48	52	57	55	58
20 à 39 ans	74	73	75	55	54	56	58	56	60	64	63	66
40 à 59 ans	75	74	77	55	52	59	59	56	61	66	65	68
60 à 79 ans	79	78	81	57	55	58	60	58	61	68	66	69
3 à 79 ans	71	70	71	43	41	44	50	49	52	61	60	62
6 à 79 ans	72	71	73	47	46	48	53	52	55	62	61	63
Hommes												
6 à 11 ans	45	44	47	35	32	38	37	35	39	41	38	43
12 à 19 ans	69	67	72	49	45	52	52	49	55	60	56	63
20 à 39 ans	84	82	85	67	66	69	70	69	72	77	75	79
40 à 59 ans	83	81	86	63	59	68	68	64	71	75	72	78
60 à 79 ans	89	87	91	69	67	71	72	70	75	77	76	79
3 à 79 ans	78	77	78	43	42	45	53	50	55	71	69	73
6 à 79 ans	80	79	80	48	46	49	59	58	61	73	71	74
Femmes												
6 à 11 ans	46	44	48	35	32	38	38	35	40	41	40	43
12 à 19 ans	61	60	62	46	43	48	49	47	51	55	54	57
20 à 39 ans	65	63	67	53	51	55	55	54	56	59	57	60
40 à 59 ans	68	67	70	52	50	55	55	52	59	61	58	64
60 à 79 ans	71	69	74	54	51	57	57	56	58	61	60	63
3 à 79 ans	64	63	65	43	41	45	49	48	51	57	56	59
6 à 79 ans	65	64	66	47	46	49	52	50	53	58	57	59

	Créatinine											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile				
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	34	33	36	38	36	40	43	41	46	45	43	47
6 à 11 ans	45	44	46	50	48	51	54	53	56	57	55	58
12 à 19 ans	65	63	67	74	71	77	83	80	87	88	83	92
20 à 39 ans	73	72	75	85	84	86	92	91	94	95	91	99
40 à 59 ans	75	74	76	85	83	87	94	93	96	99	97	102
60 à 79 ans	77	75	79	89	87	91	103	99	107	117	107	127
3 à 79 ans	72	71	73	84	83	85	93	92	94	99	97	101
6 à 79 ans	73	72	73	84	83	85	93	92	95	100	98	101
Hommes												
6 à 11 ans	45	44	46	49	48	51	53	51	56	57	55	59
12 à 19 ans	70	66	75	79	76	82	87	83	90	92	88	96
20 à 39 ans	85	83	86	91	88	93	95	91	98	101	96	107
40 à 59 ans	83	80	85	93	91	95	99	97	101	104	102	107
60 à 79 ans	86	85	88	98	95	100	110	104	116	124	115	133
3 à 79 ans	82	81	83	90	89	92	98	96	100	105	103	107
6 à 79 ans	82	81	83	91	89	93	98	96	100	105	103	107
Femmes												
6 à 11 ans	45	44	47	50	48	52	54	53	56	57	54	60
12 à 19 ans	61	59	62	67	67	68	72	69	75	77	73	80
20 à 39 ans	65	63	66	70	67	73	76	73	79	80	76	84
40 à 59 ans	68	66	70	75	74	77	82	79	85	85	81	88
60 à 79 ans	69	67	71	78	75	80	91	84	98	98	79	116
3 à 79 ans	65	64	66	72	71	73	80	78	82	85	82	88
6 à 79 ans	65	64	66	73	72	74	80	78	82	85	82	88

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 41
Distribution de la gamma-glutamyl-transférase mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Gamma-glutamyl-transférase												
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à		de	à	
	U/L												
Les deux sexes													
3 à 5 ans	14	13	15	7 ^E	3	11	10	9	12		12	11	12
6 à 11 ans	15	14	16	10	9	12	11	11	12		13	12	13
12 à 19 ans	17	16	18	10	10	11	11	11	12		13	12	14
20 à 39 ans	22	20	24	11	10	13	13	12	14		15	14	16
40 à 59 ans	28	26	30	12	12	13	14	13	15		18	16	19
60 à 79 ans	30	28	31	14	13	15	16	15	17		20	19	21
3 à 79 ans	24	22	25	11	11	12	13	12	13		15	14	16
6 à 79 ans	24	23	25	12	11	12	13	12	14		16	15	17
Hommes													
6 à 11 ans	16	15	17	11	10	12	12	11	12		13	12	14
12 à 19 ans	19	17	20	11	10	13	13	12	14		14	14	15
20 à 39 ans	28	25	30	14	13	15	15	14	16		19	17	21
40 à 59 ans	35	32	38	16	15	18	17	15	19		24	20	28
60 à 79 ans	32	30	35	17	15	18	19	17	20		22	20	24
3 à 79 ans	28	26	29	13	12	14	14	14	15		18	17	19
6 à 79 ans	28	27	30	13	13	14	15	14	15		18	17	19
Femmes													
6 à 11 ans	15	14	16	10	7	13	11	10	12		13	12	13
12 à 19 ans	15	14	17	10	7	13	11	10	11		12	12	13
20 à 39 ans	17	16	19	.	.	.	12	10	13		14	12	15
40 à 59 ans	22	21	24	11	10	13	13	12	13		15	14	17
60 à 79 ans	27	25	30	13	12	14	15	14	16		18	17	19
3 à 79 ans	20	19	21	11	9	12	12	11	13		14	13	15
6 à 79 ans	20	19	22	11	10	12	12	11	13		14	13	15

	Gamma-glutamyl-transférase												
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à		de	à	
	U/L												
Les deux sexes													
3 à 5 ans	13	12	14	16	14	17	17	16	19		19	16	21
6 à 11 ans	15	14	16	17	16	18	20	18	22		22	20	25
12 à 19 ans	16	14	17	19	18	20	24	21	28		31	22	40
20 à 39 ans	20	18	21	30	26	33	44	36	52		54	48	60
40 à 59 ans	25	23	27	38	35	42	64	49	79		89	73	104
60 à 79 ans	27	26	27	39	36	41	59	50	68		77	66	88
3 à 79 ans	21	19	22	31	30	33	49	45	53		69	60	78
6 à 79 ans	21	20	23	32	30	33	50	46	54		70	62	79
Hommes													
6 à 11 ans	15	14	16	17	16	19	20	18	22		22	19	25
12 à 19 ans	17	15	19	21	19	22	27	19	36		36 ^E	15	58
20 à 39 ans	25	21	29	36	30	42	53	46	60		61	54	67
40 à 59 ans	31	28	34	48	44	52	80	63	96		106	86	126
60 à 79 ans	29	27	32	41	36	45	64	52	75		77	69	85
3 à 79 ans	25	24	27	38	35	40	57	51	62		78	67	90
6 à 79 ans	26	24	27	38	35	41	57	51	63		80	68	92
Femmes													
6 à 11 ans	14	13	15	17	16	18	20	18	22		23	20	26
12 à 19 ans	15	14	16	18	17	20	22	21	23		25	20	30
20 à 39 ans	17	15	19	21	19	23	31	27	35		35	26	43
40 à 59 ans	20	18	21	28	25	31	41	33	49		70 ^E	42	97
60 à 79 ans	25	22	27	36	32	40	57	48	67		77	57	98
3 à 79 ans	18	17	19	25	23	27	37	34	41		53	46	59
6 à 79 ans	18	17	19	25	23	27	38	35	41		54	47	60

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 42
Distribution du phosphore mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Phosphore											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,69	1,67	1,71	1,46	1,44	1,48	1,49	1,47	1,52	1,59	1,56	1,62
6 à 11 ans	1,63	1,60	1,65	1,42	1,38	1,46	1,46	1,43	1,49	1,53	1,51	1,56
12 à 19 ans	1,41	1,38	1,43	1,08	1,03	1,13	1,13	1,07	1,19	1,26	1,23	1,29
20 à 39 ans	1,24	1,23	1,26	0,99	0,96	1,01	1,04	1,01	1,07	1,13	1,11	1,15
40 à 59 ans	1,22	1,19	1,25	0,95	0,93	0,98	1,02	0,98	1,06	1,12	1,09	1,14
60 à 79 ans	1,21	1,19	1,23	0,95	0,92	0,98	1,00	0,96	1,04	1,10	1,08	1,12
3 à 79 ans	1,28	1,27	1,30	0,98	0,96	1,00	1,04	1,02	1,06	1,14	1,12	1,16
6 à 79 ans	1,27	1,26	1,29	0,98	0,96	1,00	1,04	1,02	1,06	1,13	1,12	1,15
Hommes												
6 à 11 ans	1,63	1,61	1,66	1,42	1,36	1,49	1,47	1,43	1,50	1,55	1,51	1,58
12 à 19 ans	1,45	1,41	1,48	1,09	1,02	1,16	1,14	1,05	1,22	1,28	1,22	1,34
20 à 39 ans	1,24	1,21	1,26	0,98	0,94	1,01	1,02	0,97	1,07	1,10	1,08	1,13
40 à 59 ans	1,18	1,15	1,22	0,91	0,86	0,95	0,97	0,93	1,01	1,08	1,04	1,12
60 à 79 ans	1,16	1,14	1,19	0,93	0,88	0,99	0,97	0,94	1,00	1,05	1,03	1,08
3 à 79 ans	1,27	1,25	1,29	0,96	0,94	0,98	1,01	0,97	1,05	1,11	1,08	1,13
6 à 79 ans	1,25	1,23	1,27	0,95	0,94	0,97	1,01	0,97	1,04	1,10	1,08	1,12
Femmes												
6 à 11 ans	1,62	1,59	1,64	1,42	1,39	1,45	1,45	1,41	1,49	1,52	1,49	1,54
12 à 19 ans	1,37	1,34	1,39	1,06	0,98	1,14	1,11	1,04	1,18	1,26	1,22	1,29
20 à 39 ans	1,25	1,23	1,27	1,02	0,99	1,06	1,07	1,05	1,10	1,15	1,12	1,17
40 à 59 ans	1,26	1,23	1,29	1,02	0,97	1,07	1,08	1,04	1,12	1,15	1,11	1,19
60 à 79 ans	1,26	1,23	1,28	0,99	0,94	1,04	1,05	1,00	1,09	1,15	1,12	1,19
3 à 79 ans	1,30	1,28	1,32	1,02	1,01	1,04	1,08	1,07	1,10	1,17	1,14	1,20
6 à 79 ans	1,29	1,27	1,31	1,02	1,01	1,04	1,08	1,06	1,10	1,16	1,14	1,19

	Phosphore											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,68	1,66	1,70	1,78	1,74	1,82	1,87	1,83	1,90	1,92	1,87	1,97
6 à 11 ans	1,62	1,59	1,64	1,71	1,69	1,73	1,78	1,76	1,80	1,83	1,79	1,87
12 à 19 ans	1,40	1,37	1,42	1,54	1,51	1,57	1,69	1,65	1,73	1,76	1,70	1,82
20 à 39 ans	1,25	1,23	1,27	1,34	1,32	1,36	1,43	1,40	1,46	1,49	1,47	1,51
40 à 59 ans	1,21	1,17	1,24	1,32	1,28	1,36	1,43	1,37	1,49	1,48	1,44	1,53
60 à 79 ans	1,21	1,18	1,23	1,30	1,27	1,32	1,41	1,38	1,44	1,47	1,45	1,50
3 à 79 ans	1,26	1,24	1,27	1,39	1,37	1,42	1,56	1,54	1,58	1,68	1,66	1,70
6 à 79 ans	1,25	1,23	1,27	1,37	1,35	1,40	1,53	1,51	1,55	1,63	1,61	1,65
Hommes												
6 à 11 ans	1,63	1,60	1,67	1,72	1,69	1,75	1,77	1,75	1,79	1,83	1,79	1,86
12 à 19 ans	1,42	1,39	1,46	1,60	1,56	1,65	1,74	1,69	1,78	1,83	1,76	1,91
20 à 39 ans	1,24	1,21	1,28	1,34	1,31	1,37	1,45	1,40	1,50	1,50	1,44	1,55
40 à 59 ans	1,17	1,14	1,20	1,27	1,23	1,32	1,40	1,31	1,48	1,48	1,42	1,54
60 à 79 ans	1,16	1,13	1,19	1,26	1,23	1,28	1,35	1,32	1,38	1,42	1,37	1,48
3 à 79 ans	1,23	1,20	1,25	1,38	1,34	1,42	1,59	1,56	1,62	1,70	1,67	1,72
6 à 79 ans	1,22	1,20	1,25	1,36	1,33	1,39	1,55	1,52	1,58	1,66	1,64	1,69
Femmes												
6 à 11 ans	1,60	1,57	1,63	1,70	1,67	1,73	1,79	1,74	1,83	1,84	1,77	1,91
12 à 19 ans	1,37	1,34	1,40	1,48	1,45	1,51	1,59	1,56	1,61	1,66	1,61	1,71
20 à 39 ans	1,26	1,22	1,29	1,34	1,31	1,37	1,42	1,39	1,46	1,47	1,43	1,52
40 à 59 ans	1,25	1,22	1,27	1,35	1,32	1,38	1,45	1,40	1,50	1,51	1,46	1,57
60 à 79 ans	1,25	1,24	1,27	1,35	1,31	1,38	1,45	1,42	1,48	1,50	1,47	1,54
3 à 79 ans	1,27	1,25	1,29	1,40	1,38	1,42	1,54	1,53	1,56	1,66	1,64	1,68
6 à 79 ans	1,27	1,25	1,29	1,39	1,36	1,41	1,51	1,49	1,53	1,60	1,57	1,62

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 43
Distribution de l'urée mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Urée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	5,0	4,9	5,2	3,3	3,1	3,5	3,5	3,3	3,7	4,2	4,1	4,3
6 à 11 ans	4,8	4,6	4,9	2,9	2,8	3,0	3,3	3,2	3,4	3,9	3,8	4,0
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	2,7	2,5	2,9	3,1	2,9	3,3	3,7	3,5	3,9
20 à 39 ans	4,9	4,8	5,1	3,0	2,7	3,3	3,4	3,3	3,5	3,9	3,7	4,0
40 à 59 ans	5,5	5,3	5,7	3,2	2,9	3,6	3,8	3,5	4,1	4,4	4,2	4,7
60 à 79 ans	6,3	6,1	6,6	3,7	3,4	4,1	4,2	4,0	4,4	4,9	4,7	5,2
3 à 79 ans	5,3	5,2	5,4	3,1	3,0	3,2	3,5	3,4	3,6	4,2	4,1	4,3
6 à 79 ans	5,3	5,3	5,4	3,1	3,0	3,2	3,5	3,4	3,6	4,2	4,1	4,3
Hommes												
6 à 11 ans	5,0	4,9	5,2	3,3	2,9	3,7	3,6	3,3	4,0	4,1	4,0	4,3
12 à 19 ans	4,9	4,8	5,1	3,3	2,8	3,7	3,5	3,3	3,7	4,1	3,8	4,3
20 à 39 ans	5,5	5,3	5,7	3,3	2,9	3,8	3,7	3,4	4,0	4,4	4,2	4,7
40 à 59 ans	5,8	5,6	6,0	3,5	3,1	4,0	4,1	3,7	4,4	4,8	4,6	5,1
60 à 79 ans	6,6	6,4	6,8	4,2	3,7	4,6	4,6	4,4	4,8	5,3	5,1	5,5
3 à 79 ans	5,7	5,6	5,8	3,4	3,3	3,6	3,9	3,7	4,1	4,6	4,4	4,8
6 à 79 ans	5,7	5,6	5,8	3,4	3,3	3,6	3,9	3,7	4,1	4,6	4,4	4,8
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	2,7	2,4	3,1	3,0	2,8	3,2	3,7	3,5	3,9
12 à 19 ans	4,2	4,1	4,3	2,5	2,3	2,7	2,9	2,7	3,0	3,4	3,3	3,5
20 à 39 ans	4,4	4,2	4,5	2,8	2,2	3,3	3,1	2,8	3,5	3,6	3,5	3,8
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,4	3,0	2,3	3,7	3,4	3,0	3,9	4,2	3,9	4,4
60 à 79 ans	6,1	5,6	6,5	3,7	2,9	4,5	4,0	3,6	4,4	4,7	4,4	5,0
3 à 79 ans	5,0	4,8	5,1	2,8	2,6	3,1	3,3	3,1	3,4	3,9	3,8	4,0
6 à 79 ans	5,0	4,8	5,1	2,8	2,6	3,1	3,3	3,1	3,4	3,9	3,8	4,0

	Urée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	4,9	4,6	5,2	5,8	5,4	6,3	6,4	6,2	6,6	6,7	6,5	6,9
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,8	5,5	5,3	5,8	6,2	5,9	6,5	6,8	6,2	7,5
12 à 19 ans	4,5	4,4	4,6	5,3	5,1	5,4	5,9	5,7	6,2	6,5	6,1	6,9
20 à 39 ans	4,8	4,6	4,9	5,7	5,5	6,0	6,8	6,3	7,3	7,4	6,9	7,9
40 à 59 ans	5,4	5,2	5,6	6,3	6,1	6,5	7,3	7,0	7,6	7,8	7,4	8,3
60 à 79 ans	5,9	5,7	6,1	7,1	6,9	7,4	8,6	8,1	9,1	9,9	8,8	11,0
3 à 79 ans	5,1	5,0	5,2	6,1	6,0	6,2	7,2	7,1	7,4	8,0	7,8	8,2
6 à 79 ans	5,1	5,0	5,2	6,1	6,0	6,2	7,2	7,1	7,4	8,0	7,8	8,2
Hommes												
6 à 11 ans	4,9	4,7	5,2	5,8	5,5	6,1	6,3	5,7	6,9	7,1	6,3	8,0
12 à 19 ans	4,9	4,7	5,1	5,6	5,4	5,9	6,4	5,9	6,9	6,8	6,3	7,3
20 à 39 ans	5,4	5,0	5,7	6,2	5,9	6,6	7,3	6,8	7,9	7,9	7,3	8,5
40 à 59 ans	5,7	5,5	6,0	6,6	6,3	7,0	7,4	7,0	7,7	7,8	7,3	8,4
60 à 79 ans	6,2	6,0	6,3	7,4	7,2	7,6	8,7	8,3	9,1	9,6	8,7	10,5
3 à 79 ans	5,5	5,3	5,7	6,4	6,2	6,7	7,5	7,3	7,7	8,0	7,8	8,2
6 à 79 ans	5,6	5,4	5,7	6,5	6,2	6,8	7,5	7,3	7,7	8,1	7,8	8,3
Femmes												
6 à 11 ans	4,4	4,2	4,5	5,0	4,9	5,2	6,0	5,7	6,4	6,5	5,8	7,2
12 à 19 ans	4,2	4,1	4,3	4,9	4,7	5,1	5,5	5,3	5,8	5,9	5,7	6,2
20 à 39 ans	4,1	4,0	4,3	5,0	4,7	5,4	5,7	5,3	6,1	6,1	5,9	6,3
40 à 59 ans	5,0	4,8	5,2	6,0	5,8	6,2	6,9	6,4	7,3	7,8	7,0	8,6
60 à 79 ans	5,7	5,4	6,0	6,7	6,3	7,2	8,4	7,2	9,6	10,1	8,1	12,1
3 à 79 ans	4,7	4,5	4,9	5,7	5,5	5,9	6,6	6,5	6,8	7,7	7,1	8,3
6 à 79 ans	4,7	4,5	4,9	5,7	5,5	5,9	6,6	6,5	6,8	7,7	7,1	8,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 44
Distribution de l'acide urique mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Acide urique											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	196	187	205	119	92	146	142	125	158	167	159	175
6 à 11 ans	218	212	225	128	118	138	143	122	163	181	169	192
12 à 19 ans	289	282	296	182	168	196	203	194	212	235	222	247
20 à 39 ans	296	288	305	173	150	196	199	185	213	240	230	250
40 à 59 ans	307	300	314	186	178	195	214	205	223	247	238	256
60 à 79 ans	326	317	336	194	168	221	217	200	234	265	257	273
3 à 79 ans	297	291	302	172	165	180	194	187	202	233	226	240
6 à 79 ans	300	294	305	176	170	182	201	194	207	239	233	246
Hommes												
6 à 11 ans	212	202	222	125	112	138	133	111	155	178	153	203
12 à 19 ans	326	315	336	204	189	219	226	207	246	280	268	292
20 à 39 ans	345	330	361	248	228	268	260	246	275	302	287	317
40 à 59 ans	345	332	357	218	197	239	243	225	261	289	270	307
60 à 79 ans	361	353	370	241	224	258	269	255	283	306	298	315
3 à 79 ans	332	325	340	190	180	201	224	216	232	278	268	289
6 à 79 ans	337	329	345	208	196	219	232	222	242	284	274	294
Femmes												
6 à 11 ans	225	218	231	138	122	153	158	143	172	192	179	206
12 à 19 ans	250	243	258	163	144	182	183	166	200	220	211	228
20 à 39 ans	247	239	256	139	107	170	173	150	196	204	191	217
40 à 59 ans	269	260	279	177	165	189	193	180	207	224	218	230
60 à 79 ans	294	279	309	171	144	198	200	173	227	244	225	263
3 à 79 ans	261	255	266	159	146	171	180	174	186	217	211	223
6 à 79 ans	263	257	268	161	147	175	181	174	188	219	214	224

	Acide urique											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	189	180	198	227	212	243	257	239	274	278	253	303
6 à 11 ans	216	209	223	251	242	259	290	275	305	317	301	334
12 à 19 ans	283	276	290	338	326	350	384	373	395	411	393	430
20 à 39 ans	296	287	304	352	334	369	399	378	420	427	407	446
40 à 59 ans	298	288	307	362	347	377	416	402	430	457	422	492
60 à 79 ans	317	311	324	376	362	391	445	430	461	481	450	511
3 à 79 ans	290	283	296	351	340	361	408	397	420	442	424	460
6 à 79 ans	294	287	300	353	343	362	410	398	422	444	426	462
Hommes												
6 à 11 ans	209	198	219	240	232	247	284	258	310	322	301	344
12 à 19 ans	325	310	341	372	357	387	410	392	427	443	413	472
20 à 39 ans	338	318	357	388	370	406	426	405	447	450	396	504
40 à 59 ans	339	329	350	399	382	417	443	410	476	482	428	535
60 à 79 ans	356	345	367	408	393	423	459	442	477	497	460	535
3 à 79 ans	331	324	339	387	376	398	432	417	447	466	446	486
6 à 79 ans	334	326	342	389	378	401	434	418	450	468	447	488
Femmes												
6 à 11 ans	221	215	227	263	249	277	293	278	308	313	291	335
12 à 19 ans	248	239	257	283	276	291	312	302	323	333	313	352
20 à 39 ans	244	231	257	288	276	300	322	304	339	353	331	374
40 à 59 ans	260	244	276	303	293	313	355	328	381	395	369	422
60 à 79 ans	284	272	296	329	319	339	407	364	450	447	389	505
3 à 79 ans	254	248	260	298	291	305	344	334	354	381	359	404
6 à 79 ans	256	249	262	299	292	306	345	335	355	382	359	406

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 45
Distribution de l'hémoglobine mesurée dans le sang complet pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Hémoglobine											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	g/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	127	126	128	116	114	117	118	117	119	122	120	123
6 à 11 ans	132	130	134	117	114	120	120	118	123	126	124	128
12 à 19 ans	141	140	142	122	120	124	126	125	127	133	131	134
20 à 39 ans	144	143	146	124	122	125	127	126	129	135	133	136
40 à 59 ans	143	142	144	123	120	126	128	127	130	134	133	135
60 à 79 ans	141	139	142	118	113	123	124	121	127	132	131	134
3 à 79 ans	142	141	143	121	120	122	125	124	127	132	131	133
6 à 79 ans	142	141	143	122	120	123	126	125	127	133	132	134
Hommes												
6 à 11 ans	132	130	133	118	114	121	120	117	124	126	124	128
12 à 19 ans	148	146	150	131	127	135	136	133	139	142	139	144
20 à 39 ans	153	152	155	138	136	141	141	138	144	146	145	148
40 à 59 ans	151	149	152	136	132	139	139	136	143	144	142	147
60 à 79 ans	148	146	150	128	121	134	134	132	136	141	139	143
3 à 79 ans	149	148	150	127	125	129	133	131	135	141	140	143
6 à 79 ans	150	148	151	129	128	131	135	133	137	142	140	144
Femmes												
6 à 11 ans	132	130	134	116	110	121	120	116	125	126	123	129
12 à 19 ans	134	132	136	119	118	121	122	120	125	128	126	130
20 à 39 ans	135	134	136	121	119	123	124	122	125	129	127	130
40 à 59 ans	135	134	136	120	117	122	123	120	126	130	128	132
60 à 79 ans	134	132	135	114	103	125	120	116	124	128	125	130
3 à 79 ans	134	133	135	119	117	121	122	121	124	128	127	130
6 à 79 ans	135	133	136	119	117	121	123	121	124	129	128	130

	Hémoglobine											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	g/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	127	125	129	131	130	132	136	132	139	138	134	143
6 à 11 ans	132	130	134	137	135	139	142	139	145	145	142	148
12 à 19 ans	140	138	142	149	147	151	156	154	158	159	156	162
20 à 39 ans	144	142	145	153	151	155	162	160	164	165	163	167
40 à 59 ans	142	140	143	151	150	152	158	156	160	163	160	165
60 à 79 ans	140	139	142	149	147	151	157	155	159	162	160	164
3 à 79 ans	141	139	142	150	149	151	158	157	160	163	162	164
6 à 79 ans	141	140	142	150	149	152	158	157	160	163	162	165
Hommes												
6 à 11 ans	131	129	133	137	135	139	142	139	146	144	141	148
12 à 19 ans	147	145	150	154	152	157	159	156	162	162	158	165
20 à 39 ans	152	150	155	160	158	162	165	163	167	168	166	170
40 à 59 ans	150	149	152	157	155	159	163	160	165	165	162	169
60 à 79 ans	148	146	150	155	153	157	162	160	164	166	163	170
3 à 79 ans	149	148	150	156	155	158	163	162	165	166	164	168
6 à 79 ans	150	148	151	157	155	158	163	162	165	166	164	168
Femmes												
6 à 11 ans	133	131	135	137	135	139	142	139	145	145	142	148
12 à 19 ans	134	132	135	139	137	141	144	141	148	148	145	151
20 à 39 ans	135	134	137	142	140	144	145	144	147	148	144	152
40 à 59 ans	134	133	136	140	138	142	146	143	149	149	147	151
60 à 79 ans	134	133	136	140	138	142	145	144	147	149	147	151
3 à 79 ans	134	133	135	140	139	142	145	144	147	149	147	150
6 à 79 ans	134	133	135	140	139	142	145	144	147	149	147	151

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 46
Distribution de l'hématocrite mesurée dans le sang complet pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Hématocrite											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
g/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,377	0,373	0,381	0,346	0,338	0,353	0,352	0,348	0,357	0,365	0,361	0,369
6 à 11 ans	0,389	0,383	0,395	0,351	0,346	0,355	0,356	0,350	0,362	0,372	0,366	0,378
12 à 19 ans	0,417	0,412	0,421	0,362	0,355	0,369	0,375	0,367	0,382	0,393	0,387	0,398
20 à 39 ans	0,425	0,421	0,430	0,367	0,364	0,370	0,376	0,370	0,382	0,398	0,392	0,403
40 à 59 ans	0,421	0,417	0,426	0,367	0,362	0,373	0,378	0,372	0,384	0,395	0,389	0,401
60 à 79 ans	0,415	0,411	0,420	0,349	0,335	0,363	0,370	0,360	0,380	0,391	0,386	0,395
3 à 79 ans	0,418	0,414	0,421	0,362	0,358	0,367	0,371	0,367	0,376	0,391	0,387	0,394
6 à 79 ans	0,419	0,415	0,423	0,363	0,359	0,368	0,373	0,368	0,377	0,392	0,389	0,396
Hommes												
6 à 11 ans	0,388	0,381	0,394	0,348	0,337	0,359	0,358	0,35	0,366	0,371	0,363	0,379
12 à 19 ans	0,437	0,432	0,442	0,388	0,378	0,398	0,401	0,396	0,406	0,42	0,413	0,427
20 à 39 ans	0,452	0,446	0,458	0,408	0,404	0,412	0,416	0,407	0,425	0,432	0,424	0,440
40 à 59 ans	0,444	0,439	0,449	0,402	0,389	0,414	0,408	0,403	0,414	0,425	0,418	0,431
60 à 79 ans	0,436	0,431	0,442	0,38	0,367	0,394	0,395	0,388	0,401	0,414	0,408	0,420
3 à 79 ans	0,439	0,435	0,443	0,377	0,372	0,382	0,393	0,388	0,397	0,418	0,414	0,422
6 à 79 ans	0,441	0,437	0,445	0,383	0,377	0,390	0,400	0,394	0,406	0,420	0,416	0,425
Femmes												
6 à 11 ans	0,390	0,384	0,397	0,351	0,346	0,356	0,355	0,345	0,365	0,373	0,365	0,382
12 à 19 ans	0,395	0,389	0,401	0,354	0,346	0,362	0,362	0,355	0,370	0,379	0,371	0,386
20 à 39 ans	0,398	0,395	0,402	0,361	0,353	0,369	0,367	0,364	0,370	0,382	0,376	0,388
40 à 59 ans	0,399	0,393	0,404	0,363	0,355	0,371	0,367	0,362	0,373	0,383	0,375	0,390
60 à 79 ans	0,396	0,391	0,401	0,337	0,320	0,355	0,353	0,337	0,370	0,380	0,372	0,389
3 à 79 ans	0,397	0,393	0,401	0,353	0,347	0,359	0,365	0,361	0,369	0,380	0,375	0,385
6 à 79 ans	0,397	0,393	0,401	0,354	0,347	0,36	0,366	0,362	0,370	0,381	0,375	0,386

	Hématocrite											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
g/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,375	0,369	0,381	0,387	0,383	0,391	0,401	0,394	0,408	0,409	0,397	0,421
6 à 11 ans	0,390	0,384	0,397	0,403	0,398	0,408	0,420	0,410	0,430	0,430	0,421	0,439
12 à 19 ans	0,416	0,409	0,422	0,439	0,433	0,444	0,464	0,455	0,472	0,473	0,465	0,481
20 à 39 ans	0,422	0,418	0,427	0,451	0,445	0,457	0,479	0,470	0,488	0,490	0,485	0,495
40 à 59 ans	0,420	0,414	0,425	0,446	0,439	0,452	0,467	0,461	0,474	0,482	0,474	0,491
60 à 79 ans	0,413	0,409	0,418	0,440	0,434	0,447	0,464	0,459	0,470	0,481	0,473	0,490
3 à 79 ans	0,415	0,411	0,419	0,443	0,438	0,448	0,468	0,463	0,472	0,483	0,478	0,488
6 à 79 ans	0,416	0,412	0,421	0,444	0,439	0,449	0,468	0,463	0,473	0,484	0,479	0,489
Hommes												
6 à 11 ans	0,388	0,380	0,395	0,402	0,396	0,408	0,421	0,409	0,433	0,431	0,421	0,440
12 à 19 ans	0,434	0,428	0,439	0,456	0,447	0,466	0,473	0,465	0,481	0,480	0,469	0,491
20 à 39 ans	0,451	0,444	0,457	0,472	0,463	0,481	0,490	0,485	0,495	0,498	0,492	0,504
40 à 59 ans	0,442	0,436	0,449	0,461	0,453	0,469	0,482	0,473	0,491	0,492	0,486	0,499
60 à 79 ans	0,438	0,431	0,446	0,457	0,451	0,463	0,482	0,473	0,492	0,492	0,483	0,501
3 à 79 ans	0,439	0,435	0,444	0,461	0,455	0,467	0,483	0,478	0,488	0,493	0,488	0,497
6 à 79 ans	0,441	0,436	0,445	0,462	0,456	0,468	0,484	0,478	0,489	0,493	0,488	0,497
Femmes												
6 à 11 ans	0,392	0,386	0,399	0,405	0,399	0,410	0,419	0,408	0,429	0,429	0,417	0,442
12 à 19 ans	0,394	0,389	0,400	0,408	0,399	0,417	0,427	0,416	0,439	0,438	0,430	0,446
20 à 39 ans	0,398	0,393	0,403	0,417	0,411	0,423	0,426	0,422	0,430	0,435	0,426	0,444
40 à 59 ans	0,397	0,391	0,403	0,413	0,407	0,420	0,428	0,420	0,437	0,441	0,431	0,451
60 à 79 ans	0,398	0,392	0,404	0,414	0,409	0,418	0,429	0,423	0,435	0,441	0,431	0,451
3 à 79 ans	0,396	0,392	0,400	0,413	0,409	0,418	0,427	0,422	0,431	0,438	0,431	0,444
6 à 79 ans	0,397	0,393	0,401	0,414	0,409	0,418	0,427	0,422	0,432	0,438	0,431	0,445

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 47
Distribution du volume globulaire moyen mesuré dans le sang complet pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Volume globulaire moyen											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
fL												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	7,9	7,6	8,2	6,7	6,3	7,0	6,9	6,6	7,1	7,1	6,9	7,3
6 à 11 ans	8,2	8,0	8,5	6,8	6,6	7,1	7,1	6,9	7,4	7,5	7,4	7,7
12 à 19 ans	8,6	8,3	8,8	7,2	7,0	7,4	7,4	7,2	7,6	7,8	7,5	8,1
20 à 39 ans	8,7	8,5	9,0	7,3	7,0	7,6	7,6	7,3	7,9	8,0	7,8	8,3
40 à 59 ans	8,6	8,4	8,9	7,2	6,8	7,6	7,5	7,3	7,8	7,9	7,7	8,1
60 à 79 ans	8,7	8,4	9,0	7,2	6,8	7,5	7,5	7,2	7,7	7,9	7,7	8,2
3 à 79 ans	8,6	8,4	8,9	7,1	6,9	7,4	7,4	7,2	7,7	7,9	7,7	8,1
6 à 79 ans	8,6	8,4	8,9	7,2	6,9	7,5	7,5	7,3	7,7	7,9	7,7	8,1
Hommes												
6 à 11 ans	8,2	8,0	8,5	6,9	6,5	7,2	7,2	6,9	7,5	7,6	7,3	7,8
12 à 19 ans	8,5	8,3	8,8	7,2	7,0	7,4	7,4	7,2	7,6	7,8	7,5	8,0
20 à 39 ans	8,6	8,3	8,9	7,2	6,8	7,6	7,5	7,1	7,9	8,0	7,7	8,4
40 à 59 ans	8,6	8,3	8,8	7,2	6,7	7,8	7,5	7,2	7,8	7,9	7,6	8,1
60 à 79 ans	8,7	8,3	9,0	6,9	6,5	7,4	7,4	7,0	7,8	7,9	7,5	8,2
3 à 79 ans	8,6	8,3	8,8	7,1	6,7	7,4	7,4	7,1	7,7	7,9	7,6	8,1
6 à 79 ans	8,6	8,3	8,8	7,1	6,8	7,5	7,5	7,2	7,7	7,9	7,6	8,1
Femmes												
6 à 11 ans	8,2	7,9	8,6	6,8	6,4	7,1	7,1	6,8	7,3	7,5	7,3	7,8
12 à 19 ans	8,6	8,3	8,9	7,2	7,0	7,4	7,4	7,2	7,6	7,8	7,5	8,1
20 à 39 ans	8,8	8,6	9,1	7,3	7,0	7,7	7,7	7,4	7,9	8,1	7,9	8,3
40 à 59 ans	8,7	8,4	8,9	7,2	6,8	7,5	7,5	7,3	7,8	7,9	7,7	8,1
60 à 79 ans	8,7	8,4	9,0	7,3	7,1	7,5	7,6	7,3	7,8	8,0	7,7	8,2
3 à 79 ans	8,7	8,4	8,9	7,2	7,0	7,4	7,5	7,3	7,7	7,9	7,7	8,1
6 à 79 ans	8,7	8,4	8,9	7,2	7,0	7,4	7,5	7,3	7,7	7,9	7,7	8,1

	Volume globulaire moyen											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
fL												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	7,7	7,3	8,1	8,3	8,0	8,7	9,1	8,5	9,7	9,4	9,0	9,8
6 à 11 ans	8,1	7,8	8,4	8,7	8,3	9,1	9,4	9,0	9,8	9,8	9,4	10,3
12 à 19 ans	8,4	8,1	8,8	9,1	8,8	9,4	9,8	9,5	10,2	10,1	9,7	10,6
20 à 39 ans	8,5	8,3	8,8	9,3	8,9	9,6	9,9	9,6	10,2	10,3	10,0	10,7
40 à 59 ans	8,4	8,1	8,7	9,2	9,0	9,4	9,8	9,5	10,1	10,2	9,7	10,7
60 à 79 ans	8,4	8,2	8,7	9,3	8,9	9,6	10,1	9,6	10,6	10,6	10,2	11,1
3 à 79 ans	8,4	8,2	8,7	9,2	8,9	9,4	9,8	9,6	10,1	10,3	10,0	10,6
6 à 79 ans	8,4	8,2	8,7	9,2	8,9	9,4	9,9	9,6	10,1	10,3	10,0	10,6
Hommes												
6 à 11 ans	8,1	7,8	8,3	8,6	8,2	9,0	9,4	9,1	9,8	9,7	9,4	10,1
12 à 19 ans	8,4	8,0	8,7	9,1	8,8	9,3	9,7	9,4	10,1	10,1	9,8	10,4
20 à 39 ans	8,5	8,2	8,8	9,1	8,8	9,4	9,7	9,3	10,0	10,1	9,7	10,5
40 à 59 ans	8,4	8,1	8,7	9,2	8,9	9,4	9,7	9,4	10,0	10,0	9,6	10,3
60 à 79 ans	8,5	8,1	8,9	9,3	9,0	9,6	9,9	9,5	10,3	10,4	9,9	10,9
3 à 79 ans	8,4	8,1	8,7	9,1	8,9	9,4	9,7	9,5	9,9	10,1	9,8	10,3
6 à 79 ans	8,4	8,1	8,7	9,1	8,9	9,4	9,7	9,5	10,0	10,1	9,8	10,3
Femmes												
6 à 11 ans	8,1	7,7	8,5	8,8	8,4	9,2	9,4	8,9	10,0	10,1	9,4	10,7
12 à 19 ans	8,5	8,1	8,8	9,1	8,7	9,5	9,9	9,5	10,4	10,3	9,7	10,9
20 à 39 ans	8,6	8,4	8,8	9,4	9,0	9,8	10,0	9,7	10,4	10,5	9,8	11,2
40 à 59 ans	8,5	8,1	8,8	9,2	8,9	9,5	9,9	9,4	10,4	10,5	10,0	11,1
60 à 79 ans	8,4	8,2	8,6	9,2	8,7	9,7	10,2	9,6	10,8	10,7	10,2	11,1
3 à 79 ans	8,5	8,2	8,7	9,2	8,9	9,5	10,0	9,6	10,3	10,5	10,2	10,9
6 à 79 ans	8,5	8,2	8,7	9,2	8,9	9,5	10,0	9,7	10,3	10,5	10,2	10,9

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 48
Distribution du glucose mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Glucose											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,7	3,9	3,8	4,0	4,0	3,9	4,1	4,2	4,1	4,4
12 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	4,1	4,0	4,1	4,2	4,1	4,3	4,4	4,3	4,4
20 à 39 ans	4,8	4,7	4,9	4,1	4,0	4,2	4,2	4,1	4,3	4,4	4,4	4,5
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,4	4,3	4,2	4,4	4,4	4,3	4,5	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,7	5,5	5,8	4,5	4,5	4,6	4,7	4,6	4,7	4,9	4,8	5,1
6 à 79 ans	5,1	5,0	5,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,2	4,4	4,5	4,5	4,6
Hommes												
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,8	3,9	3,7	4,1	4,0	3,8	4,2	4,3	4,1	4,5
12 à 19 ans	4,8	4,7	4,9	4,1	3,9	4,3	4,3	4,1	4,5	4,5	4,4	4,6
20 à 39 ans	5,0	4,8	5,3	4,2	3,9	4,5	4,4	4,1	4,7	4,6	4,5	4,7
40 à 59 ans	5,4	5,2	5,7	4,4	4,3	4,5	4,5	4,4	4,6	4,8	4,6	4,9
60 à 79 ans	5,8	5,6	6,1	4,6	4,4	4,8	4,8	4,6	4,9	5,1	5,0	5,3
6 à 79 ans	5,2	5,1	5,4	4,2	4,1	4,4	4,4	4,3	4,5	4,7	4,6	4,7
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	3,9	3,7	4,1	4,0	3,9	4,2	4,2	4,0	4,3
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	4,0	4,0	4,1	4,1	4,0	4,2	4,3	4,3	4,4
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,2	4,4
40 à 59 ans	5,0	4,9	5,1	4,2	4,1	4,3	4,4	4,2	4,5	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,6	5,4	5,7	4,5	4,3	4,6	4,6	4,5	4,7	4,8	4,6	4,9
6 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,1	4,2	4,4	4,4	4,5

	Glucose											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	mmol/L											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,8	4,7	4,8	5,0	4,9	5,1	5,1	5,1	5,2
12 à 19 ans	4,6	4,6	4,7	4,9	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	5,0	5,2
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,0	5,4	5,2	5,6	5,9	5,4	6,5
40 à 59 ans	5,0	4,8	5,1	5,5	5,3	5,6	6,1	5,7	6,5	7,0	6,0	7,9
60 à 79 ans	5,4	5,3	5,5	6,0	5,7	6,2	7,1	6,6	7,7	8,5	7,9	9,1
6 à 79 ans	4,8	4,8	4,9	5,3	5,2	5,4	6,0	5,8	6,1	6,7	6,3	7,1
Hommes												
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,7	4,8	4,7	4,9	5,0	4,9	5,2	5,2	5,0	5,3
12 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	4,9	4,9	5,0	5,1	5,0	5,1	5,2	5,1	5,4
20 à 39 ans	4,9	4,8	4,9	5,1	4,9	5,3	5,9	5,2	6,7	6,1	5,6	6,6
40 à 59 ans	5,1	4,8	5,4	5,7	5,3	6,1	6,6	5,7	7,5	7,4	5,2	9,5
60 à 79 ans	5,6	5,4	5,8	6,2	5,8	6,7	7,2	6,5	8,0	8,4	7,3	9,6
6 à 79 ans	4,9	4,9	5,0	5,5	5,3	5,7	6,2	6,0	6,5	7,1	6,6	7,6
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	4,8	5,1	5,1	5,0	5,2
12 à 19 ans	4,5	4,4	4,5	4,8	4,7	4,8	4,9	4,8	5,0	5,1	5,0	5,2
20 à 39 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,6	4,9	5,1	4,8	5,5	5,4	5,1	5,7
40 à 59 ans	4,8	4,7	5,0	5,2	5,1	5,3	5,6	5,4	5,7	5,8	5,5	6,2
60 à 79 ans	5,2	5,0	5,4	5,8	5,6	5,9	7,0	5,9	8,0	8,7	7,7	9,8
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,8	5,1	5,0	5,2	5,6	5,4	5,7	6,1	5,8	6,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans - sous-échantillon à jeun, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 49
Prévalence de l'anticorps de surface du virus de l'hépatite B mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Anticorps de surface du virus de l'hépatite B présent			Absence de l'anticorps de surface du virus de l'hépatite B		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
14 à 19 ans	76,9	72,6	80,7	23,1	19,3	27,4
20 à 39 ans	50,4	43,8	57,0	49,6	43,0	56,2
40 à 59 ans	21,0	16,3	26,5	79,0	73,5	83,7
60 à 79 ans	18,1	13,6	23,6	81,9	76,4	86,4
14 à 79 ans	35,4	31,4	39,6	64,6	60,4	68,6
Hommes						
14 à 19 ans	77,3	70,4	82,9	22,7	17,1	29,6
20 à 39 ans	45,3	36,6	54,4	54,7	45,6	63,4
40 à 59 ans	14,7 ^E	9,8	21,6	85,3	78,4	90,2
60 à 79 ans	16,5 ^E	10,3	25,3	83,5	74,7	89,7
14 à 79 ans	31,3	27,1	35,9	68,7	64,1	72,9
Femmes						
14 à 19 ans	76,4	68,7	82,7	23,6	17,3	31,3
20 à 39 ans	55,6	45,7	65,0	44,4	35,0	54,3
40 à 59 ans	27,3	20,7	35,1	72,7	64,9	79,3
60 à 79 ans	19,5	15,0	25,1	80,5	74,9	85,0
14 à 79 ans	39,5	34,6	44,5	60,5	55,5	65,4

Note(s) : La présence de l'anticorps de surface du virus de l'hépatite B représente une immunité au virus. Population à domicile âgée de 14 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 50
Prévalence de l'herpès simplex-2 mesuré dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Herpès simplex-2 présente			Absence d'herpès simplex-2		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
20 à 39 ans	8,9 ^E	6,0	13,1	91,1	86,9	94,0
40 à 59 ans	20,5	16,5	25,3	79,5	74,7	83,5
20 à 59 ans	15,0	12,4	18,0	85,0	82,0	87,6
Hommes						
20 à 39 ans	6,2 ^E	3,7	10,2	93,8	89,8	96,3
40 à 59 ans	17,5 ^E	12,0	24,7	82,5	75,3	88,0
20 à 59 ans	12,1	9,0	16,0	87,9	84,0	91,0
Femmes						
20 à 39 ans	11,6 ^E	7,5	17,6	88,4	82,4	92,5
40 à 59 ans	23,6	18,4	29,8	76,4	70,2	81,6
20 à 59 ans	17,9	14,9	21,4	82,1	78,6	85,1

Note(s) : Les résultats pour la population à domicile âgée de 14 à 19 ans sont trop peu fiables pour être publiés. Alors, ce tableau fournit les données pour la population âgée de 20 à 59 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 51
Distribution de la ferritine mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Ferritine											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile				
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	ug/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	33	29	38	13	11	15	15	13	17	23	18	27
6 à 11 ans	41	38	44	18	15	21	22	19	24	30	27	33
12 à 19 ans	43	40	47	13	10	16	18	15	21	29	27	31
20 à 39 ans	78	70	86	14 ^E	8	20	22	17	26	40	35	45
40 à 59 ans	103	93	113	16	11	20	24	21	28	54	44	63
60 à 79 ans	122	110	135	22 ^E	13	30	36	27	45	75	67	83
3 à 79 ans	81	79	84	15	13	18	23	21	25	40	38	43
6 à 79 ans	84	81	87	16	13	18	23	21	25	42	39	45
Hommes												
6 à 11 ans	40	36	45	17	11	23	23	19	27	29	26	33
12 à 19 ans	58	53	64	23	19	28	29	26	31	39	35	42
20 à 39 ans	146	128	166	46 ^E	29	63	63	56	70	95	74	115
40 à 59 ans	185	164	207	52	42	62	76	56	96	113	91	135
60 à 79 ans	158	146	171	32	22	41	51	40	63	101	93	110
3 à 79 ans	128	123	133	27	24	29	38	35	40	71	65	77
6 à 79 ans	133	128	138	28	26	31	41	38	44	75	69	81
Femmes												
6 à 11 ans	42	39	45	18	17	20	21	19	23	31	28	35
12 à 19 ans	32	29	36	10	8	12	13	10	16	22	19	25
20 à 39 ans	41	38	45	10 ^E	5	15	16	11	21	26	23	30
40 à 59 ans	56	49	65	10 ^E	6	15	16	12	21	30	22	39
60 à 79 ans	96	83	111	16 ^E	5	27	27 ^E	13	40	61	47	76
3 à 79 ans	52	49	55	11	9	13	17	15	19	29	25	33
6 à 79 ans	52	49	56	11	9	13	17	15	20	29	25	33

	Ferritine											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile				
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	ug/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	35	31	40	46	39	53	65	49	80	81	65	96
6 à 11 ans	40	38	43	54	52	56	77	66	88	92	83	101
12 à 19 ans	44	39	48	64	58	69	103	94	112	140	107	173
20 à 39 ans	80	71	89	164	142	186	258	225	292	326	248	404
40 à 59 ans	111	100	121	221	187	255	341	295	387	417	334	501
60 à 79 ans	131	119	143	215	193	236	348	314	383	463	370	557
3 à 79 ans	84	79	89	166	160	171	287	264	309	374	331	416
6 à 79 ans	89	82	95	167	159	176	291	268	315	380	337	423
Hommes												
6 à 11 ans	40	35	45	54	50	59	72	55	89	91	72	109
12 à 19 ans	58	53	63	84	68	99	127	99	155	164	127	202
20 à 39 ans	161	139	183	230	202	258	325	249	401	439	349	529
40 à 59 ans	182	160	204	309	271	347	408	327	489	556	448	663
60 à 79 ans	164	145	183	287	255	319	430	363	498	549	443	654
3 à 79 ans	141	130	153	242	219	265	371	326	416	466	395	536
6 à 79 ans	146	136	155	248	222	273	373	328	418	472	399	546
Femmes												
6 à 11 ans	41	37	45	54	49	58	80	66	94	92	83	100
12 à 19 ans	34	31	36	47	43	52	66	49	82	81	66	96
20 à 39 ans	43	40	47	71	63	80	107	97	116	115	104	125
40 à 59 ans	60	44	76	108	88	129	159	121	197	233	186	281
60 à 79 ans	108	92	124	168	149	186	248	186	310	360	281	439
3 à 79 ans	49	46	53	97	89	105	153	142	163	205	174	236
6 à 79 ans	50	47	54	98	90	106	154	142	166	206	172	239

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 52
Distribution de l'iode mesuré dans l'urine pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Iode											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,79	1,57	2,03	0,51	0,38	0,65	0,69	0,48	0,90	1,18	1,06	1,31
6 à 11 ans	1,49	1,33	1,68	0,42	0,30	0,53	0,55	0,48	0,63	0,99	0,88	1,11
12 à 19 ans	1,27	1,14	1,41	0,31	0,24	0,39	0,50	0,41	0,60	0,84	0,72	0,95
20 à 39 ans	1,01	0,91	1,13	0,25 ^E	0,15	0,34	0,40	0,31	0,48	0,70	0,60	0,79
40 à 59 ans	0,91	0,84	0,99	0,22	0,15	0,29	0,33	0,27	0,39	0,57	0,50	0,63
60 à 79 ans	0,92	0,84	1,01	0,21 ^E	0,13	0,29	0,32	0,27	0,37	0,58	0,53	0,63
3 à 79 ans	1,03	0,98	1,09	0,24	0,20	0,28	0,37	0,34	0,41	0,66	0,61	0,70
6 à 79 ans	1,01	0,96	1,07	0,24	0,20	0,27	0,37	0,33	0,40	0,65	0,61	0,70
Hommes												
6 à 11 ans	1,77	1,52	2,06	0,51	0,41	0,61	0,71	0,59	0,83	1,13	0,93	1,32
12 à 19 ans	1,40	1,23	1,59	0,39 ^E	0,21	0,57	0,59	0,46	0,72	0,97	0,84	1,10
20 à 39 ans	1,01	0,88	1,15	0,23 ^E	0,09	0,37	0,36	0,25	0,47	0,71	0,64	0,79
40 à 59 ans	0,97	0,86	1,08	0,26	0,17	0,34	0,39	0,30	0,47	0,56	0,44	0,69
60 à 79 ans	0,99	0,89	1,11	0,26	0,18	0,35	0,34	0,29	0,40	0,59	0,52	0,65
3 à 79 ans	1,09	1,01	1,18	0,28	0,23	0,34	0,40	0,35	0,45	0,69	0,62	0,77
6 à 79 ans	1,07	0,99	1,16	0,28	0,22	0,34	0,40	0,35	0,44	0,69	0,61	0,77
Femmes												
6 à 11 ans	1,25	1,08	1,43	F	.	.	0,45	0,39	0,52	0,87	0,77	0,97
12 à 19 ans	1,14	0,99	1,32	0,25 ^E	0,15	0,35	0,39 ^E	0,24	0,54	0,68	0,55	0,80
20 à 39 ans	1,02	0,88	1,18	0,28 ^E	0,17	0,38	0,42	0,31	0,53	0,65	0,53	0,78
40 à 59 ans	0,86	0,77	0,96	.	.	.	0,29	0,21	0,38	0,57	0,45	0,69
60 à 79 ans	0,86	0,77	0,96	.	.	.	0,31	0,23	0,39	0,56	0,48	0,65
3 à 79 ans	0,97	0,92	1,03	0,22	0,19	0,25	0,35	0,31	0,39	0,63	0,57	0,69
6 à 79 ans	0,96	0,90	1,01	0,21	0,17	0,26	0,34	0,30	0,38	0,62	0,56	0,67

	Iode											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,70	1,18	2,22	2,95	2,58	3,32	4,10	3,40	4,80	5,08 ^E	2,95	7,22
6 à 11 ans	1,49	1,34	1,64	2,67	2,20	3,15	4,19	3,51	4,87	5,15	4,34	5,95
12 à 19 ans	1,28	1,08	1,49	2,17	1,92	2,42	3,07	2,67	3,46	4,05	3,40	4,70
20 à 39 ans	0,98	0,89	1,07	1,58	1,38	1,77	2,64	2,00	3,28	3,75	3,07	4,42
40 à 59 ans	0,96	0,89	1,03	1,37	1,23	1,51	2,73	2,17	3,29	3,78	3,03	4,53
60 à 79 ans	0,99	0,89	1,09	1,49	1,36	1,62	2,66	2,23	3,10	3,33	2,88	3,77
3 à 79 ans	1,06	1,01	1,11	1,66	1,55	1,77	2,94	2,65	3,23	3,88	3,58	4,17
6 à 79 ans	1,04	0,99	1,09	1,62	1,51	1,73	2,87	2,59	3,16	3,82	3,53	4,12
Hommes												
6 à 11 ans	1,70	1,48	1,92	3,11	2,48	3,73	4,83	4,06	5,60	5,69	4,73	6,65
12 à 19 ans	1,42	1,24	1,59	2,20	1,82	2,58	3,16	2,75	3,57	3,87	2,84	4,90
20 à 39 ans	1,06	0,90	1,23	1,58	1,36	1,79	2,58	1,87	3,28	3,24 ^E	2,03	4,44
40 à 59 ans	0,99	0,89	1,09	1,44	1,22	1,66	2,95	2,50	3,40	3,88	2,89	4,87
60 à 79 ans	1,03	0,91	1,14	1,65	1,39	1,91	3,01	2,56	3,46	3,78	3,22	4,34
3 à 79 ans	1,11	1,05	1,16	1,73	1,56	1,90	3,08	2,74	3,42	4,20	3,59	4,81
6 à 79 ans	1,10	1,04	1,16	1,70	1,55	1,85	3,02	2,71	3,34	4,09	3,48	4,69
Femmes												
6 à 11 ans	1,26	1,08	1,44	2,22	1,73	2,72	3,27	2,74	3,80	3,81	3,23	4,40
12 à 19 ans	1,18	0,97	1,39	2,13	1,87	2,39	2,88	2,33	3,44	4,22	3,44	5,00
20 à 39 ans	0,97	0,88	1,06	1,57	1,13	2,02	2,74 ^E	1,63	3,85	3,76	3,18	4,35
40 à 59 ans	0,95	0,85	1,05	1,34	1,21	1,48	2,32	1,64	3,01	3,39	2,37	4,40
60 à 79 ans	0,93	0,80	1,05	1,42	1,27	1,57	2,26	1,87	2,65	2,94	2,39	3,50
3 à 79 ans	1,00	0,94	1,07	1,56	1,44	1,69	2,69	2,33	3,04	3,75	3,38	4,11
6 à 79 ans	0,99	0,93	1,04	1,52	1,41	1,63	2,65	2,37	2,94	3,74	3,33	4,16

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 53
Distribution du ratio d'iode sur la créatinine pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Ratio de l'iode à la créatinine											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/mmol											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	353	314	395	109	84	134	157	135	180	232	211	254
6 à 11 ans	194	175	216	70	61	78	86	78	94	120	106	134
12 à 19 ans	110	102	119	37	31	42	46	39	52	72	65	78
20 à 39 ans	98	89	107	35	32	38	42	38	46	58	54	62
40 à 59 ans	104	96	113	34	26	41	42	37	46	61	56	67
60 à 79 ans	130	120	141	43	38	47	54	48	60	80	72	88
3 à 79 ans	116	110	122	36	33	40	44	41	47	67	64	69
6 à 79 ans	112	106	118	36	33	39	44	41	47	66	62	69
Hommes												
6 à 11 ans	218	192	248	76	69	83	89	78	100	132	114	149
12 à 19 ans	109	100	119	39	32	46	46	38	54	70	60	80
20 à 39 ans	82	75	89	36	33	38	40	37	44	54	49	58
40 à 59 ans	90	79	102	30	20	40	39	34	44	54	45	63
60 à 79 ans	113	105	122	37	31	42	51	44	58	71	63	80
3 à 79 ans	104	98	110	36	32	40	42	39	44	61	57	64
6 à 79 ans	99	94	105	35	31	40	42	39	45	60	57	64
Femmes												
6 à 11 ans	171	152	193	59 ^E	34	84	77	66	88	111	97	125
12 à 19 ans	112	101	123	35	28	41	44	38	51	72	64	79
20 à 39 ans	116	98	136	35	28	42	46	39	53	62	49	75
40 à 59 ans	121	108	137	35	23	47	52	42	62	74	66	83
60 à 79 ans	148	134	163	45	36	54	59	46	72	91	78	104
3 à 79 ans	130	121	140	39	33	44	50	44	56	76	71	81
6 à 79 ans	126	117	136	38	33	44	49	44	54	76	71	81

	Ratio de l'iode à la créatinine											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	umol/mmol											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	337	283	390	579	449	709	856	716	995	1,037 ^E	662	1412
6 à 11 ans	191	164	218	312	265	358	503	421	585	639	536	742
12 à 19 ans	109	97	120	170	152	189	262	241	283	347	291	403
20 à 39 ans	88	77	99	155	125	185	255	195	314	319	278	360
40 à 59 ans	103	94	112	167	148	185	285	220	351	369	291	447
60 à 79 ans	128	116	139	213	192	233	322	289	355	386	351	420
3 à 79 ans	111	102	119	193	178	208	312	292	333	415	367	463
6 à 79 ans	107	99	115	183	168	198	293	276	311	381	353	409
Hommes												
6 à 11 ans	205	171	239	371	302	440	546	435	658	665	540	790
12 à 19 ans	107	96	117	166	142	190	244	204	284	352	275	429
20 à 39 ans	73	62	84	120	92	148	199	162	236	233	165	302
40 à 59 ans	83	64	102	158	130	186	227	159	295	301	243	359
60 à 79 ans	111	101	122	174	154	194	261	231	292	312	244	380
3 à 79 ans	97	90	104	170	157	183	286	265	306	377	344	409
6 à 79 ans	93	85	101	162	150	175	259	230	289	356	324	388
Femmes												
6 à 11 ans	178	152	204	252	203	302	398	321	475	529	443	615
12 à 19 ans	111	95	128	177	155	199	274	249	300	330	269	392
20 à 39 ans	113	85	141	200	165	236	293	254	333	356	248	464
40 à 59 ans	118	104	133	181	152	211	312	222	401	439 ^E	223	655
60 à 79 ans	142	116	169	241	215	268	370	332	408	418	369	467
3 à 79 ans	127	113	141	210	195	225	333	299	366	460	371	549
6 à 79 ans	122	108	136	205	189	220	317	286	347	408	343	472

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 54
Distribution de l'hormone parathyroïdienne mesurée dans le plasma pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Hormone parathyroïdienne											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile		10 ^e percentile			25 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	pmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,47	1,34	1,61	0,80	0,70	0,89	0,90	0,80	0,99	1,16	1,01	1,31
6 à 11 ans	1,48	1,39	1,59	0,79	0,69	0,89	0,90	0,87	0,94	1,12	1,05	1,19
12 à 19 ans	1,73	1,63	1,83	0,82	0,75	0,89	0,97	0,87	1,08	1,25	1,15	1,35
20 à 39 ans	1,86	1,74	1,98	0,91	0,77	1,05	1,09	1,00	1,19	1,39	1,27	1,51
40 à 59 ans	2,14	1,94	2,37	1,08	0,89	1,27	1,22	1,04	1,39	1,63	1,42	1,84
60 à 79 ans	2,37	2,24	2,49	1,02	0,90	1,15	1,20	1,08	1,32	1,72	1,63	1,82
3 à 79 ans	1,98	1,88	2,08	0,92	0,86	0,97	1,10	1,05	1,15	1,43	1,36	1,49
6 à 79 ans	1,99	1,89	2,10	0,93	0,86	0,99	1,11	1,06	1,17	1,44	1,37	1,51
Hommes												
6 à 11 ans	1,41	1,27	1,57	0,76	0,60	0,92	0,88	0,84	0,93	1,08	0,98	1,19
12 à 19 ans	1,92	1,78	2,06	0,86	0,72	0,99	1,10	0,95	1,25	1,39	1,28	1,51
20 à 39 ans	1,97	1,78	2,17	0,91	0,68	1,15	1,12	0,93	1,31	1,48	1,37	1,60
40 à 59 ans	2,23	1,97	2,52	0,98	0,65	1,32	1,26	0,98	1,54	1,70	1,44	1,96
60 à 79 ans	2,50	2,35	2,66	1,11	0,98	1,24	1,27	1,12	1,41	1,77	1,63	1,91
3 à 79 ans	2,07	1,95	2,20	0,91	0,84	0,99	1,12	1,03	1,21	1,48	1,40	1,56
6 à 79 ans	2,09	1,97	2,22	0,92	0,83	1,01	1,15	1,06	1,23	1,49	1,40	1,58
Femmes												
6 à 11 ans	1,56	1,45	1,69	0,82	0,73	0,90	0,94	0,89	1,00	1,18	1,11	1,26
12 à 19 ans	1,55	1,43	1,68	0,79	0,74	0,84	0,92	0,79	1,04	1,17	1,02	1,31
20 à 39 ans	1,75	1,65	1,86	0,90	0,73	1,07	1,06	0,95	1,17	1,29	1,16	1,43
40 à 59 ans	2,06	1,86	2,28	1,13	1,02	1,23	1,20	1,06	1,33	1,59	1,36	1,81
60 à 79 ans	2,25	2,08	2,43	0,97	0,77	1,17	1,18	1,06	1,31	1,70	1,58	1,82
3 à 79 ans	1,89	1,80	1,99	0,92	0,85	1,00	1,09	1,05	1,13	1,39	1,32	1,46
6 à 79 ans	1,90	1,81	2,00	0,93	0,85	1,01	1,09	1,05	1,14	1,39	1,33	1,46

	Hormone parathyroïdienne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	pmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,41	1,28	1,54	1,84	1,63	2,06	2,40	2,00	2,81	3,12	2,65	3,58
6 à 11 ans	1,46	1,35	1,57	1,95	1,77	2,13	2,72	2,30	3,13	2,99	2,58	3,40
12 à 19 ans	1,68	1,54	1,82	2,29	2,20	2,39	3,07	2,71	3,42	3,63	3,17	4,09
20 à 39 ans	1,84	1,67	2,01	2,47	2,26	2,68	3,10	2,92	3,28	3,77	3,31	4,23
40 à 59 ans	2,19	1,95	2,42	2,81	2,58	3,05	3,69	3,26	4,11	4,22	3,75	4,69
60 à 79 ans	2,37	2,24	2,49	3,20	2,98	3,42	4,30	3,79	4,81	5,97	4,57	7,37
3 à 79 ans	1,99	1,87	2,11	2,69	2,54	2,84	3,50	3,26	3,73	4,15	3,81	4,48
6 à 79 ans	2,00	1,87	2,12	2,70	2,56	2,85	3,51	3,26	3,75	4,17	3,83	4,51
Hommes												
6 à 11 ans	1,35	1,22	1,48	1,78	1,48	2,08	2,46	1,67	3,26	3,00	2,21	3,79
12 à 19 ans	1,90	1,77	2,03	2,54	2,25	2,83	3,55	2,92	4,18	4,40	2,88	5,91
20 à 39 ans	1,95	1,69	2,21	2,66	2,36	2,96	3,15	2,90	3,40	3,95	3,43	4,48
40 à 59 ans	2,27	2,01	2,54	2,89	2,57	3,21	3,84	3,44	4,25	4,52	3,61	5,43
60 à 79 ans	2,51	2,37	2,64	3,39	3,13	3,65	4,70	3,96	5,45	6,03 ^E	3,73	8,33
3 à 79 ans	2,07	1,91	2,22	2,79	2,63	2,95	3,69	3,46	3,92	4,49	3,82	5,15
6 à 79 ans	2,10	1,94	2,25	2,80	2,64	2,97	3,71	3,48	3,94	4,50	3,81	5,19
Femmes												
6 à 11 ans	1,54	1,41	1,66	2,04	1,79	2,29	2,76	2,47	3,05	2,90	2,46	3,34
12 à 19 ans	1,52	1,39	1,66	2,07	1,88	2,25	2,67	2,28	3,07	3,11	2,62	3,60
20 à 39 ans	1,75	1,56	1,94	2,30	2,13	2,47	2,93	2,77	3,09	3,44	2,96	3,93
40 à 59 ans	2,09	1,82	2,35	2,77	2,48	3,06	3,40	2,89	3,91	4,12	3,59	4,66
60 à 79 ans	2,23	2,10	2,37	2,98	2,69	3,28	3,99	3,60	4,38	5,69	3,67	7,70
3 à 79 ans	1,89	1,74	2,04	2,54	2,38	2,69	3,29	3,03	3,56	3,92	3,55	4,29
6 à 79 ans	1,91	1,76	2,07	2,55	2,39	2,70	3,30	3,03	3,56	3,93	3,57	4,29

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 55
Distribution de la vitamine B12 mesurée dans le sérum pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Vitamine B12											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	pmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	521	483	561	282	236	327	303	226	381	426	350	503
6 à 11 ans	471	450	492	251	231	270	278	239	316	379	352	407
12 à 19 ans	331	316	347	162	144	180	195	179	212	243	223	263
20 à 39 ans	308	290	327	152	140	164	170	151	189	222	202	242
40 à 59 ans	316	298	336	147	133	160	168	153	182	229	210	248
60 à 79 ans	303	282	326	148	126	170	171	155	188	212	198	226
3 à 79 ans	323	310	337	152	142	162	177	164	191	230	218	243
6 à 79 ans	320	306	334	152	142	162	176	162	190	229	216	241
Hommes												
6 à 11 ans	480	453	508	259	235	283	278	219	338	401	368	435
12 à 19 ans	336	315	359	181	158	204	210	185	235	262	229	295
20 à 39 ans	311	284	340	157	133	182	179	149	210	227	198	256
40 à 59 ans	310	290	330	146	136	157	162	144	179	229	209	249
60 à 79 ans	282	259	307	147	119	175	169	149	190	206	189	223
3 à 79 ans	319	305	334	151	141	162	176	160	192	232	218	245
6 à 79 ans	315	301	330	150	140	161	176	159	192	231	217	244
Femmes												
6 à 11 ans	462	438	487	236	202	269	277	244	310	361	329	393
12 à 19 ans	325	303	349	150	130	169	174	149	199	229	205	254
20 à 39 ans	305	285	327	148	137	159	162	142	182	210	192	229
40 à 59 ans	323	299	350	158	126	191	179	164	194	230	206	254
60 à 79 ans	326	301	353	150	121	179	175	154	197	225	203	246
3 à 79 ans	327	311	344	152	140	165	178	164	192	228	213	243
6 à 79 ans	324	309	341	152	140	165	177	163	191	225	211	239

	Vitamine B12											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	pmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	578	529	626	682	641	723	718	705	730	728	715	742
6 à 11 ans	518	469	567	616	596	636	677	661	693	714	697	731
12 à 19 ans	330	309	351	460	435	485	560	543	576	636	617	656
20 à 39 ans	316	284	348	428	402	454	524	489	558	596	551	640
40 à 59 ans	311	279	343	450	401	500	602	549	656	654	616	692
60 à 79 ans	300	279	322	434	401	467	595	575	615	654	634	674
3 à 79 ans	328	308	347	464	439	490	599	572	625	658	638	678
6 à 79 ans	323	304	342	453	430	476	591	565	617	652	630	674
Hommes												
6 à 11 ans	542	486	598	615	592	638	670	655	686	695	666	723
12 à 19 ans	334	308	359	455	422	488	549	528	571	596	551	642
20 à 39 ans	319	270	368	427	385	470	521	479	563	583	526	640
40 à 59 ans	301	271	331	432	391	472	588	520	656	653	608	698
60 à 79 ans	278	251	306	382	345	419	521	483	558	615	566	664
3 à 79 ans	320	298	342	446	421	470	586	551	620	654	624	684
6 à 79 ans	316	295	338	437	416	457	572	539	605	644	613	674
Femmes												
6 à 11 ans	493	445	541	620	586	654	689	656	722	719	699	739
12 à 19 ans	322	290	355	468	420	515	592	552	633	654	620	688
20 à 39 ans	310	259	360	428	387	469	543	494	591	626	566	686
40 à 59 ans	321	269	374	488	423	553	602	545	659	658	594	721
60 à 79 ans	325	300	351	491	429	553	615	580	650	687	639	734
3 à 79 ans	336	310	363	483	447	518	611	579	644	665	644	687
6 à 79 ans	331	305	357	474	438	510	603	570	636	660	637	683

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 56
Distribution de la vitamine D [(25-OH)] mesurée dans le plasma pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Vitamine D [(25-OH)]											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nmol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	73,9	69,0	78,8	41,2	33,2	49,3	48,3	42,7	53,8	58,2	52,8	63,6
6 à 11 ans	67,3	61,7	72,9	29,4	20,4	38,4	39,3	29,3	49,3	50,6	45,1	56,2
12 à 19 ans	63,8	57,1	70,6	22,9	14,9	30,9	30,9	22,1	39,8	47,5	37,9	57,0
20 à 39 ans	60,4	55,0	65,8	19,9	15,2	24,6	25,2	19,7	30,7	38,3	32,5	44,1
40 à 59 ans	62,1	58,4	65,7	24,9	18,9	30,9	30,9	26,9	34,8	45,4	38,6	52,2
60 à 79 ans	69,9	66,4	73,4	27,2	20,5	33,9	35,2	26,8	43,6	50,0	45,5	54,5
3 à 79 ans	63,8	59,7	67,9	23,2	18,6	27,8	30,1	24,8	35,4	44,5	39,0	50,1
6 à 79 ans	63,5	59,3	67,6	23,1	18,6	27,6	30,0	24,7	35,3	44,2	38,5	49,8
Hommes												
6 à 11 ans	71,8	65,7	77,8	37,3	25,3	49,3	45,2	37,6	52,8	54,5	48,6	60,3
12 à 19 ans	62,2	55,2	69,2	25,1	16,7	33,5	31,1	22,3	39,9	46,9	35,8	58,1
20 à 39 ans	54,8	49,6	60,1	16,9	12,0	21,7	21,2	16,0	26,5	32,4	23,7	41,0
40 à 59 ans	58,7	53,1	64,3	25,2	18,9	31,5	30,4	25,7	35,1	43,4	33,5	53,3
60 à 79 ans	67,7	63,7	71,6	27,5	19,4	35,6	35,1	26,6	43,6	48,3	43,1	53,5
3 à 79 ans	60,8	56,2	65,3	21,4	16,1	26,6	27,5	21,7	33,3	42,5	35,3	49,7
6 à 79 ans	60,3	55,7	64,9	21,3	16,0	26,5	27,0	21,1	32,9	41,5	34,3	48,7
Femmes												
6 à 11 ans	62,6	57,1	68,2	25,9	17,0	34,8	32,6	22,7	42,6	47,9	41,6	54,1
12 à 19 ans	65,6	57,8	73,3	17,8 ^E	8,1	27,6	28,4 ^E	15,7	41,1	47,7	39,0	56,5
20 à 39 ans	65,9	58,7	73,1	25,5	18,3	32,8	33,3	26,4	40,3	42,9	34,8	51,1
40 à 59 ans	65,4	62,3	68,6	24,7	18,2	31,2	31,2	26,2	36,2	47,5	41,4	53,7
60 à 79 ans	71,9	67,8	76,1	27,0	18,8	35,2	35,3	25,3	45,2	52,3	47,1	57,5
3 à 79 ans	66,8	62,7	70,8	24,9	19,3	30,5	32,4	26,5	38,4	47,1	41,3	53,0
6 à 79 ans	66,7	62,6	70,7	24,9	19,3	30,4	32,2	26,1	38,2	47,0	41,2	52,8

	Vitamine D [(25-OH)]											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nmol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	72,0	67,0	77,0	85,8	80,7	91,0	103,7	94,0	113,3	111,9	96,5	127,2
6 à 11 ans	65,9	61,5	70,4	80,2	75,6	84,9	95,8	87,7	103,9	107,9	98,8	117,0
12 à 19 ans	62,1	54,9	69,3	77,6	69,7	85,4	96,1	88,7	103,5	111,7	98,0	125,4
20 à 39 ans	56,5	49,4	63,6	77,6	68,6	86,6	98,0	92,4	103,5	114,4	102,3	126,5
40 à 59 ans	60,4	55,7	65,1	75,3	72,1	78,6	93,5	89,6	97,4	104,2	100,0	108,3
60 à 79 ans	68,1	65,3	70,8	86,3	82,5	90,1	107,4	101,1	113,7	117,6	112,3	123,0
3 à 79 ans	61,8	57,2	66,4	79,1	74,1	84,0	98,0	94,0	101,9	111,2	105,6	116,9
6 à 79 ans	61,3	56,6	66,1	78,9	73,9	83,9	97,9	94,0	101,9	111,0	105,3	116,6
Hommes												
6 à 11 ans	68,6	63,5	73,6	83,3	74,0	92,5	105,5	94,1	116,9	113,6	102,9	124,3
12 à 19 ans	60,8	53,5	68,2	75,0	67,4	82,7	90,5	82,4	98,6	99,4	84,5	114,4
20 à 39 ans	51,7	45,5	57,8	71,8	64,2	79,4	93,9	85,6	102,2	111,2	93,7	128,6
40 à 59 ans	56,5	49,7	63,2	73,1	67,5	78,6	86,3	81,7	90,8	97,0	90,1	103,8
60 à 79 ans	65,2	62,0	68,5	83,1	79,5	86,6	102,0	94,5	109,4	113,3	106,3	120,4
3 à 79 ans	58,9	53,8	64,1	76,3	72,4	80,3	93,9	90,8	97,0	106,8	100,5	113,2
6 à 79 ans	58,3	53,1	63,5	76,0	71,9	80,1	93,7	90,5	96,9	105,9	99,9	111,9
Femmes												
6 à 11 ans	62,1	55,8	68,3	76,6	69,9	83,3	89,8	82,4	97,2	96,2	91,4	101,1
12 à 19 ans	64,5	55,9	73,0	80,9	70,5	91,3	101,1	89,5	112,7	117,7	102,9	132,5
20 à 39 ans	62,6	52,6	72,5	85,0	75,4	94,5	101,0	93,2	108,9	115,6	102,2	129,0
40 à 59 ans	62,9	57,7	68,0	78,1	71,1	85,1	99,3	93,4	105,3	110,0	98,7	121,4
60 à 79 ans	69,4	66,1	72,7	88,4	82,8	94,0	108,9	101,5	116,4	118,4	111,7	125,0
3 à 79 ans	64,6	59,8	69,3	83,7	78,4	89,0	101,7	97,8	105,6	116,3	109,5	123,0
6 à 79 ans	64,5	59,7	69,3	83,7	78,2	89,2	101,8	97,8	105,7	116,4	109,7	123,1

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 57
Distribution du bisphénol A mesuré dans l'urine pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Bisphénol A											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,4	1,1	1,8	.	.	.	0,3 ^E	0,1	0,5	0,8	0,5	0,99
6 à 11 ans	1,4	1,1	1,7	.	.	.	0,3 ^E	0,09	0,4	0,7	0,5	0,85
12 à 19 ans	1,3	1,1	1,6	.	.	.	0,4	0,2	0,5	0,80	0,6	0,97
20 à 39 ans	1,3	1,1	1,5	0,2 ^E	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,5	0,7
40 à 59 ans	1,2	0,97	1,5	.	.	.	0,3 ^E	0,1	0,4	0,6	0,4	0,84
60 à 79 ans	1,0	0,84	1,3	.	.	.	0,2 ^E	0,1	0,3	0,5 ^E	0,3	0,7
3 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	.	.	.	0,3	0,2	0,3	0,6	0,6	0,7
6 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	.	.	.	0,3	0,2	0,3	0,6	0,6	0,7
Hommes												
6 à 11 ans	1,3	1,0	1,8	.	.	.	F	.	.	0,7	0,6	0,89
12 à 19 ans	1,5	1,1	2,0	.	.	.	0,5 ^E	0,3	0,7	0,81	0,6	1,0
20 à 39 ans	1,4	0,99	1,9	X	.	.	F	.	.	0,7	0,5	0,89
40 à 59 ans	1,2	0,94	1,6	X	.	.	F	.	.	0,6 ^E	0,3	0,90
60 à 79 ans	1,1	0,83	1,5	X	.	.	0,3 ^E	0,09	0,4	0,5 ^E	0,3	0,8
3 à 79 ans	1,3	1,1	1,5	.	.	.	0,3	0,2	0,4	0,7	0,6	0,8
6 à 79 ans	1,3	1,1	1,4	.	.	.	0,3^E	0,2	0,4	0,7	0,5	0,8
Femmes												
6 à 11 ans	1,4	1,0	1,8	.	.	.	F	.	.	0,6 ^E	0,3	0,95
12 à 19 ans	1,2	0,99	1,5	.	.	.	0,3 ^E	0,2	0,5	0,8	0,5	1,0
20 à 39 ans	1,2	0,99	1,5	X	.	.	0,3 ^E	0,2	0,5	0,6	0,4	0,7
40 à 59 ans	1,2 ^E	0,81	1,7	X	.	.	F	.	.	0,7 ^E	0,3	1,0
60 à 79 ans	0,98	0,7	1,4	X	0,5 ^E	0,3	0,7
3 à 79 ans	1,2	1,0	1,3	.	.	.	0,3	0,2	0,3	0,6	0,5	0,7
6 à 79 ans	1,2	1,0	1,3	.	.	.	0,3	0,2	0,3	0,6	0,5	0,7

	Bisphénol A											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,3	1,1	1,5	2,6	1,8	3,4	5,4 ^E	1,9	9,0	9,9 ^E	5,5	14
6 à 11 ans	1,3	0,94	1,7	2,3	1,6	3,0	4,6 ^E	2,6	6,6	F	.	.
12 à 19 ans	1,3	0,99	1,6	2,5	2,0	2,9	4,4	2,9	5,9	7,6 ^E	4,3	11
20 à 39 ans	1,3	0,92	1,6	2,4	1,8	3,1	4,6	3,7	5,5	F	.	.
40 à 59 ans	1,2	0,98	1,4	2,2	1,7	2,7	4,3 ^E	2,7	6,0	6,7 ^E	2,6	11
60 à 79 ans	0,99	0,8	1,2	2,3	1,5	3,1	4,4 ^E	2,5	6,2	6,3	4,4	8,1
3 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	2,4	2,1	2,6	4,5	4,0	5,0	6,7	4,8	8,6
6 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	2,4	2,1	2,6	4,5	3,9	5,0	6,7	4,8	8,5
Hommes												
6 à 11 ans	1,4 ^E	0,86	1,9	2,3 ^E	1,1	3,5	4,4	3,2	5,6	5,5 ^E	2,1	8,8
12 à 19 ans	1,4	1,0	1,7	2,6 ^E	1,4	3,8	6,1 ^E	3,2	8,9	7,9 ^E	4,6	11
20 à 39 ans	1,4	1,1	1,8	2,5 ^E	1,4	3,7	F	.	.	X	.	.
40 à 59 ans	1,2	0,91	1,6	2,3	1,6	3,0	4,4	3,2	5,5	X	.	.
60 à 79 ans	1,1 ^E	0,7	1,5	2,4	1,8	3,1	4,3 ^E	2,4	6,3	X	.	.
3 à 79 ans	1,3	1,1	1,5	2,5	2,2	2,8	4,6	4,1	5,2	7,9^E	4,3	11
6 à 79 ans	1,3	1,1	1,5	2,5	2,1	2,8	4,6	4,1	5,2	7,3^E	4,0	11
Femmes												
6 à 11 ans	1,3	0,87	1,6	2,2 ^E	1,3	3,1	F	.	.	F	.	.
12 à 19 ans	1,2	0,85	1,5	2,4	1,8	3,0	3,4	3,0	3,9	4,3 ^E	2,6	6,1
20 à 39 ans	1,1 ^E	0,7	1,6	2,4	1,7	3,1	4,1	2,9	5,3	X	.	.
40 à 59 ans	1,2	0,8	1,5	2,0 ^E	1,2	2,8	F	.	.	X	.	.
60 à 79 ans	0,98	0,7	1,3	2,2 ^E	1,1	3,4	4,7 ^E	2,1	7,3	X	.	.
3 à 79 ans	1,1	0,98	1,3	2,3	2,0	2,7	4,1	3,0	5,1	6,6	4,9	8,4
6 à 79 ans	1,1	0,98	1,3	2,3	1,9	2,7	4,0	2,9	5,2	6,6	4,8	8,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 58
Distribution du plomb (µmol/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Plomb											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,045	0,042	0,048	0,020	0,017	0,023	0,025	0,021	0,028	0,032	0,029	0,036
6 à 11 ans	0,038	0,036	0,040	0,018	0,017	0,020	0,021	0,018	0,024	0,027	0,025	0,030
12 à 19 ans	0,034	0,033	0,036	0,017	0,015	0,018	0,019	0,017	0,021	0,025	0,023	0,027
20 à 39 ans	0,047	0,042	0,053	0,020	0,017	0,024	0,024	0,020	0,027	0,033	0,029	0,037
40 à 59 ans	0,069	0,065	0,073	0,027	0,024	0,030	0,034	0,030	0,038	0,048	0,044	0,052
60 à 79 ans	0,090	0,086	0,094	0,041	0,037	0,044	0,050	0,046	0,055	0,063	0,058	0,068
3 à 79 ans	0,057	0,054	0,060	0,022	0,020	0,024	0,026	0,024	0,028	0,037	0,034	0,040
6 à 79 ans	0,058	0,055	0,061	0,022	0,020	0,024	0,026	0,024	0,028	0,037	0,035	0,040
Hommes												
6 à 11 ans	0,038	0,035	0,041	0,019	0,016	0,021	0,021	0,017	0,025	0,028	0,024	0,031
12 à 19 ans	0,040	0,039	0,042	0,021	0,020	0,022	0,023	0,022	0,025	0,030	0,028	0,032
20 à 39 ans	0,055	0,049	0,061	0,023	0,019	0,027	0,029	0,021	0,036	0,041	0,035	0,047
40 à 59 ans	0,078	0,073	0,083	0,034	0,027	0,041	0,041	0,037	0,044	0,055	0,050	0,059
60 à 79 ans	0,099	0,093	0,11	0,046	0,041	0,051	0,055	0,050	0,060	0,069	0,062	0,077
3 à 79 ans	0,064	0,061	0,067	0,024	0,022	0,027	0,030	0,027	0,033	0,043	0,041	0,045
6 à 79 ans	0,065	0,061	0,068	0,024	0,022	0,027	0,030	0,027	0,033	0,043	0,041	0,045
Femmes												
6 à 11 ans	0,038	0,035	0,041	0,018	0,01	0,021	0,021	0,018	0,024	0,027	0,024	0,030
12 à 19 ans	0,029	0,027	0,031	0,015 ^E	0,009	0,022	0,017	0,016	0,019	0,022	0,019	0,024
20 à 39 ans	0,041	0,036	0,047	0,018	0,01	0,025	0,022	0,017	0,027	0,029	0,026	0,032
40 à 59 ans	0,061	0,056	0,066	0,025	0,023	0,027	0,029	0,025	0,033	0,041	0,038	0,045
60 à 79 ans	0,083	0,078	0,088	0,037	0,032	0,041	0,045	0,038	0,051	0,060	0,056	0,064
3 à 79 ans	0,051	0,048	0,054	0,019	0,018	0,021	0,024	0,022	0,026	0,033	0,030	0,035
6 à 79 ans	0,051	0,048	0,055	0,019	0,017	0,022	0,024	0,022	0,026	0,033	0,030	0,035

	Plomb											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,045	0,041	0,049	0,056	0,051	0,062	0,079	0,071	0,088	0,099	0,086	0,11
6 à 11 ans	0,036	0,033	0,038	0,050	0,045	0,056	0,069	0,059	0,079	0,085	0,075	0,096
12 à 19 ans	0,033	0,031	0,035	0,046	0,043	0,049	0,059	0,056	0,061	0,078	0,064	0,093
20 à 39 ans	0,046	0,042	0,050	0,065	0,060	0,071	0,091	0,074	0,11	0,11	0,077	0,14
40 à 59 ans	0,067	0,063	0,071	0,098	0,088	0,11	0,13	0,11	0,14	0,16	0,14	0,17
60 à 79 ans	0,086	0,082	0,090	0,12	0,12	0,13	0,17	0,16	0,18	0,20	0,19	0,22
3 à 79 ans	0,056	0,054	0,059	0,083	0,078	0,089	0,12	0,11	0,13	0,15	0,14	0,17
6 à 79 ans	0,057	0,054	0,059	0,085	0,079	0,090	0,12	0,11	0,13	0,16	0,14	0,17
Hommes												
6 à 11 ans	0,036	0,032	0,040	0,052	0,046	0,058	0,067	0,057	0,076	0,080	0,070	0,091
12 à 19 ans	0,038	0,035	0,041	0,052	0,049	0,054	0,069	0,056	0,082	0,089	0,075	0,10
20 à 39 ans	0,051	0,046	0,057	0,073	0,066	0,081	0,10	0,086	0,12	0,11 ^E	0,068	0,16
40 à 59 ans	0,076	0,069	0,083	0,10	0,090	0,11	0,15	0,13	0,17	0,17	0,11	0,23
60 à 79 ans	0,096	0,088	0,10	0,13	0,12	0,14	0,18	0,17	0,19	0,20	0,19	0,22
3 à 79 ans	0,062	0,058	0,066	0,093	0,084	0,10	0,13	0,12	0,15	0,17	0,15	0,18
6 à 79 ans	0,063	0,059	0,067	0,094	0,085	0,10	0,14	0,12	0,15	0,17	0,15	0,18
Femmes												
6 à 11 ans	0,034	0,030	0,038	0,048	0,041	0,055	0,075	0,059	0,090	0,087	0,074	0,099
12 à 19 ans	0,028	0,025	0,031	0,037	0,034	0,041	0,049	0,045	0,054	0,059	0,052	0,066
20 à 39 ans	0,040	0,035	0,045	0,058	0,048	0,067	0,072	0,062	0,083	0,091	0,067	0,12
40 à 59 ans	0,062	0,056	0,068	0,083	0,070	0,095	0,11	0,10	0,13	0,13	0,12	0,14
60 à 79 ans	0,079	0,073	0,086	0,11	0,099	0,12	0,15	0,13	0,18	0,20	0,17	0,23
3 à 79 ans	0,051	0,047	0,054	0,073	0,067	0,079	0,11	0,098	0,12	0,13	0,12	0,14
6 à 79 ans	0,051	0,047	0,055	0,074	0,068	0,080	0,11	0,099	0,12	0,14	0,13	0,15

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 59
Distribution du plomb (µg/dL) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Plomb											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/dL												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,93	0,87	1,0	0,41	0,34	0,48	0,51	0,44	0,58	0,67	0,60	0,73
6 à 11 ans	0,79	0,74	0,84	0,38	0,35	0,40	0,43	0,36	0,49	0,57	0,52	0,62
12 à 19 ans	0,71	0,68	0,75	0,34	0,31	0,38	0,39	0,35	0,43	0,52	0,48	0,55
20 à 39 ans	0,98	0,88	1,1	0,42	0,34	0,49	0,50	0,43	0,57	0,68	0,60	0,76
40 à 59 ans	1,4	1,3	1,5	0,57	0,50	0,63	0,70	0,61	0,78	0,98	0,92	1,0
60 à 79 ans	1,9	1,8	1,9	0,85	0,77	0,92	1,0	0,94	1,1	1,3	1,2	1,3
3 à 79 ans	1,2	1,1	1,2	0,46	0,41	0,51	0,54	0,50	0,59	0,77	0,71	0,83
6 à 79 ans	1,2	1,1	1,3	0,46	0,42	0,51	0,54	0,50	0,59	0,77	0,72	0,83
Hommes												
6 à 11 ans	0,79	0,73	0,86	0,38	0,34	0,43	0,43	0,34	0,52	0,57	0,50	0,64
12 à 19 ans	0,84	0,8	0,87	0,43	0,40	0,46	0,49	0,45	0,52	0,61	0,57	0,65
20 à 39 ans	1,1	1,0	1,3	0,48	0,40	0,57	0,60	0,45	0,74	0,85	0,74	0,96
40 à 59 ans	1,6	1,5	1,7	0,70	0,56	0,85	0,84	0,77	0,92	1,1	1,0	1,2
60 à 79 ans	2,0	1,9	2,2	0,94	0,86	1,0	1,1	1,0	1,2	1,4	1,2	1,5
3 à 79 ans	1,3	1,3	1,4	0,50	0,45	0,55	0,62	0,56	0,67	0,88	0,84	0,92
6 à 79 ans	1,3	1,3	1,4	0,51	0,45	0,56	0,62	0,56	0,68	0,89	0,85	0,93
Femmes												
6 à 11 ans	0,78	0,72	0,84	0,37	0,3	0,44	0,43	0,35	0,50	0,55	0,49	0,61
12 à 19 ans	0,60	0,56	0,65	0,32 ^E	0,2	0,45	0,35	0,32	0,39	0,45	0,40	0,51
20 à 39 ans	0,85	0,74	0,97	0,38	0,3	0,51	0,46	0,35	0,57	0,60	0,54	0,67
40 à 59 ans	1,3	1,2	1,4	0,52	0,48	0,57	0,60	0,52	0,68	0,85	0,78	0,93
60 à 79 ans	1,7	1,6	1,8	0,76	0,67	0,85	0,92	0,82	1,0	1,2	1,1	1,3
3 à 79 ans	1,1	1,0	1,1	0,40	0,36	0,44	0,50	0,46	0,54	0,67	0,62	0,72
Age 6 to 79	1,1	1,0	1,1	0,40	0,36	0,44	0,50	0,46	0,54	0,67	0,63	0,72

	Plomb											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/dL												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,93	0,86	1,0	1,2	1,1	1,3	1,6	1,4	1,8	2,1	1,8	2,4
6 à 11 ans	0,74	0,67	0,8	1,0	0,90	1,1	1,4	1,2	1,6	1,7	1,5	1,9
12 à 19 ans	0,68	0,64	0,72	0,94	0,88	1,0	1,2	1,1	1,2	1,6	1,3	1,8
20 à 39 ans	0,94	0,87	1,0	1,3	1,2	1,4	1,8	1,5	2,1	2,2	1,6	2,9
40 à 59 ans	1,3	1,3	1,4	2,0	1,7	2,2	2,7	2,4	3,0	3,2	2,9	3,5
60 à 79 ans	1,7	1,7	1,8	2,5	2,4	2,7	3,5	3,2	3,8	4,2	3,8	4,5
3 à 79 ans	1,1	1,1	1,2	1,7	1,6	1,8	2,5	2,3	2,7	3,2	2,9	3,4
6 à 79 ans	1,1	1,1	1,2	1,7	1,6	1,8	2,5	2,3	2,8	3,2	3,0	3,5
Hommes												
6 à 11 ans	0,75	0,67	0,82	1,0	0,92	1,2	1,3	1,1	1,5	1,6	1,4	1,9
12 à 19 ans	0,79	0,74	0,84	1,0	0,98	1,1	1,4	1,1	1,7	1,8	1,5	2,2
20 à 39 ans	1,0	0,92	1,1	1,5	1,3	1,7	2,1	1,7	2,5	2,4 ^E	1,5	3,3
40 à 59 ans	1,6	1,4	1,7	2,1	1,9	2,4	3,0	2,6	3,4	3,5	2,3	4,7
60 à 79 ans	2,0	1,8	2,2	2,8	2,6	2,9	3,7	3,4	3,9	4,2	3,8	4,5
3 à 79 ans	1,2	1,2	1,3	1,9	1,7	2,1	2,8	2,5	3,1	3,4	3,1	3,7
6 à 79 ans	1,2	1,2	1,3	1,9	1,7	2,1	2,8	2,5	3,2	3,4	3,1	3,7
Femmes												
6 à 11 ans	0,70	0,62	0,79	0,99	0,86	1,1	1,5	1,2	1,8	1,8	1,5	2,1
12 à 19 ans	0,58	0,52	0,63	0,77	0,70	0,85	1,0	0,91	1,1	1,2	1,0	1,3
20 à 39 ans	0,83	0,73	0,93	1,2	0,98	1,3	1,4	1,2	1,6	1,8	1,3	2,3
40 à 59 ans	1,2	1,1	1,3	1,7	1,4	1,9	2,4	2,1	2,7	2,8	2,5	3,0
60 à 79 ans	1,6	1,5	1,7	2,3	2,1	2,5	3,2	2,7	3,6	4,1	3,5	4,8
3 à 79 ans	1,0	0,96	1,1	1,5	1,4	1,6	2,3	2,1	2,5	2,8	2,6	3,0
6 à 79 ans	1,0	0,96	1,1	1,5	1,4	1,6	2,3	2,1	2,5	2,8	2,6	3,0

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 60
Distribution du mercure (nmol/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Mercure											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nmol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1	1	2
6 à 11 ans	1	1	2
12 à 19 ans	1	1	2
20 à 39 ans	3,2	2,4	4,3	1 ^E	0,5	2
40 à 59 ans	5,0	4,0	6,4	0,7	0,5	0,9	0,9	0,8	1	2,4	2	2,8
60 à 79 ans	5,6	4,3	7,3	F	.	.	1 ^E	0,6	1	3,0	2,1	3,9
3 à 79 ans	3,5	2,8	4,3	1 ^E	0,6	2
6 à 79 ans	3,6	2,9	4,5	1 ^E	0,7	2
Hommes												
6 à 11 ans	1	1	2
12 à 19 ans	1	1	2
20 à 39 ans	3,1	2,3	4,2	1 ^E	0,6	1
40 à 59 ans	6,2	4,6	8,4	0,8 ^E	0,5	1	1 ^E	0,5	2	2,5	2	3,3
60 à 79 ans	5,6	4,2	7,5	.	.	.	1 ^E	0,5	1	2,9	2	3,8
3 à 79 ans	3,6	2,8	4,6	1 ^E	0,6	2
6 à 79 ans	3,7	2,9	4,7	1 ^E	0,6	2
Femmes												
6 à 11 ans	2	1	2,1	F	.	.
12 à 19 ans	1	1	2
20 à 39 ans	3,3	2,4	4,6	1 ^E	0,4	2
40 à 59 ans	4,1	3,3	5,2	0,6 ^E	0,3	0,9	0,9	0,9	1	2,1	1	2,8
60 à 79 ans	5,6	4,2	7,4	0,6 ^E	0,2	1	1 ^E	0,3	2	3,0	2	4,1
3 à 79 ans	3,4	2,7	4,2	1 ^E	0,6	2
6 à 79 ans	3,4	2,8	4,3	1 ^E	0,7	2

	Mercure											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nmol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1 ^E	0,6	1	F	.	.	7,1 ^E	2,4	12	15 ^E	8,4	21
6 à 11 ans	1 ^E	0,6	2	3,1	2,3	3,9	6,1	4,3	7,9	10	6,7	13
12 à 19 ans	1 ^E	0,5	2	3,1	2,4	3,8	6,4	4,3	8,5	12 ^E	6,6	17
20 à 39 ans	3,2	2,1	4,3	8,1	5,6	11	15	9,8	20	26 ^E	13	39
40 à 59 ans	5,4	4,3	6,5	10	7,8	13	20 ^E	12	29	37 ^E	12	61
60 à 79 ans	6,1	4,6	7,6	11	8,7	14	21	16	27	32 ^E	19	46
3 à 79 ans	3,7	2,7	4,6	8,5	6,4	11	17	12	23	27^E	16	38
6 à 79 ans	3,8	2,8	4,8	8,7	6,5	11	17	12	23	28^E	17	39
Hommes												
6 à 11 ans	1	0,8	1	2,7	2	3,4	5,8 ^E	3,6	8,0	9,5 ^E	4,5	15
12 à 19 ans	1 ^E	0,5	1	3,1	2	4,1	6,8 ^E	2,8	11	13 ^E	7,3	19
20 à 39 ans	3,1	2,1	4,0	8,5 ^E	5,1	12	14	10	19	23 ^E	11	36
40 à 59 ans	6,0	4,9	7,1	13 ^E	8,0	19	F	.	.	F	.	.
60 à 79 ans	6,3	4,7	7,9	11	8,0	14	22	15	30	35 ^E	20	50
3 à 79 ans	3,8	2,7	5,0	9,7	7,3	12	19	13	26	30^E	13	47
6 à 79 ans	4,0	2,8	5,2	9,9	7,4	12	20	13	26	32^E	14	49
Femmes												
6 à 11 ans	2 ^E	0,8	2,3	3,5 ^E	2,2	4,9	6,6	4,6	8,5	10	6,9	14
12 à 19 ans	1 ^E	0,4	2	3,1	2,3	3,9	6	4,0	7,9	F	.	.
20 à 39 ans	3,5 ^E	2	5,0	7,9	5,4	10	16 ^E	7,2	24	F	.	.
40 à 59 ans	4,3	3,1	5,4	8,4	5,8	11	15	9,7	20	23 ^E	11	36
60 à 79 ans	5,8	4,2	7,4	11	8,5	14	21	14	28	F	.	.
3 à 79 ans	3,5	2,7	4,4	7,9	5,9	9,8	15	9,9	20	25^E	15	36
6 à 79 ans	3,7	2,8	4,6	7,9	6,0	9,9	15	9,9	20	25^E	15	36

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 61
Distribution du mercure (µg/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2009 à 2011

	Mercure											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,3	0,2	0,4
6 à 11 ans	0,3	0,2	0,3
12 à 19 ans	0,3	0,2	0,4
20 à 39 ans	0,64	0,47	0,85	0,2 ^E	0,09	0,3
40 à 59 ans	1,0	0,79	1,3	0,1	0,09	0,2	0,2	0,2	0,2	0,47	0,4	0,57
60 à 79 ans	1,1	0,87	1,5	F	.	.	0,2 ^E	0,1	0,3	0,59	0,42	0,77
3 à 79 ans	0,69	0,56	0,87	0,2^E	0,1	0,3
6 à 79 ans	0,71	0,57	0,89	0,2^E	0,1	0,4
Hommes												
6 à 11 ans	0,2	0,2	0,3
12 à 19 ans	0,3	0,2	0,4
20 à 39 ans	0,61	0,45	0,84	0,2 ^E	0,1	0,3
40 à 59 ans	1,2	0,91	1,7	0,2 ^E	0,1	0,2	0,2 ^E	0,1	0,3	0,50	0,3	0,67
60 à 79 ans	1,1	0,84	1,5	.	.	.	0,2 ^E	0,09	0,3	0,59	0,4	0,77
3 à 79 ans	0,72	0,57	0,91	0,2^E	0,1	0,3
6 à 79 ans	0,74	0,58	0,94	0,2^E	0,1	0,4
Femmes												
6 à 11 ans	0,3	0,2	0,4	F	.	.
12 à 19 ans	0,3	0,2	0,4
20 à 39 ans	0,66	0,47	0,92	0,2 ^E	0,09	0,4
40 à 59 ans	0,82	0,65	1,0	0,1 ^E	0,06	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,55
60 à 79 ans	1,1	0,84	1,5	0,1 ^E	0,04	0,2	0,2 ^E	0,06	0,3	0,60	0,4	0,82
3 à 79 ans	0,67	0,54	0,83	0,2^E	0,1	0,3
6 à 79 ans	0,69	0,55	0,86	0,2^E	0,1	0,4

	Mercure											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,2 ^E	0,1	0,3	F	.	.	1,4 ^E	0,44	2,3	3,0 ^E	1,7	4,3
6 à 11 ans	0,2 ^E	0,1	0,3	0,62	0,47	0,78	1,2	0,84	1,5	2,0	1,3	2,6
12 à 19 ans	0,2 ^E	0,1	0,3	0,62	0,47	0,76	1,3	0,84	1,7	2,4 ^E	1,3	3,5
20 à 39 ans	0,65	0,43	0,86	1,6	1,1	2,1	2,9	2,0	3,9	5,2 ^E	2,6	7,8
40 à 59 ans	1,0	0,84	1,2	2,1	1,5	2,6	4,1 ^E	2,4	5,8	7,3 ^E	2,5	12
60 à 79 ans	1,2	0,89	1,5	2,2	1,7	2,8	4,3	3,1	5,5	6,5 ^E	3,9	9,1
3 à 79 ans	0,74	0,55	0,93	1,7	1,2	2,1	3,4	2,4	4,5	5,5^E	3,3	7,6
6 à 79 ans	0,76	0,57	0,96	1,7	1,3	2,1	3,5	2,4	4,6	5,6^E	3,3	7,8
Hommes												
6 à 11 ans	0,2	0,2	0,2	0,54	0,4	0,68	1,1 ^E	0,70	1,5	1,9 ^E	0,86	2,9
12 à 19 ans	0,2 ^E	0,1	0,3	0,62	0,4	0,83	1,3 ^E	0,50	2,1	2,6 ^E	1,4	3,8
20 à 39 ans	0,62	0,43	0,80	1,6 ^E	0,98	2,3	2,9	2,1	3,7	4,7 ^E	2,2	7,1
40 à 59 ans	1,2	0,96	1,4	2,7 ^E	1,6	3,7	F	.	.	F	.	.
60 à 79 ans	1,2	0,92	1,6	2,2	1,6	2,9	4,5	2,9	6,0	7,0 ^E	3,9	10
3 à 79 ans	0,76	0,53	0,99	1,9	1,4	2,4	3,9	2,7	5,1	6,1^E	2,7	9,5
6 à 79 ans	0,80	0,56	1,0	1,9	1,4	2,4	3,9	2,7	5,2	6,3^E	2,9	9,7
Femmes												
6 à 11 ans	0,3 ^E	0,2	0,46	0,71 ^E	0,45	0,97	1,3	0,89	1,6	2,1	1,3	2,8
12 à 19 ans	0,2 ^E	0,08	0,3	0,62	0,46	0,78	1,2	0,79	1,5	F	.	.
20 à 39 ans	0,69 ^E	0,4	0,99	1,6	1,1	2,1	3,1 ^E	1,4	4,8	F	.	.
40 à 59 ans	0,85	0,64	1,1	1,7	1,1	2,2	2,9	1,9	3,9	4,7 ^E	2,1	7,2
60 à 79 ans	1,1	0,81	1,4	2,2	1,7	2,8	4,2	2,8	5,5	5,9 ^E	1,7	10
3 à 79 ans	0,71	0,53	0,88	1,5	1,1	1,9	3,0	2,0	4,0	5,1^E	3,0	7,1
6 à 79 ans	0,74	0,56	0,92	1,6	1,2	2,0	3,0	2,0	4,0	5,1^E	3,0	7,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 62
Distribution de cadmium (nmol/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile (non-fumeurs), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Cadmium											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	nmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,7	0,6	0,8	0,5	0,4	0,6
6 à 11 ans	0,8	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6
12 à 19 ans	1	0,9	1	.	.	.	0,5	0,3	0,7	0,8	0,7	0,8
20 à 39 ans	1,6	1	2,0	0,5 ^E	0,2	0,7	0,7 ^E	0,4	1	0,9	0,9	1
40 à 59 ans	2,4	2,2	2,7	0,8	0,6	1	0,9	0,9	1	1,6	1	1,9
60 à 79 ans	3,2	3,0	3,5	0,9	0,9	1	2 ^E	0,9	2,1	2,1	2,0	2,3
3 à 79 ans	1,8	1,6	2,0	0,5^E	0,3	0,6	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	1
6 à 79 ans	1,9	1,7	2,1	0,5	0,3	0,6	0,7	0,6	0,8	1	0,9	1
Hommes												
6 à 11 ans	0,8	0,7	0,9	0,6	0,5	0,6
12 à 19 ans	1	0,9	1	.	.	.	0,5 ^E	0,3	0,7	0,8	0,7	0,8
20 à 39 ans	1	1	1,6	0,5 ^E	0,2	0,7	0,6	0,4	0,9	0,9	0,8	1
40 à 59 ans	2,0	1,7	2,3	0,7 ^E	0,4	1	0,9	0,8	1	1 ^E	0,6	1
60 à 79 ans	2,9	2,6	3,2	0,9	0,7	1	1 ^E	0,5	1,5	1,9	1,7	2,1
3 à 79 ans	1,6	1	1,7	0,4^E	0,3	0,6	0,6	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9
6 à 79 ans	1,6	1,5	1,8	0,5	0,3	0,6	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9
Femmes												
6 à 11 ans	0,8	0,7	0,9	0,6	0,5	0,7
12 à 19 ans	1	0,9	1	.	.	.	0,5 ^E	0,3	0,7	0,8	0,6	0,9
20 à 39 ans	2,0	1,5	2,6	F	.	.	0,9 ^E	0,5	1	1 ^E	0,5	1,5
40 à 59 ans	2,9	2,6	3,3	0,9	0,7	1	1 ^E	0,5	1	2,0	1,7	2,3
60 à 79 ans	3,5	3,2	3,9	1 ^E	0,6	1	1,7	1	2,3	2,3	2,1	2,5
3 à 79 ans	2,1	1,9	2,4	0,5^E	0,3	0,6	0,7	0,6	0,9	1	0,9	1
6 à 79 ans	2,2	1,9	2,5	0,5^E	0,3	0,7	0,8	0,7	0,9	1	0,8	1

	Cadmium											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	nmol/L											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	1	1	1	1	1 ^E	0,3	1,7
6 à 11 ans	0,8	0,8	0,9	1	0,9	1	1,5 ^E	0,9	2,1	1,8	1,6	2,1
12 à 19 ans	0,9	0,9	1	1,5 ^E	0,9	2,1	2,1	1,8	2,3	3,0	2,5	3,6
20 à 39 ans	1,6	1	2,1	2,6	2,1	3,0	3,8	3,0	4,7	6,3 ^E	2,6	9,9
40 à 59 ans	2,6	2,3	2,9	3,6	3,3	4,0	5,6	4,9	6,4	7,5	5,0	9,9
60 à 79 ans	3,1	2,9	3,4	4,7	4,2	5,2	7,2	6,4	8,0	9,9	8,2	12
3 à 79 ans	1,9	1,7	2,1	3,1	2,9	3,4	5,1	4,4	5,9	7,1	5,7	8,5
6 à 79 ans	2,0	1,8	2,2	3,2	2,9	3,5	5,2	4,5	6,0	7,2	5,8	8,6
Hommes												
6 à 11 ans	0,8	0,7	0,9	1	0,9	1	1,6 ^E	1	2,2	1,9	1	2,3
12 à 19 ans	0,9	0,9	1	1 ^E	0,6	1,7	1,9	1,7	2,2	2,9 ^E	1,6	4,3
20 à 39 ans	1	0,7	1	2,1	1,7	2,5	2,8	2,2	3,3	3,5	2,4	4,5
40 à 59 ans	2,1	1,8	2,5	2,9	2,6	3,2	5,0	3,4	6,5	6,4	4,3	8,5
60 à 79 ans	2,8	2,6	3,1	4,5	4,0	5,0	6,6	5,8	7,4	8,1	6,1	10
3 à 79 ans	1,6	1	1,9	2,7	2,4	2,9	4,2	3,5	5,0	6,1	5,1	7,1
6 à 79 ans	1,6	1	1,8	2,7	2,5	3,0	4,4	3,6	5,2	6,2	5,1	7,2
Femmes												
6 à 11 ans	0,8	0,7	0,9	1	0,9	1	1 ^E	0,6	1,7	1,8	1,5	2,1
12 à 19 ans	0,9	0,9	1	1,5	1	1,9	2,3	1,9	2,8	3,1	2,6	3,6
20 à 39 ans	2,0	1,5	2,4	3,2	2,5	3,9	5,0 ^E	1,5	8,6	8,8 ^E	3,9	14
40 à 59 ans	2,9	2,6	3,3	4,2	3,7	4,6	5,9	4,5	7,4	8,6 ^E	3,7	13
60 à 79 ans	3,5	3,1	3,8	4,9	4,2	5,5	8,0	6,7	9,2	10	8,9	12
3 à 79 ans	2,3	1,9	2,6	3,7	3,4	3,9	5,7	4,6	6,8	8,7	6,8	11
6 à 79 ans	2,3	2,0	2,6	3,7	3,5	4,0	5,7	4,6	6,9	8,8	7,0	11

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans ayant un niveau de cotinine au-dessous de 50,0 ng/ml, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 63
Distribution de cadmium (nmol/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile (fumeurs), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Cadmium											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nmol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	6,0 ^E	4,0	9,1	X	.	.	X	.	.	F	.	.
20 à 39 ans	12	9,3	14	3,0	2,2	3,9	3,2 ^E	1,6	4,9	6,6 ^E	3,6	9,6
40 à 59 ans	17	15	20	5,3	3,7	6,9	7,4	5,1	9,8	12	9,2	14
60 à 79 ans	15	13	18	X	.	.	5,9 ^E	3,7	8,1	10	7,1	13
3 à 79 ans	13	12	15	3,0	2,6	3,5	4,7	3,5	5,9	8,7	7,1	10
6 à 79 ans	13	12	15	3,1	2,6	3,5	4,7	3,5	5,9	8,7	7,1	10
Hommes												
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	5,6 ^E	3,7	8,4	X	.	.	X	.	.	F	.	.
20 à 39 ans	11	8,2	14	X	.	.	3,8 ^E	2,4	5,2	5,9 ^E	3,6	8,2
40 à 59 ans	16	14	19	X	.	.	6,0 ^E	1,8	10	12	9,0	15
60 à 79 ans	13	11	17	X	.	.	X	.	.	8,4 ^E	4,4	12
3 à 79 ans	12	11	14	2,8^E	1	4,1	4,6	3,3	5,9	6,7^E	3,8	9,6
6 à 79 ans	12	11	14	2,8^E	1	4,1	4,6	3,3	5,9	6,7^E	3,8	9,6
Femmes												
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	7,3 ^E	4,6	12	X	.	.	X	.	.	X	.	.
20 à 39 ans	13 ^E	8,7	18	X	.	.	F	.	.	8,4 ^E	3,5	13
40 à 59 ans	18	15	23	X	.	.	7,5 ^E	4,6	10	11	7,5	14
60 à 79 ans	17	14	21	X	.	.	X	.	.	12 ^E	7,2	17
3 à 79 ans	15	12	18	F	.	.	6,1^E	2,0	10	9,8	8,1	11
6 à 79 ans	15	12	18	F	.	.	6,2^E	2,1	10	9,8	8,1	11

	Cadmium											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nmol/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	6,0 ^E	1,9	10	14 ^E	7,6	21	X	.	.	X	.	.
20 à 39 ans	12	8,9	16	22	18	26	31	25	37	34	26	43
40 à 59 ans	17	12	21	26	21	32	36	29	43	42	33	50
60 à 79 ans	16	13	18	22	19	26	30	24	35	X	.	.
3 à 79 ans	15	12	17	24	20	27	32	28	36	38	32	43
6 à 79 ans	15	12	17	24	20	27	32	28	36	38	32	43
Hommes												
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	F	.	.	16 ^E	7,0	24	X	.	.	X	.	.
20 à 39 ans	13 ^E	7,3	18	21 ^E	13	29	33	23	42	X	.	.
40 à 59 ans	17	13	20	23	18	28	33	28	39	X	.	.
60 à 79 ans	14	12	16	21	15	26	X	.	.	X	.	.
3 à 79 ans	15	12	17	21	18	25	31	26	36	34	29	39
6 à 79 ans	15	12	17	21	18	25	31	26	36	34	29	39
Femmes												
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	7,4 ^E	3,8	11	X	.	.	X	.	.	X	.	.
20 à 39 ans	12 ^E	7,5	17	23	16	29	28 ^E	16	39	X	.	.
40 à 59 ans	20 ^E	9,5	30	30	23	37	37	25	49	X	.	.
60 à 79 ans	18	14	22	24	20	27	X	.	.	X	.	.
3 à 79 ans	16	11	20	25	21	29	34	27	41	46	33	59
6 à 79 ans	16	11	20	25	21	29	34	27	41	46	33	59

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans ayant un niveau de cotinine de 50.0 ng/ml ou plus, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 64

Distribution de cadmium (µg/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile (non-fumeurs), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Cadmium												
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
	de	à		de	à		de	à		de	à		
µg/L													
Les deux sexes													
3 à 5 ans	0,07	0,07	0,08	0,06	0,05	0,07
6 à 11 ans	0,09	0,08	0,09	0,06	0,06	0,07
12 à 19 ans	0,1	0,1	0,1	0,09	0,08	0,09
20 à 39 ans	0,18	0,2	0,22	0,05 ^E	0,02	0,08	0,08 ^E	0,05	0,1	.	0,1	0,1	0,1
40 à 59 ans	0,27	0,24	0,31	0,09	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	.	0,18	0,1	0,22
60 à 79 ans	0,36	0,33	0,39	0,1	0,1	0,1	0,17 ^E	0,1	0,24	.	0,24	0,22	0,26
3 à 79 ans	0,20	0,18	0,23	0,05^E	0,03	0,07	0,08	0,06	0,09	.	0,1	0,1	0,1
6 à 79 ans	0,21	0,19	0,23	0,05	0,04	0,07	0,08	0,07	0,09	.	0,1	0,1	0,1
Hommes													
6 à 11 ans	0,09	0,08	0,09	0,06	0,05	0,07
12 à 19 ans	0,1	0,1	0,1	.	.	.	0,06 ^E	0,04	0,08	.	0,08	0,08	0,09
20 à 39 ans	0,2	0,1	0,17	0,05 ^E	0,03	0,08	0,07	0,05	0,1	.	0,1	0,09	0,1
40 à 59 ans	0,22	0,19	0,26	0,08 ^E	0,05	0,1	0,1	0,09	0,1	.	0,1 ^E	0,06	0,2
60 à 79 ans	0,33	0,30	0,36	0,1	0,08	0,1	0,1 ^E	0,05	0,17	.	0,21	0,18	0,24
3 à 79 ans	0,17	0,2	0,19	0,05^E	0,03	0,07	0,07	0,06	0,08	.	0,1	0,1	0,1
6 à 79 ans	0,18	0,2	0,20	0,05	0,04	0,07	0,08	0,06	0,09	.	0,1	0,1	0,1
Femmes													
6 à 11 ans	0,09	0,08	0,1	0,06	0,05	0,08
12 à 19 ans	0,1	0,1	0,1	.	.	.	0,05 ^E	0,03	0,07	.	0,09	0,07	0,1
20 à 39 ans	0,22	0,17	0,29	F	.	.	0,1 ^E	0,06	0,1	.	0,1 ^E	0,05	0,20
40 à 59 ans	0,33	0,29	0,37	0,1	0,08	0,1	0,1 ^E	0,06	0,20	.	0,22	0,18	0,26
60 à 79 ans	0,40	0,36	0,43	0,1 ^E	0,06	0,2	0,19	0,1	0,26	.	0,26	0,24	0,28
3 à 79 ans	0,23	0,21	0,26	0,05	0,03	0,07	0,08	0,07	0,1	.	0,1	0,1	0,1
6 à 79 ans	0,24	0,22	0,28	0,06^E	0,03	0,08	0,09	0,07	0,1	.	0,1	0,09	0,1

	Cadmium											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
	de	à		de	à		de	à		de	à	
µg/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,08	0,07	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	F	.	.
6 à 11 ans	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,17 ^E	0,1	0,24	0,20	0,18	0,23
12 à 19 ans	0,1	0,1	0,1	0,17 ^E	0,1	0,24	0,24	0,21	0,27	0,34	0,28	0,41
20 à 39 ans	0,18	0,1	0,24	0,29	0,24	0,33	0,43	0,33	0,53	0,71 ^E	0,30	1,1
40 à 59 ans	0,29	0,26	0,32	0,41	0,36	0,45	0,63	0,55	0,72	0,84	0,56	1,1
60 à 79 ans	0,35	0,33	0,38	0,53	0,48	0,58	0,81	0,71	0,91	1,1	0,89	1,2
3 à 79 ans	0,21	0,19	0,23	0,35	0,33	0,38	0,57	0,49	0,66	0,80	0,64	0,96
6 à 79 ans	0,22	0,19	0,24	0,36	0,33	0,39	0,59	0,50	0,67	0,81	0,65	0,97
Hommes												
6 à 11 ans	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,18 ^E	0,1	0,25	0,21	0,2	0,26
12 à 19 ans	0,1	0,1	0,1	0,1 ^E	0,06	0,19	0,21	0,18	0,24	0,33 ^E	0,18	0,48
20 à 39 ans	0,1	0,07	0,1	0,24	0,19	0,29	0,31	0,25	0,37	0,39	0,26	0,51
40 à 59 ans	0,24	0,20	0,29	0,33	0,29	0,37	0,56	0,38	0,73	0,72	0,48	0,96
60 à 79 ans	0,32	0,28	0,35	0,51	0,45	0,57	0,74	0,66	0,83	0,91	0,70	1,1
3 à 79 ans	0,18	0,1	0,21	0,30	0,27	0,32	0,47	0,39	0,56	0,69	0,58	0,80
6 à 79 ans	0,18	0,2	0,20	0,30	0,27	0,33	0,49	0,40	0,58	0,70	0,58	0,81
Femmes												
6 à 11 ans	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1 ^E	0,07	0,20	0,20	0,17	0,23
12 à 19 ans	0,1	0,1	0,1	0,17	0,1	0,22	0,26	0,22	0,31	0,35	0,29	0,41
20 à 39 ans	0,22	0,2	0,27	0,36	0,28	0,44	0,57 ^E	0,17	0,96	0,99 ^E	0,44	1,5
40 à 59 ans	0,33	0,29	0,38	0,47	0,42	0,52	0,66	0,50	0,83	0,97 ^E	0,42	1,5
60 à 79 ans	0,39	0,34	0,43	0,55	0,48	0,62	0,90	0,77	1,0	1,1	0,98	1,3
3 à 79 ans	0,26	0,22	0,29	0,41	0,38	0,45	0,64	0,52	0,76	0,98	0,77	1,2
6 à 79 ans	0,26	0,23	0,30	0,42	0,39	0,46	0,64	0,52	0,77	0,99	0,79	1,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans ayant un niveau de cotinine au-dessous de 50,0 ng/ml, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 65
Distribution de cadmium (µg/L) mesuré dans le sang entier pour la population à domicile (fumeurs), selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Cadmium											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	0,68 ^E	0,45	1,0	X	.	.	X	.	.	F	.	.
20 à 39 ans	1,3	1,0	1,6	0,34	0,24	0,44	0,36 ^E	0,18	0,55	0,74 ^E	0,41	1,1
40 à 59 ans	1,9	1,7	2,3	0,59	0,42	0,77	0,83	0,60	1,1	1,3	0,95	1,6
60 à 79 ans	1,7	1,4	2,0	X	.	.	0,66 ^E	0,42	0,90	1,1	0,76	1,5
3 à 79 ans	1,5	1,3	1,7	0,34	0,29	0,40	0,53	0,40	0,67	0,98	0,85	1,1
6 à 79 ans	1,5	1,3	1,7	0,35	0,29	0,40	0,53	0,40	0,67	0,98	0,85	1,1
Hommes												
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	0,62 ^E	0,41	0,95	X	.	.	X	.	.	F	.	.
20 à 39 ans	1,2	0,92	1,6	X	.	.	0,43 ^E	0,27	0,59	0,66 ^E	0,41	0,91
40 à 59 ans	1,8	1,5	2,2	X	.	.	0,67 ^E	0,24	1,1	1,3	0,90	1,7
60 à 79 ans	1,5	1,2	1,9	X	.	.	X	.	.	0,95 ^E	0,53	1,4
3 à 79 ans	1,4	1,2	1,6	0,31^E	0,2	0,46	0,52	0,37	0,67	0,75^E	0,45	1,0
6 à 79 ans	1,4	1,2	1,6	0,31^E	0,2	0,46	0,52	0,37	0,67	0,75^E	0,45	1,0
Femmes												
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	0,82 ^E	0,51	1,3	X	.	.	X	.	.	X	.	.
20 à 39 ans	1,4 ^E	0,98	2,0	X	.	.	F	.	.	0,95 ^E	0,41	1,5
40 à 59 ans	2,1	1,6	2,6	X	.	.	0,84	0,57	1,1	1,2	0,77	1,6
60 à 79 ans	1,9	1,6	2,3	X	.	.	X	.	.	1,4 ^E	0,75	2,0
3 à 79 ans	1,7	1,4	2,0	F	.	.	0,69^E	0,23	1,2	1,0	0,90	1,2
6 à 79 ans	1,7	1,4	2,0	F	.	.	0,70^E	0,24	1,2	1,0	0,90	1,2
Cadmium												
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/L												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	0,68 ^E	0,24	1,1	1,6 ^E	0,85	2,4	X	.	.	X	.	.
20 à 39 ans	1,4	0,94	1,8	2,5	2,0	3,0	3,5	2,8	4,2	3,8	2,9	4,8
40 à 59 ans	1,9	1,4	2,4	2,9	2,3	3,6	4,0	3,3	4,8	4,7	3,7	5,6
60 à 79 ans	1,8	1,5	2,0	2,5	2,2	2,9	3,4	2,7	4,0	X	.	.
3 à 79 ans	1,7	1,4	2,0	2,7	2,3	3,0	3,6	3,2	4,0	4,3	3,6	4,9
6 à 79 ans	1,7	1,4	2,0	2,7	2,3	3,0	3,6	3,2	4,0	4,3	3,6	4,9
Hommes												
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	F	.	.	1,8 ^E	0,78	2,7	X	.	.	X	.	.
20 à 39 ans	1,4 ^E	0,79	2,0	2,4 ^E	1,4	3,3	3,7	2,6	4,7	X	.	.
40 à 59 ans	1,9	1,5	2,2	2,6	2,1	3,2	3,7	3,1	4,3	X	.	.
60 à 79 ans	1,6	1,4	1,9	2,3	1,7	3,0	X	.	.	X	.	.
3 à 79 ans	1,7	1,4	1,9	2,4	2,0	2,8	3,5	3,0	4,1	3,8	3,2	4,4
6 à 79 ans	1,7	1,4	1,9	2,4	2,0	2,8	3,5	3,0	4,1	3,8	3,2	4,4
Femmes												
6 à 11 ans	X	.	.	X	.	.	X	.	.	X	.	.
12 à 19 ans	0,84 ^E	0,47	1,2	X	.	.	X	.	.	X	.	.
20 à 39 ans	1,3 ^E	0,80	1,9	2,6	1,8	3,3	3,1 ^E	1,7	4,4	X	.	.
40 à 59 ans	2,2 ^E	1,1	3,3	3,4	2,6	4,2	4,2	2,8	5,6	X	.	.
60 à 79 ans	2,0	1,5	2,4	2,7	2,3	3,0	X	.	.	X	.	.
3 à 79 ans	1,8	1,3	2,2	2,8	2,4	3,2	3,8	3,0	4,5	5,2	3,7	6,8
6 à 79 ans	1,8	1,3	2,2	2,8	2,4	3,2	3,8	3,0	4,6	5,2	3,7	6,8

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans ayant un niveau de cotinine de 50,0 ng/ml ou plus, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 66
Distribution de la concentration de benzène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Benzène											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/m ³												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,01	0,84	1,22	0,23 ^E	0,09	0,37	0,34	0,24	0,45	0,55	0,42	0,69
6 à 11 ans	1,14	0,88	1,47	0,24 ^E	0,10	0,38	0,34 ^E	0,19	0,5	0,61	0,43	0,78
12 à 19 ans	1,11	0,94	1,32	0,27	0,20	0,34	0,37	0,29	0,46	0,56	0,45	0,66
20 à 39 ans	1,01	0,81	1,24	0,25	0,17	0,33	0,33	0,23	0,44	0,51	0,40	0,61
40 à 59 ans	1,18	0,94	1,48	0,26	0,16	0,35	0,33	0,23	0,43	0,53	0,36	0,70
60 à 79 ans	0,94	0,72	1,23	0,20	0,13	0,27	0,26 ^E	0,12	0,40	0,45	0,33	0,57
3 à 79 ans	1,07	0,87	1,30	0,24	0,17	0,32	0,33	0,23	0,42	0,51	0,41	0,62
6 à 79 ans	1,07	0,87	1,31	0,24	0,17	0,32	0,33	0,23	0,42	0,51	0,40	0,62
Hommes												
6 à 11 ans	1,17	0,89	1,53	0,23 ^E	0,08	0,39	0,33 ^E	0,14	0,53	0,68	0,46	0,90
12 à 19 ans	1,08	0,86	1,36	0,27	0,21	0,34	0,35	0,27	0,43	0,57	0,43	0,71
20 à 39 ans	0,88	0,69	1,13	0,24 ^E	0,13	0,35	0,31 ^E	0,16	0,46	0,50	0,40	0,61
40 à 59 ans	1,19	0,89	1,58	0,23 ^E	0,13	0,32	0,32	0,21	0,43	0,49	0,32	0,67
60 à 79 ans	0,93	0,71	1,22	0,20 ^E	0,11	0,28	0,24 ^E	0,08	0,39	0,45	0,33	0,57
3 à 79 ans	1,03	0,83	1,28	0,23^E	0,14	0,31	0,31	0,21	0,42	0,50	0,39	0,62
6 à 79 ans	1,03	0,82	1,28	0,23^E	0,14	0,31	0,31	0,21	0,42	0,50	0,39	0,62
Femmes												
6 à 11 ans	1,11	0,82	1,49	0,28 ^E	0,13	0,43	0,37 ^E	0,24	0,50	0,58	0,42	0,73
12 à 19 ans	1,14	0,95	1,37	0,26 ^E	0,15	0,38	0,40	0,30	0,50	0,56	0,46	0,66
20 à 39 ans	1,14	0,90	1,46	0,28	0,21	0,35	0,34	0,26	0,43	0,55	0,41	0,69
40 à 59 ans	1,17	0,95	1,44	0,29	0,19	0,38	0,36	0,24	0,47	0,60	0,43	0,77
60 à 79 ans	0,95	0,68	1,32	0,21 ^E	0,11	0,30	0,27 ^E	0,13	0,41	0,45	0,32	0,57
3 à 79 ans	1,11	0,91	1,34	0,26	0,20	0,32	0,34	0,26	0,42	0,54	0,43	0,65
6 à 79 ans	1,11	0,91	1,35	0,26	0,20	0,32	0,34	0,26	0,43	0,54	0,43	0,65

	Benzène											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
µg/m ³												
Les deux sexes												
3 à 5 ans	0,88	0,75	1,00	1,83 ^E	1,12	2,55	3,83	2,53	5,13	5,30	4,15	6,44
6 à 11 ans	1,09	0,73	1,44	2,27	1,54	3,00	3,93	3,00	4,86	5,15	3,92	6,38
12 à 19 ans	0,97	0,74	1,19	2,09	1,44	2,75	3,91	3,07	4,76	6,81 ^E	3,78	9,83
20 à 39 ans	0,83	0,62	1,04	1,79	1,18	2,40	3,87 ^E	2,11	5,62	7,56	5,34	9,78
40 à 59 ans	1,02	0,71	1,33	2,30	1,71	2,89	5,42	3,74	7,11	8,27 ^E	4,61	11,92
60 à 79 ans	0,80	0,55	1,05	1,86	1,22	2,50	4,58	3,26	5,90	6,42	4,45	8,40
3 à 79 ans	0,90	0,68	1,12	2,07	1,56	2,57	4,24	3,16	5,33	7,42	5,70	9,14
6 à 79 ans	0,90	0,67	1,13	2,07	1,56	2,57	4,25	3,11	5,38	7,46	5,72	9,21
Hommes												
6 à 11 ans	1,15	0,75	1,55	2,25 ^E	1,34	3,16	3,86	2,93	4,80	4,49 ^E	2,61	6,38
12 à 19 ans	0,97	0,70	1,25	2,04 ^E	1,30	2,78	3,71	2,44	4,98	5,28 ^E	2,06	8,51
20 à 39 ans	0,77	0,59	0,95	1,31 ^E	0,78	1,84	3,00 ^E	1,34	4,65	5,43 ^E	3,26	7,60
40 à 59 ans	1,04	0,72	1,37	2,36	1,68	3,05	6,38 ^E	2,19	10,57	11,66 ^E	6,17	17,14
60 à 79 ans	0,87	0,59	1,15	1,76 ^E	1,06	2,47	4,29	3,04	5,53	5,94	4,34	7,55
3 à 79 ans	0,89	0,70	1,08	1,92	1,40	2,43	4,08	3,05	5,11	7,68^E	4,91	10,44
6 à 79 ans	0,89	0,69	1,09	1,94	1,41	2,47	4,08	3,02	5,14	7,70^E	4,76	10,65
Femmes												
6 à 11 ans	0,99 ^E	0,59	1,40	2,30	1,57	3,03	3,96	2,81	5,10	5,23	3,50	6,95
12 à 19 ans	0,96	0,67	1,25	2,22 ^E	1,38	3,05	3,94	2,76	5,12	7,85 ^E	4,20	11,5
20 à 39 ans	0,96 ^E	0,53	1,38	2,20	1,47	2,94	5,41 ^E	2,96	7,85	8,47	5,87	11,07
40 à 59 ans	0,99	0,65	1,33	2,23	1,55	2,90	4,90	3,21	6,59	6,78	5,23	8,33
60 à 79 ans	0,77 ^E	0,49	1,04	1,92 ^E	1,09	2,75	4,66 ^E	2,82	6,50	6,88 ^E	4,24	9,53
3 à 79 ans	0,91	0,62	1,21	2,17	1,67	2,67	4,65	3,45	5,85	7,39	6,02	8,76
6 à 79 ans	0,92	0,61	1,22	2,16	1,66	2,66	4,66	3,44	5,88	7,39	6,06	8,71

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 67
Distribution de la concentration de toluène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Toluène											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/m ³											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	9,34	7,59	11,49	2,02	1,53	2,52	2,64	2,27	3,02	4,05	3,33	4,76
6 à 11 ans	8,99	7,26	11,13	2,21	1,58	2,84	2,65	1,97	3,33	4,25	3,28	5,21
12 à 19 ans	8,71	7,10	10,68	1,76	1,16	2,35	2,62	2,11	3,14	3,95	3,17	4,73
20 à 39 ans	7,06	5,76	8,64	1,65	1,23	2,08	2,07	1,72	2,41	3,37	2,80	3,94
40 à 59 ans	9,59	7,51	12,24	1,96	1,58	2,33	2,40	1,82	2,98	4,17	2,80	5,53
60 à 79 ans	7,91	6,19	10,11	1,51	1,10	1,92	2,06	1,64	2,49	3,55	2,85	4,24
3 à 79 ans	8,34	6,90	10,08	1,72	1,41	2,03	2,28	1,93	2,63	3,63	3,00	4,26
6 à 79 ans	8,31	6,85	10,07	1,72	1,41	2,02	2,28	1,93	2,63	3,61	2,98	4,25
Hommes												
6 à 11 ans	8,63	7,00	10,63	2,01 ^E	1,25	2,76	2,66	1,77	3,54	4,19	2,94	5,44
12 à 19 ans	8,33	6,38	10,86	1,76 ^E	0,94	2,58	2,62	1,84	3,40	3,83	2,76	4,89
20 à 39 ans	6,49	4,97	8,48	1,49 ^E	0,86	2,11	1,96	1,46	2,45	2,88	1,85	3,91
40 à 59 ans	10,24	7,45	14,08	1,97	1,32	2,61	2,44	1,75	3,14	4,10	2,75	5,44
60 à 79 ans	7,37	5,59	9,73	1,27 ^E	0,80	1,74	1,83	1,39	2,26	3,34	2,47	4,21
3 à 79 ans	8,14	6,61	10,02	1,63	1,24	2,03	2,13	1,70	2,56	3,46	2,76	4,16
6 à 79 ans	8,12	6,55	10,06	1,6	1,18	2,01	2,12	1,69	2,56	3,45	2,72	4,17
Femmes												
6 à 11 ans	9,39	7,15	12,34	2,29	1,64	2,94	2,58	1,90	3,26	4,26	3,21	5,31
12 à 19 ans	9,12	7,24	11,49	1,75	1,13	2,38	2,60	2,07	3,14	4,12	3,14	5,10
20 à 39 ans	7,67	6,06	9,72	1,69	1,20	2,18	2,25	1,68	2,83	3,53	2,98	4,08
40 à 59 ans	8,97	7,08	11,36	1,95	1,46	2,43	2,38	1,66	3,10	4,21 ^E	2,46	5,97
60 à 79 ans	8,43	6,40	11,10	1,54 ^E	0,90	2,18	2,30	1,73	2,87	3,64	2,86	4,42
3 à 79 ans	8,54	7,09	10,29	1,77	1,44	2,10	2,34	2,01	2,67	3,85	3,21	4,50
6 à 79 ans	8,50	7,06	10,22	1,76	1,42	2,09	2,34	2,02	2,66	3,85	3,21	4,50

	Toluène											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/m ³											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	8,20	5,56	10,84	18,12	13,32	22,91	40,06	27,64	52,48	60,96	43,38	78,55
6 à 11 ans	7,82	5,97	9,66	17,51	13,60	21,41	36,12	23,42	48,82	56,77 ^E	27,39	86,14
12 à 19 ans	7,23	6,08	8,37	16,67	12,15	21,19	39,68 ^E	23,36	56,00	74,53 ^E	36,30	112,75
20 à 39 ans	5,61	4,22	7,00	13,05	8,72	17,39	33,67	26,32	41,03	55,32 ^E	32,62	78,02
40 à 59 ans	8,83	6,17	11,5	17,48	12,37	22,59	46,44 ^E	26,07	66,80	87,74 ^E	28,63	146,85
60 à 79 ans	7,06	4,89	9,24	16,22	10,85	21,59	37,90 ^E	19,08	56,72	77,02	49,73	104,31
3 à 79 ans	7,01	5,52	8,50	16,08	12,41	19,76	37,23	26,25	48,22	73,60	55,81	91,39
6 à 79 ans	7,00	5,53	8,47	15,99	12,32	19,67	37,22	25,93	48,51	74,38	55,79	92,98
Hommes												
6 à 11 ans	7,76	5,57	9,96	17,22	12,84	21,60	28,98 ^E	8,46	49,49	F	.	.
12 à 19 ans	6,73	5,69	7,76	15,10 ^E	8,44	21,75	F	.	.	106,42 ^E	35,26	177,59
20 à 39 ans	5,59	3,87	7,32	11,12 ^E	6,22	16,02	28,03 ^E	16,89	39,18	F	.	.
40 à 59 ans	7,88 ^E	5,05	10,7	20,00 ^E	12,51	27,49	F	.	.	168,04 ^E	79,23	256,85
60 à 79 ans	6,10 ^E	3,75	8,44	16,06	10,78	21,33	37,74 ^E	21,45	54,03	70,32 ^E	43,40	97,24
3 à 79 ans	6,74	5,33	8,14	15,82	11,85	19,80	37,37	24,08	50,66	87,46^E	42,23	132,7
6 à 79 ans	6,73	5,31	8,15	15,80	11,74	19,86	38,30^E	24,21	52,39	90,68^E	41,86	139,5
Femmes												
6 à 11 ans	8,04	5,99	10,1	17,54 ^E	10,88	24,20	41,59 ^E	24,35	58,84	66,00 ^E	35,07	96,94
12 à 19 ans	8,12	5,65	10,58	18,62	12,67	24,57	35,32 ^E	17,42	53,22	55,20 ^E	22,71	87,68
20 à 39 ans	5,59	3,74	7,45	16,50 ^E	8,89	24,11	37,87	26,15	49,59	58,79 ^E	28,13	89,45
40 à 59 ans	9,10	6,36	11,84	16,16	11,08	21,24	30,32 ^E	14,34	46,29	61,24 ^E	38,96	83,52
60 à 79 ans	7,84	5,39	10,3	16,22 ^E	9,19	23,24	37,90 ^E	12,15	63,64	74,86 ^E	40,79	108,93
3 à 79 ans	7,43	5,62	9,24	16,50	12,27	20,73	37,11	25,19	49,02	64,62	45,99	83,26
6 à 79 ans	7,34	5,57	9,10	16,37	12,22	20,53	36,96	25,45	48,46	62,43	43,50	81,36

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 68
Distribution de la concentration d'éthylbenzène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	Éthylbenzène											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/m ³											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,50	1,27	1,78	0,34	0,25	0,43	0,41	0,35	0,47	0,67	0,53	0,81
6 à 11 ans	1,49	1,21	1,84	0,32	0,25	0,40	0,42	0,33	0,51	0,62	0,45	0,79
12 à 19 ans	1,61	1,34	1,94	0,27	0,18	0,36	0,41	0,31	0,52	0,67	0,56	0,78
20 à 39 ans	1,25	1,02	1,53	0,27	0,20	0,34	0,35	0,26	0,44	0,53	0,42	0,64
40 à 59 ans	1,62	1,23	2,14	0,29	0,22	0,36	0,39	0,29	0,50	0,71	0,50	0,92
60 à 79 ans	1,33	1,07	1,66	0,24	0,20	0,27	0,33	0,28	0,39	0,54	0,44	0,64
3 à 79 ans	1,44	1,18	1,76	0,27	0,23	0,31	0,36	0,30	0,43	0,60	0,49	0,71
6 à 79 ans	1,43	1,17	1,76	0,27	0,23	0,31	0,36	0,30	0,42	0,60	0,48	0,71
Hommes												
6 à 11 ans	1,50	1,18	1,91	0,33 ^E	0,20	0,46	0,44	0,33	0,55	0,59 ^E	0,32	0,86
12 à 19 ans	1,64	1,29	2,09	0,26 ^E	0,14	0,37	0,40 ^E	0,25	0,55	0,65	0,50	0,80
20 à 39 ans	1,09	0,86	1,37	0,25	0,17	0,33	0,33	0,22	0,44	0,50	0,37	0,64
40 à 59 ans	1,62	1,20	2,19	0,26 ^E	0,16	0,36	0,40	0,28	0,52	0,65	0,44	0,86
60 à 79 ans	1,33	1,04	1,69	0,23 ^E	0,13	0,32	0,32	0,24	0,40	0,54	0,38	0,69
3 à 79 ans	1,38	1,13	1,68	0,25	0,21	0,30	0,37	0,28	0,45	0,58	0,47	0,69
6 à 79 ans	1,38	1,13	1,69	0,25	0,21	0,30	0,36	0,27	0,45	0,58	0,47	0,69
Femmes												
6 à 11 ans	1,48	1,18	1,85	0,32	0,27	0,37	0,41	0,30	0,51	0,65	0,52	0,78
12 à 19 ans	1,58	1,26	1,97	0,28 ^E	0,18	0,39	0,41	0,30	0,53	0,69	0,55	0,83
20 à 39 ans	1,44	1,11	1,87	0,28	0,19	0,36	0,36	0,29	0,43	0,55	0,39	0,70
40 à 59 ans	1,62	1,18	2,22	0,30	0,21	0,38	0,37 ^E	0,20	0,54	0,74	0,49	1,00
60 à 79 ans	1,33	1,03	1,71	0,26	0,20	0,32	0,34	0,28	0,40	0,55	0,45	0,64
3 à 79 ans	1,49	1,20	1,86	0,29	0,24	0,33	0,36	0,31	0,42	0,64	0,51	0,77
6 à 79 ans	1,49	1,20	1,86	0,29	0,24	0,33	0,36	0,30	0,42	0,63	0,50	0,76

	Éthylbenzène											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/m ³											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,41	1,10	1,72	3,07	2,30	3,84	5,86	4,60	7,12	9,08 ^E	5,05	13,11
6 à 11 ans	1,36	1,00	1,72	2,80	2,09	3,50	5,46	3,91	7,01	10,32 ^E	3,78	16,86
12 à 19 ans	1,22	0,93	1,50	3,59	2,61	4,57	8,93	6,35	11,5	17,88 ^E	10,51	25,26
20 à 39 ans	1,04	0,73	1,36	2,20	1,68	2,72	7,15 ^E	4,19	10,11	F	.	.
40 à 59 ans	1,37	1,00	1,75	3,14	2,21	4,06	7,73 ^E	2,63	12,84	16,77 ^E	5,96	27,57
60 à 79 ans	1,18	0,89	1,47	2,79 ^E	1,75	3,83	6,91 ^E	3,95	9,87	12,90 ^E	5,25	20,54
3 à 79 ans	1,24	0,98	1,50	2,78	2,10	3,46	7,28	4,74	9,82	15,07^E	8,41	21,73
6 à 79 ans	1,23	0,97	1,49	2,77	2,07	3,46	7,39	4,74	10,04	15,31^E	8,38	22,25
Hommes												
6 à 11 ans	1,37	0,92	1,82	2,59	1,75	3,44	5,33 ^E	2,38	8,29	F	.	.
12 à 19 ans	1,13	0,85	1,41	3,60 ^E	2,22	4,98	10,60 ^E	6,37	14,83	F	.	.
20 à 39 ans	0,89 ^E	0,53	1,26	1,88	1,39	2,36	F	.	.	F	.	.
40 à 59 ans	1,34 ^E	0,85	1,83	3,15 ^E	1,92	4,38	9,59 ^E	3,49	15,69	20,31 ^E	6,01	34,62
60 à 79 ans	1,13	0,74	1,52	2,93 ^E	1,43	4,43	7,73	5,12	10,35	12,57 ^E	7,41	17,73
3 à 79 ans	1,12	0,84	1,41	2,56	1,92	3,20	7,39	4,89	9,89	14,78^E	7,90	21,66
6 à 79 ans	1,13	0,84	1,42	2,55	1,91	3,20	7,40^E	4,73	10,07	14,80^E	7,35	22,24
Femmes												
6 à 11 ans	1,34	0,96	1,71	3,00	2,22	3,77	5,53	3,56	7,50	9,47 ^E	4,44	14,50
12 à 19 ans	1,29	0,85	1,72	3,55	2,48	4,62	7,11	4,58	9,63	12,38 ^E	5,74	19,01
20 à 39 ans	1,21	0,88	1,54	2,81 ^E	1,24	4,39	F	.	.	18,20 ^E	6,30	30,09
40 à 59 ans	1,38	1,01	1,74	2,94 ^E	1,69	4,19	7,24 ^E	2,66	11,82	F	.	.
60 à 79 ans	1,21	0,90	1,51	2,61 ^E	1,49	3,73	F	.	.	F	.	.
3 à 79 ans	1,33	1,10	1,56	2,95	2,03	3,86	7,27^E	3,94	10,60	15,24^E	7,26	23,22
6 à 79 ans	1,33	1,10	1,56	2,94	2,01	3,87	7,28^E	3,85	10,70	15,39^E	7,18	23,60

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 69
Distribution de la concentration de m- & p-xylène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	M- & p-xylène											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/m ³											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	5,27	4,39	6,32	1,07	0,72	1,42	1,48	1,16	1,80	2,11	1,68	2,54
6 à 11 ans	5,22	4,25	6,40	1,10	0,78	1,42	1,39	1,11	1,68	2,16	1,66	2,66
12 à 19 ans	5,72	4,78	6,84	0,98	0,68	1,28	1,32	1,01	1,63	2,18	1,74	2,62
20 à 39 ans	4,39	3,60	5,35	0,91	0,69	1,12	1,21	0,92	1,49	1,76	1,40	2,12
40 à 59 ans	5,80	4,38	7,67	1,01	0,73	1,29	1,32	1,05	1,59	2,34	1,66	3,02
60 à 79 ans	5,03	4,05	6,26	0,88	0,78	0,98	1,12	0,91	1,33	2,00	1,66	2,33
3 à 79 ans	5,15	4,22	6,28	0,95	0,79	1,11	1,28	1,08	1,47	2,05	1,64	2,46
6 à 79 ans	5,14	4,20	6,30	0,94	0,78	1,10	1,27	1,08	1,47	2,05	1,63	2,46
Hommes												
6 à 11 ans	5,25	4,14	6,65	1,12 ^E	0,68	1,56	1,51	1,10	1,92	2,18	1,47	2,90
12 à 19 ans	5,77	4,51	7,40	0,96	0,62	1,29	1,28	0,83	1,73	2,15	1,58	2,71
20 à 39 ans	3,73	2,98	4,67	0,83	0,57	1,08	1,13	0,76	1,50	1,65	1,20	2,11
40 à 59 ans	5,82	4,33	7,81	0,93	0,61	1,25	1,29	0,93	1,65	2,26	1,61	2,91
60 à 79 ans	5,04	3,93	6,47	0,82	0,53	1,11	1,07	0,83	1,32	1,94	1,46	2,42
3 à 79 ans	4,92	4,04	5,98	0,90	0,72	1,08	1,22	0,94	1,49	1,97	1,54	2,39
6 à 79 ans	4,91	4,02	6,01	0,89	0,71	1,08	1,21	0,93	1,49	1,96	1,51	2,41
Femmes												
6 à 11 ans	5,19	4,15	6,49	1,05	0,77	1,34	1,32	1,11	1,53	2,07	1,52	2,62
12 à 19 ans	5,66	4,54	7,06	1,00 ^E	0,62	1,37	1,40	1,09	1,72	2,31	1,72	2,90
20 à 39 ans	5,16	3,92	6,80	0,96	0,67	1,24	1,23	1,01	1,44	1,85	1,42	2,29
40 à 59 ans	5,78	4,19	7,97	1,13	0,86	1,40	1,34	0,97	1,72	2,48 ^E	1,50	3,46
60 à 79 ans	5,02	3,94	6,40	0,92	0,78	1,05	1,13	0,88	1,38	2,04	1,71	2,37
3 à 79 ans	5,39	4,31	6,74	1,00	0,84	1,16	1,30	1,12	1,48	2,14	1,67	2,61
6 à 79 ans	5,38	4,30	6,74	1,00	0,83	1,17	1,30	1,12	1,48	2,13	1,66	2,59

	M- & p-xylène											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/m ³											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	4,69	3,66	5,72	11,37	8,72	14,02	22,25	16,99	27,52	35,49 ^E	19,07	51,92
6 à 11 ans	4,53	3,39	5,68	9,76	7,27	12,25	22,08	16,58	27,58	43,06 ^E	17,48	68,63
12 à 19 ans	4,32	3,26	5,38	12,97	9,68	16,27	41,55	29,27	53,83	70,41	46,23	94,59
20 à 39 ans	3,56	2,70	4,41	8,31	6,25	10,36	26,05 ^E	15,29	36,82	53,94 ^E	19,87	88,01
40 à 59 ans	4,88	3,51	6,25	11,60	8,04	15,17	30,22 ^E	8,77	51,67	69,09 ^E	25,01	113,17
60 à 79 ans	4,42	3,10	5,74	10,41 ^E	6,29	14,53	27,26 ^E	14,60	39,91	52,10 ^E	30,79	73,41
3 à 79 ans	4,26	3,34	5,18	10,61	8,28	12,94	28,47	18,49	38,46	59,90^E	35,99	83,80
6 à 79 ans	4,25	3,33	5,18	10,49	8,10	12,89	28,51^E	18,03	38,99	60,55^E	35,57	85,52
Hommes												
6 à 11 ans	4,53	2,99	6,08	9,17	6,07	12,27	20,57 ^E	7,37	33,77	F	.	.
12 à 19 ans	3,66	2,50	4,82	12,64 ^E	6,40	18,88	44,94 ^E	28,41	61,48	F	.	.
20 à 39 ans	3,14	2,24	4,04	6,43 ^E	4,08	8,79	18,50 ^E	6,40	30,61	F	.	.
40 à 59 ans	4,69 ^E	2,93	6,45	10,90 ^E	5,79	16,01	F	.	.	83,78 ^E	25,83	141,73
60 à 79 ans	4,45 ^E	2,52	6,37	10,96 ^E	3,97	17,96	29,38 ^E	16,85	41,92	52,05	43,51	60,60
3 à 79 ans	3,83	2,93	4,72	10,04	7,83	12,26	27,84	18,43	37,26	57,18^E	32,49	81,88
6 à 79 ans	3,83	2,90	4,76	10,03	7,80	12,26	28,07^E	17,84	38,30	61,11^E	36,78	85,44
Femmes												
6 à 11 ans	4,50	3,40	5,60	10,35	6,99	13,72	22,18	16,22	28,13	42,05 ^E	19,54	64,57
12 à 19 ans	4,46	3,12	5,80	12,97	9,51	16,43	32,34 ^E	18,08	46,59	59,50 ^E	27,13	91,88
20 à 39 ans	4,25	2,96	5,54	10,38 ^E	4,72	16,05	F	.	.	70,12 ^E	25,04	115,2
40 à 59 ans	4,98	3,72	6,24	12,07 ^E	7,20	16,93	28,51 ^E	10,68	46,35	F	.	.
60 à 79 ans	4,41	3,21	5,62	10,23	6,65	13,80	F	.	.	F	.	.
3 à 79 ans	4,59	3,64	5,54	11,13	7,94	14,32	28,53^E	15,18	41,89	59,97^E	28,29	91,65
6 à 79 ans	4,50	3,54	5,46	11,10	7,77	14,43	28,58^E	14,67	42,50	60,14^E	27,47	92,80

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Tableau 70
Distribution de la concentration d'o-xylène mesuré dans l'air intérieur pour la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2009 à 2011

	O-xylène											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/m ³											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,57	1,31	1,87	0,32	0,23	0,42	0,44	0,34	0,53	0,68	0,54	0,81
6 à 11 ans	1,54	1,24	1,92	0,32 ^E	0,20	0,43	0,42	0,33	0,52	0,69	0,56	0,83
12 à 19 ans	1,70	1,40	2,07	0,31	0,22	0,41	0,41	0,31	0,51	0,68	0,54	0,81
20 à 39 ans	1,30	1,05	1,60	0,27	0,20	0,33	0,34	0,27	0,41	0,54	0,41	0,68
40 à 59 ans	1,65	1,24	2,19	0,28	0,19	0,37	0,40	0,30	0,49	0,69	0,49	0,89
60 à 79 ans	1,44	1,13	1,84	0,25	0,20	0,29	0,33	0,26	0,40	0,56	0,45	0,68
3 à 79 ans	1,50	1,21	1,85	0,27	0,22	0,32	0,37	0,30	0,44	0,62	0,49	0,74
6 à 79 ans	1,49	1,21	1,85	0,27	0,22	0,32	0,37	0,30	0,44	0,61	0,49	0,74
Hommes												
6 à 11 ans	1,58	1,23	2,03	0,33 ^E	0,18	0,48	0,46	0,32	0,60	0,70	0,52	0,87
12 à 19 ans	1,69	1,29	2,22	0,31 ^E	0,18	0,45	0,38	0,26	0,50	0,62	0,46	0,78
20 à 39 ans	1,13	0,90	1,41	0,26	0,19	0,32	0,32	0,23	0,40	0,51	0,35	0,66
40 à 59 ans	1,67	1,22	2,29	0,26 ^E	0,15	0,37	0,39	0,29	0,50	0,65	0,46	0,84
60 à 79 ans	1,44	1,10	1,87	0,23 ^E	0,14	0,31	0,32	0,27	0,37	0,51	0,33	0,68
3 à 79 ans	1,44	1,17	1,78	0,26	0,20	0,32	0,35	0,28	0,42	0,58	0,45	0,71
6 à 79 ans	1,44	1,16	1,79	0,26	0,20	0,32	0,34	0,27	0,42	0,58	0,45	0,72
Femmes												
6 à 11 ans	1,51	1,20	1,91	0,29 ^E	0,18	0,41	0,41	0,33	0,49	0,69	0,52	0,85
12 à 19 ans	1,71	1,35	2,16	0,32	0,22	0,41	0,43	0,32	0,54	0,70	0,53	0,88
20 à 39 ans	1,50	1,13	1,99	0,30	0,19	0,41	0,38	0,31	0,45	0,61	0,44	0,77
40 à 59 ans	1,62	1,19	2,21	0,30	0,19	0,40	0,41	0,27	0,55	0,72 ^E	0,45	1,00
60 à 79 ans	1,44	1,09	1,90	0,26	0,21	0,30	0,35	0,24	0,47	0,58	0,48	0,69
3 à 79 ans	1,56	1,24	1,95	0,29	0,24	0,35	0,39	0,31	0,46	0,66	0,53	0,79
6 à 79 ans	1,55	1,24	1,95	0,29	0,23	0,36	0,39	0,31	0,46	0,65	0,52	0,79

	O-xylène											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	µg/m ³											
Les deux sexes												
3 à 5 ans	1,44	1,10	1,78	3,22 ^E	1,97	4,46	6,74	5,33	8,16	10,67 ^E	6,52	14,82
6 à 11 ans	1,35	1,01	1,69	2,91	2,14	3,69	6,69	4,90	8,49	11,51 ^E	6,28	16,74
12 à 19 ans	1,35	1,03	1,67	3,89	3,03	4,75	10,85 ^E	6,57	15,12	21,48 ^E	12,67	30,29
20 à 39 ans	1,02	0,76	1,28	2,24 ^E	1,28	3,21	7,25 ^E	4,15	10,35	15,95 ^E	8,31	23,59
40 à 59 ans	1,34	0,93	1,74	3,32	2,38	4,26	9,55 ^E	5,11	13,98	18,31 ^E	10,08	26,53
60 à 79 ans	1,28	0,88	1,67	3,07 ^E	1,94	4,19	7,82 ^E	4,56	11,08	13,32 ^E	4,11	22,53
3 à 79 ans	1,24	0,97	1,51	3,04	2,26	3,82	8,16^E	5,18	11,14	16,56^E	9,67	23,46
6 à 79 ans	1,24	0,97	1,51	3,03	2,25	3,80	8,31^E	5,20	11,41	16,62^E	9,49	23,76
Hommes												
6 à 11 ans	1,42	0,97	1,87	2,74	1,85	3,64	6,30 ^E	2,69	9,91	F	.	.
12 à 19 ans	1,19	0,85	1,52	3,93 ^E	2,38	5,49	13,40 ^E	5,63	21,17	F	.	.
20 à 39 ans	0,98	0,68	1,27	1,75 ^E	1,10	2,40	5,79 ^E	2,66	8,92	9,68 ^E	4,19	15,18
40 à 59 ans	1,32 ^E	0,84	1,80	3,67	2,63	4,71	10,86 ^E	3,74	17,98	F	.	.
60 à 79 ans	1,35 ^E	0,84	1,86	3,17 ^E	1,63	4,71	8,36	5,91	10,80	12,47 ^E	5,03	19,91
3 à 79 ans	1,19	0,90	1,48	2,95	2,15	3,76	7,84	5,45	10,23	17,41^E	10,2	24,63
6 à 79 ans	1,19	0,89	1,49	2,95	2,15	3,76	8,02	5,53	10,51	17,45^E	9,75	25,16
Femmes												
6 à 11 ans	1,28	0,90	1,66	3,10	2,25	3,94	6,73	4,71	8,76	9,97 ^E	6,03	13,91
12 à 19 ans	1,45	1,01	1,89	3,87	2,88	4,85	9,00 ^E	4,17	13,83	F	.	.
20 à 39 ans	1,07	0,72	1,42	2,95 ^E	1,08	4,82	11,45 ^E	3,63	19,27	19,81 ^E	10,75	28,87
40 à 59 ans	1,34	0,91	1,77	3,03 ^E	1,74	4,32	8,62 ^E	3,95	13,29	15,62 ^E	8,39	22,86
60 à 79 ans	1,21	0,83	1,60	3,00 ^E	1,73	4,27	F	.	.	F	.	.
3 à 79 ans	1,29	0,99	1,58	3,16	2,15	4,17	8,60^E	4,39	12,81	16,23^E	8,67	23,79
6 à 79 ans	1,28	1,00	1,57	3,16	2,15	4,17	8,68^E	4,32	13,04	16,29^E	8,59	23,99

Note(s) : Population à domicile âgée de 3 à 79 ans, à l'exception de ceux pour qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 2*). La taille de l'échantillon pour les 3 à 5 ans produit des estimations nationales fiables uniquement pour les deux sexes combinés. Les résultats sont remplacés par la limite de détection inférieure divisée par 2 dans les cas où le résultat est sous la limite de détection inférieure.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 2.

Appendice I

Tableau de concordance

Tableau de concordance de l'ECMS pour les cycles 1 et 2

Comparabilité entre les cycles	Numéro du tableau au cycle 1	Sujet du tableau au cycle 1	Numéro du tableau au cycle 2	Sujet du tableau au cycle 2
Comparable	1	Pression diastolique au repos moyenne	1	Pression diastolique au repos moyenne
Comparable	2	Pression systolique au repos moyenne	2	Pression systolique au repos moyenne
Comparable	3	Fréquence cardiaque au repos moyenne	3	Fréquence cardiaque au repos moyenne
Comparable	4	Normes relatives à la tension artérielle	4	Normes relatives à la tension artérielle
Hypertension mesurée remplace l'autodéclaration d'un diagnostic d'hypertension pour le cycle 2	5	Autodéclaration d'un diagnostic d'hypertension ou du fait de prendre des médicaments pour l'hypertension	5	Autodéclaration du fait de prendre des médicaments pour l'hypertension ou une tension artérielle mesurée hypertensive
Comparable	6	Force de préhension totale	6	Force de préhension totale
Comparable	7	Normes relatives à la force de préhension	7	Normes relatives à la force de préhension
6 à 7 ans exclus du cycle 2 (souci de qualité)	8	Nombre de redressements assis partiels effectués	8	Nombre de redressements assis partiels effectués
Comparable	9	Normes relatives aux redressements assis partiels	9	Normes relatives aux redressements assis partiels
Comparable	10	Normes relatives à la santé du dos	10	Normes relatives à la santé du dos
Comparable	11	Mesure de la flexion du tronc	11	Mesure de la flexion du tronc
Comparable	12	Normes relatives à la flexion du tronc	12	Normes relatives à la flexion du tronc
Comparable	13	Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques	13	Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques
Comparable	14	Normes relatives à l'aptitude aérobie	14	Normes relatives à l'aptitude aérobie
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	15	Circonférence de la taille mesurée - protocole de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)	17	Circonférence de la taille mesurée - protocole de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Ajouté au cycle 2			16	Circonférence du cou mesurée
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	16	Circonférence des hanches mesurée	19	Circonférence des hanches mesurée
Ajouté au cycle 2			18	Circonférence de la taille mesurée - protocole des National Institutes of Health (NIS)
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	17	Ratio taille/hanches mesuré	20	Ratio taille/hanches mesuré

– suite

Tableau de concordance de l'ECMS pour les cycles 1 et 2

Comparabilité entre les cycles	Numéro du tableau au cycle 1	Sujet du tableau au cycle 1	Numéro du tableau au cycle 2	Sujet du tableau au cycle 2
Tableau pas produit pour le cycle 2	18	Indice de masse corporelle inférieur à 30 kg/m, selon la mesure moyenne du plicutané du biceps ²		
Tableau pas produit pour le cycle 2	19	Indice de masse corporelle inférieur à 30 kg/m, selon la mesure moyenne du pli cutané du triceps ²		
Tableau pas produit pour le cycle 2	20	Indice de masse corporelle inférieur à 30 kg/m, selon la mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire ²		
Tableau pas produit pour le cycle 2	21	Indice de masse corporelle inférieur à 30 kg/m selon la mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque ²		
Tableau pas produit pour le cycle 2	22	Indice de masse corporelle inférieur à 30 kg/m, selon la mesure moyenne du pli cutané du mollet ²		
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	23	Indice de masse corporelle inférieur à 30 kg/m, selon la somme des mesures des cinq plis cutanés ²	21	Indice de masse corporelle inférieur à 30 kg/m, selon la somme des mesures des cinq plis cutanés ²
Tableau pas produit pour le cycle 2	24	Poids autodéclaré		
Tableau pas produit pour le cycle 2	25	Taille autodéclarée		
Tableau pas produit pour le cycle 2	26	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (6 à 17 ans) basées sur les entrées autodéclarées — méthode Center for Disease Control (CDC)		
Tableau pas produit pour le cycle 2	27	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (6 à 17 ans) basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole		
Tableau pas produit pour le cycle 2	28	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (18 à 79 ans) basées sur les entrées autodéclarées		
Tableau pas produit pour le cycle 2	29	Taille en position assise mesurée		
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	30	Taille en position debout mesurée	22	Taille en position debout mesurée
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	31	Poids mesuré	23	Poids mesuré
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	32	Indice de masse corporelle mesuré	24	Indice de masse corporelle mesuré
Ajouté au cycle 2			25	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (5 à 18 ans) basé sur les mesures directes — méthode de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	33	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (6 à 17 ans) basées sur les mesures directes — méthode Center for DiseaseControl (CDC)	26	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (3 à 17 ans) basé sur les mesures directes — méthode Center for DiseaseControl (CDC)

– suite

Tableau de concordance de l'ECMS pour les cycles 1 et 2

Comparabilité entre les cycles	Numéro du tableau au cycle 1	Sujet du tableau au cycle 1	Numéro du tableau au cycle 2	Sujet du tableau au cycle 2
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	34	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (6 à 17 ans) basées sur les mesures directes — méthode Cole	27	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (6 à 17 ans) basé sur les mesures directes — méthode Cole
Comparable	35	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (18 à 79 ans) basées sur les mesures directes	28	Normes relatives à l'indice de masse corporelle (18 à 79 ans) basé sur les mesures directes
6 à 7 ans exclus du cycle 2 (souci de qualité)	36	Puissance aérobie maximale prévue moyenne	15	Puissance aérobie maximale prévue moyenne
Comparable	37	Meilleur ratio du volume expiratoire maximal en une seconde par rapport à la capacité vitale forcée (VEMS/ CVF)	29	Meilleur ratio du volume expiratoire maximal en une seconde par rapport à la capacité vitale forcée (VEMS/ CVF)
Comparable	38	Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS)	30	Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS)
Comparable	39	Meilleure capacité vitale forcée (CVF)	31	Meilleure capacité vitale forcée (CVF)
Ajouté au cycle 2			32	Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (35 à 79 ans)
Contenu exclu du cycle 2	40	État dentaire		
Ajouté au cycle 2			38	Albumine mesuré dans le sérum
Ajouté au cycle 2			39	Calcium total mesuré dans le sérum
Ajouté au cycle 2			40	Créatinine mesurée dans le sérum
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	41	Vitamine B12 dans le sérum	55	Vitamine B12 mesurée dans le sérum
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	42	Vitamine D dans le plasma	56	Vitamine D [(25-OH)] mesurée dans le plasma
Tableau pas produit pour le cycle 2	43	Homocystéine dans le plasma		
Tableau pas produit pour le cycle 2	44	Folate dans les globules rouges du sang total		
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	45	Cholestérol total dans le sérum (échantillon total)	35	Cholestérol total mesuré dans le sérum (échantillon total)
Tableau pas produit pour le cycle 2	46	Cholestérol total dans le sérum (sous-échantillon à jeun)		
Comparable	47	Triglycérides dans le sérum (sous-échantillon à jeun)	37	Triglycérides mesurés dans le sérum (sous-échantillon à jeun)
Lipoprotéines de basse densité mesurées au cycle 1 et dérivées au cycle 2	48	Lipoprotéines de basse densité dans le sérum (sous-échantillon à jeun)	34	Lipoprotéines de basse densité (sous-échantillon à jeun)
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	49	Lipoprotéines de haute densité dans le sérum (échantillon total)	33	Lipoprotéines de haute densité mesurées dans le sérum (échantillon total)
Tableau pas produit pour le cycle 2	50	Lipoprotéines de haute densité dans le sérum (sous-échantillon à jeun)		

– suite

Tableau de concordance de l'ECMS pour les cycles 1 et 2

Comparabilité entre les cycles	Numéro du tableau au cycle 1	Sujet du tableau au cycle 1	Numéro du tableau au cycle 2	Sujet du tableau au cycle 2
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	51	Ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum (échantillon total)	36	Ratio du cholestérol total sur les lipoprotéines de haute densité (échantillon total)
Tableau pas produit pour le cycle 2	52	Ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum (sous-échantillon à jeun)		
Tableau pas produit pour le cycle 2	53	Apolipoprotéine A1 dans le sérum (sous-échantillon à jeun)		
Tableau pas produit pour le cycle 2	54	Apolipoprotéine B dans le sérum (sous-échantillon à jeun)		
Comparable	55	Glucose dans le plasma (sous-échantillon à jeun)	48	Glucose mesuré dans le sérum (sous-échantillon à jeun)
Tableau pas produit pour le cycle 2	56	Anticorps de l'hépatite A		
Comparable	57	Anticorps de surface de l'hépatite B	49	Anticorps de surface du virus de l'hépatite B mesuré dans le sérum
Ajouté au cycle 2			41	Gamma-glutamyl-transférase mesurée dans le sérum
Ajouté au cycle 2			42	Phosphore mesuré dans le sérum
Ajouté au cycle 2			43	Urée mesuré dans le sérum
Ajouté au cycle 2			44	Acide urique mesuré dans le sérum
Ajouté au cycle 2			45	Hémoglobine mesurée dans le sang complet
Ajouté au cycle 2			46	Hématocrite mesurée dans le sang complet
Ajouté au cycle 2			47	Volume globulaire moyen mesuré dans le sang complet
Ajouté au cycle 2			50	Herpès simplex-2 mesuré dans le sérum
Ajouté au cycle 2			51	Ferritine mesurée dans le sérum
Ajouté au cycle 2			52	Iode mesuré dans urine
Ajouté au cycle 2			53	Ratio d'iode sur créatinine
Ajouté au cycle 2			54	Hormone parathyroïdienne mesurée dans le plasma
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	58	Bisphénol A dans l'urine	57	Bisphénol A mesuré dans l'urine
Tableau pas produit pour le cycle 2	59	Bisphénol A dans l'urine normalisée par la créatinine dans l'urine		
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	60	Plomb en micromoles par litre dans le sang entier	58	Plomb en micromoles par litre mesuré dans le sang entier
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	61	Plomb en microgrammes par décilitre dans le sang entier	59	Plomb en microgrammes par décilitre mesuré dans le sang entier
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	62	Mercure en nanomoles par litre dans le sang entier	60	Mercure en nanomoles par litre mesuré dans le sang entier

– suite

Tableau de concordance de l'ECMS pour les cycles 1 et 2

Comparabilité entre les cycles	Numéro du tableau au cycle 1	Sujet du tableau au cycle 1	Numéro du tableau au cycle 2	Sujet du tableau au cycle 2
Comparable + ajout des 3 à 5 ans	63	Mercure en microgrammes par litre dans le sang entier	61	Mercure en microgrammes par litre mesuré dans le sang entier
Tableau pas produit pour le cycle 2	64	Cadmium en nanomoles par litre dans le sang entier		
Tableau pas produit pour le cycle 2	65	Cadmium en microgrammes par litre dans le sang entier		
Ajouté au cycle 2			62	Cadmium en nanomoles par litre mesuré dans le sang entier - non-fumeurs
Ajouté au cycle 2			63	Cadmium en nanomoles par litre mesuré dans le sang entier - fumeurs
Ajouté au cycle 2			64	Cadmium en microgrammes par litre mesuré dans le sang entier - non-fumeurs
Ajouté au cycle 2			65	Cadmium en microgrammes par litre mesuré dans le sang entier - fumeurs
Ajouté au cycle 2			66	Concentration de benzène mesurée dans l'air intérieur
Ajouté au cycle 2			67	Concentration de toluène mesurée dans l'air intérieur
Ajouté au cycle 2			68	Concentration d'éthylbenzène mesurée dans l'air intérieur
Ajouté au cycle 2			69	Concentration de m- & p-xylène mesurée dans l'air intérieur
Ajouté au cycle 2			70	Concentration de o-xylène mesurée dans l'air intérieur

Note(s) : Tous les tableaux représente une répartition de la population des ménages selon l'âge et le sexe pour le Canada pour le sujet particulier endiqué. La collecte s'est déroulée de 2007 à 2009 pour le cycle 1 et de 2009 à 2011 pour le cycle 2. Une cellule vide dans le tableau endique une situation qui est sans objet.