

Tableau 1-2

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada¹ — 1 à 14 ans²

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre
Les deux sexes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	740	.	811	.	882	.	871	.	883
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	229	1	265	1	299	1	286	1	289
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	133	2	114	2	125	2	146	2	127
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	65	3	67	3	75	3	76	3	95
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	28	5	27	4	35	5	27	4	46
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	26	4	31	6	25	6	26	5	29
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	24	7	20	5	28	4	30	6	20
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	9	8	16	7	14	8	13	7	13
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	9	6	25	7	14	11	6	10	7
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	9	7	9	12	15	3	10	8	12	6
Septicémie (A40-A41)	10	6	10	9	9	12	7	18	8	11
	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	30,9	1	32,7	1	33,9	1	32,8	1	32,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	18,0	2	14,1	2	14,2	2	16,8	2	14,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	8,8	3	8,3	3	8,5	3	8,7	3	10,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	3,8	5	3,3	4	4,0	5	3,1	4	5,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	3,5	4	3,8	6	2,8	6	3,0	5	3,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	3,2	7	2,5	5	3,2	4	3,4	6	2,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	1,2	8	2,0	7	1,6	8	1,5	7	1,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	1,2	6	3,1	7	1,6	11	0,7	10	0,8
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	9	0,9	9	1,5	15	0,3	10	0,9	12	0,7
Septicémie (A40-A41)	10	0,8	10	1,1	9	1,4	7	2,1	8	1,2
	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	13,7	.	14,9	.	16,0	.	15,8	.	15,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	4,2	1	4,9	1	5,4	1	5,2	1	5,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2,5	2	2,1	2	2,3	2	2,7	2	2,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	1,2	3	1,2	3	1,4	3	1,4	3	1,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	0,5	5	0,5	4	0,6	5	0,5	4	0,8
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	0,5	4	0,6	6	0,5	6	0,5	5	0,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	0,4	7	0,4	5	0,5	4	0,5	6	0,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	0,2	8	0,3	7	0,3	8	0,2	7	0,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	0,2	6	0,5	7	0,3	11	0,1	10	0,1
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	9	0,1	9	0,2	15	0,1	10	0,1	12	0,1
Septicémie (A40-A41)	10	0,1	10	0,2	9	0,2	7	0,3	8	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 1 à 14 ans²

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre
Hommes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	437	.	483	.	499	.	486	.	510
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	158	1	166	1	186	1	181	1	191
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	70	2	75	2	66	2	88	2	76
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	40	3	35	3	44	3	39	3	60
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	17	5	19	4	18	4	14	4	29
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	16	4	21	5	12	5	13	5	17
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	12	6	11	5	12	5	13	6	10
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	7	6	11	7	7	11	4	8	4
Septicémie (A40-A41)	8	3	13	3	9	5	7	11	8	4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	3	8	7	7	7	9	5	7	5
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	8	3	8	7	16	1	11	4	11	2
	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	36,2	1	34,4	1	37,3	1	37,2	1	37,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	16,0	2	15,5	2	13,2	2	18,1	2	14,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	9,2	3	7,2	3	8,8	3	8,0	3	11,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	3,9	5	3,9	4	3,6	4	2,9	4	5,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	3,7	4	4,3	5	2,4	5	2,7	5	3,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	2,7	6	2,3	5	2,4	5	2,7	6	2,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	1,6	6	2,3	7	1,4	11	0,8	8	0,8
Septicémie (A40-A41)	8	0,7	13	0,6	9	1,0	7	2,3	8	0,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	0,7	8	1,4	7	1,4	9	1,0	7	1,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	8	0,7	8	1,4	16	0,2	11	0,8	11	0,4
	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	15,8	.	17,3	.	17,7	.	17,2	.	17,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	5,7	1	6,0	1	6,6	1	6,4	1	6,7
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2,5	2	2,7	2	2,3	2	3,1	2	2,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	1,4	3	1,3	3	1,6	3	1,4	3	2,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	4	0,6	5	0,7	4	0,6	4	0,5	4	1,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	0,6	4	0,8	5	0,4	5	0,5	5	0,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	0,4	6	0,4	5	0,4	5	0,5	6	0,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	0,3	6	0,4	7	0,2	11	0,1	8	0,1
Septicémie (A40-A41)	8	0,1	13	0,1	9	0,2	7	0,4	8	0,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	8	0,1	8	0,3	7	0,2	9	0,2	7	0,2
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	8	0,1	8	0,3	16	0,0	11	0,1	11	0,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Les dix principales causes de décès, selon certains groupes d'âge et le sexe, Canada 1 — 1 à 14 ans²

	Décès									
	2004		2003		2002		2001		2000	
	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre	rang ³	nombre
Femmes										
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	303	.	328	.	383	.	385	.	373
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	71	1	99	1	113	1	105	1	98
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	63	2	39	2	59	2	58	2	51
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	25	3	32	3	31	3	37	3	35
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	12	6	9	5	16	4	17	6	10
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	5	11	8	8	4	17	5	13	4	17
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	10	5	10	6	13	5	13	5	12
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	6	6	9	7	7	7	8	7	8
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	8	4	10	5	13	2	9	4	10	4
Septicémie (A40-A41)	9	3	9	6	7	7	8	7	8	7
Méningite (G00, G03)	9	3	13	2	16	1	10	3	10	4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	3	12	3	10	6	10	3	9	6
	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage	rang ³	pourcentage
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	23,4	1	30,2	1	29,5	1	27,3	1	26,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	20,8	2	11,9	2	15,4	2	15,1	2	13,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	8,3	3	9,8	3	8,1	3	9,6	3	9,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	4,0	6	2,7	5	4,2	4	4,4	6	2,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	5	3,6	8	2,4	4	4,4	5	3,4	4	4,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	3,3	5	3,0	6	3,4	5	3,4	5	3,2
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	2,0	6	2,7	7	1,8	7	2,1	7	2,1
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	8	1,3	10	1,5	13	0,5	9	1,0	10	1,1
Septicémie (A40-A41)	9	1,0	9	1,8	7	1,8	8	1,8	8	1,9
Méningite (G00, G03)	9	1,0	13	0,6	16	0,3	10	0,8	10	1,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	1,0	12	0,9	10	1,6	10	0,8	9	1,6
	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴	rang ³	taux par âge ⁴
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)	.	11,5	.	12,3	.	14,3	.	14,3	.	13,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1	2,7	1	3,7	1	4,2	1	3,9	1	3,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	2	2,4	2	1,5	2	2,2	2	2,2	2	1,9
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	0,9	3	1,2	3	1,2	3	1,4	3	1,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	0,5	6	0,3	5	0,6	4	0,6	6	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	5	0,4	8	0,3	4	0,6	5	0,5	4	0,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6	0,4	5	0,4	6	0,5	5	0,5	5	0,4
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	7	0,2	6	0,3	7	0,3	7	0,3	7	0,3
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	8	0,2	10	0,2	13	0,1	9	0,1	10	0,1
Septicémie (A40-A41)	9	0,1	9	0,2	7	0,3	8	0,3	8	0,3
Méningite (G00, G03)	9	0,1	13	0,1	16	0,0	10	0,1	10	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	0,1	12	0,1	10	0,2	10	0,1	9	0,2

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau est fondée sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée. Les chiffres dans ce tableau excluent les décès de non-résidents du Canada.

2. Pour « Âge au décès, 1 à 14 ans », le calcul du taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 14 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.

3. Le classement des principales causes de décès repose sur le nombre de décès.

4. Le taux de mortalité par âge pour 100 000 habitants utilise comme dénominateur l'estimation de population présentée à l'annexe 3.

Note(s) : Voir les sections « Introduction », « Glossaire » et « Définitions, sources de données et méthodes ».

Source(s) : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les décès (Tableau CANSIM 102-0561).